




16058 / A





~~II. n. 621~~

77610  
HISTOIRE  
NATURELLE,  
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,  
AVEC LA DESCRIPTION  
DU CABINET DU ROI.

---

*Tome Vingtième.*

---



A PARIS,  
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

---

M. DCCLXV.

HISTOIRE  
NATURELLE,  
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,  
AVEC LA DESCRIPTION  
DU CABINET DU ROI.



A PARIS  
L'IMPRIMERIE ROYALE  
M. DCCLXV.



---

---

# T A B L E

De ce qui est contenu dans ce  
Volume.

<i>L'Ondatra &amp; le Desman</i> . . .	page 1
<i>Le Pecari ou le Tajacu</i> . . . . .	26
<i>La Rouffette , la Rougette &amp; le Vam- pire</i> . . . . .	71
<i>Le Polatouche</i> . . . . .	124
<i>Le Petit-Gris</i> . . . . .	151
<i>Le Palmiste , le Barbaresque &amp; le Suisse</i> . . . . .	164
<i>Le Tamanoir , le Tamandua &amp; le Four- miller</i> . . . . .	189

---

Par M. DE BUFFON.

---

<i>Description de l'Ondatra</i> . . . . .	page 18
<i>Description du Pecari</i> . . . . .	35
<i>Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire Naturelle de</i>	

<i>l'Ondatra, du Desman &amp; du Pecari.</i>	66
<i>Description de la Roussette.....</i>	85
<i>Description de la Rougette.....</i>	102
<i>Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire Naturelle de la Roussette, de la Rougette &amp; de quatre espèces de Chauve-Souris.....</i>	104
<i>Description du Polatouche.....</i>	133
<i>Description du Petit-Gris.....</i>	161
<i>Description du Palmiste.....</i>	171
<i>Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire naturelle du Pola- touche, du Petit-Gris, du Palmiste, du Barbaresque &amp; du Suisse....</i>	178
<i>Description du Tamanoir.....</i>	212
<i>Description du Fourmiller.....</i>	217

---

Par M. DAUBENTON.

---



HISTOIRE

# HISTOIRE NATURELLE.

## L'ONDATRA \* ET LE DESMAN \*\*.

L'ONDATRA & le Desman sont deux animaux qu'il ne faut pas confondre, quoiqu'on les ait appelés tous deux *Rats*

\* *Ondatra* chez les Sauvages de l'Amérique septentrionale. *Rat musqué de Canada*.

*Rat musqué*. Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1726, page 323.

\*\* *Desman* en Suède. *Rat musqué de Moscovie*.

*Mus aquaticus Clusii exotic. auct.* pag. 373.

*Mus aquaticus Clusii*. Aldrov. de quadr. digit. p. 448.

*Mus aquaticus exoticus Clusii*. Ray. Synops. quadr. pag. 217.

*Mus aquaticus Clusii*. Muscum Wormianum, p. 334.

*Animal ex Moscovia*. Ruper, Bessler, Gazophyl. Tab. xv.

Tome XX.

A

musqués, & qu'ils aient quelques caractères communs; il faut aussi les distinguer du pilori ou rat musqué des Antilles; ces trois animaux sont d'espèces & de climats différens. L'ondatra se trouve en Canada, le desman en Laponie, en Moscovie, & le pilori à la Martinique & dans les autres îles Antilles.

L'ondatra ou rat musqué de Canada diffère du desman en ce qu'il a les doigts des pieds tous séparés les uns des autres, les yeux très-apparens & le museau fort court, au lieu que le desman ou rat musqué de Moscovie a les pieds de derrière réunis par une membrane\*, les yeux extrêmement petits, le museau prolongé comme la musaraigne. Tous deux ont la queue plate, & ils diffèrent du pilori ou rat musqué des Antilles, par cette conformation & par plusieurs autres

*Castor caudâ verticaliter planâ, digitis omnibus membranis inter se connexis. . . . . Mus moschiferus.* Le rat musqué. Buisson, *Regn. animal.* pag. 135.

\* *Oculi exigui & vix conspicui. . . . . Digiti majores membranis connexi ad commodius nataandum, rostri pars superior firma, prominula & pene unciâ longâ, nigricans eâque formâ prædita, ut insular suis aut talpæ errant vertere possit.* Clusii exotic. auct. pag. 375.



*de l'Ondatra & du Desman.* 3

caractères <sup>a</sup> ; le pilori a la queue assez courte, cylindrique <sup>b</sup> comme celle des autres rats, au lieu que l'ondatra & le desman l'ont tous deux fort longue.

<sup>a</sup> Les rats musqués des Antilles que nos François appellent *Piloris*, font le plus souvent leurs retraites dans les trous de la terre comme les lapins, aussi ils sont presque de la même grosseur, mais pour la figure ils n'ont rien de celle des gros rats qu'on voit ailleurs, sinon que la plupart ont le poil du ventre blanc comme les glirons, & celui du reste du corps noir ou tanné : ils exhalent une odeur musquée qui abat le cœur & qui parfume si fort l'endroit de leur retraite qu'il est fort aisé de le discerner. *Histoire naturelle des Antilles. Rotterdam, n° 658, page 124.*

<sup>b</sup> Les piloris sont une espèce de rats de bois deux ou trois fois plus gros que les rats ordinaires ; ils sont presque blancs, leur queue est fort courte, ils sentent le musc extraordinairement. *Nouveau voyage aux îles de l'Amérique. Paris, 1722, tome 1, page 438.* — Les piloris se trouvent à la Martinique & dans quelques autres îles des Antilles : ce sont des rats musqués de même forme que les rats d'Europe, mais d'une si prodigieuse grandeur que quatre de nos rats ne pèsent pas un pilori. . . . . Ils nichent jusque dans les caves, mais ne peuplent pas tant que les autres rats communs. . . . . Ces piloris sont naturels dans l'île de la Martinique, & non pas les autres rats communs qui n'ont paru que depuis quelques années qu'elle est fréquentée des navires, &c. *Histoire générale des Antilles, par le Père du Tertre. Paris, 1667, tome II, page 302.*

L'ondatra ressemble par la tête au rat d'eau, & le desman à la musaraigne.

On trouve dans les Mémoires de l'Académie, *année 1725*, une description très-ample & très-bien faite de l'ondatra sous le nom de *Rat musqué*. M. Sarrafin, Médecin du Roi à Quebec & Correspondant de l'Académie, s'est occupé à disséquer un grand nombre de ces animaux dans lesquels il a observé des choses singulières. Nous ne pouvons pas douter, en comparant sa description avec la nôtre, que ce rat musqué de Canada, dont il a donné la description, ne soit notre ondatra, c'est-à-dire l'animal dont nous donnons ici la figure (*planche 1*).

L'ondatra est de la grosseur d'un petit lapin & de la forme d'un rat; il a la tête courte & semblable à celle du rat d'eau, le poil luisant & doux avec un duvet fort épais au-dessous du premier poil, à peu près comme le castor; il a la queue longue & couverte de petites écailles comme celles des autres rats, mais elle est d'une forme différente: la queue des rats communs est à peu près cylindrique, & diminue de grosseur

depuis l'origine jusqu'à l'extrémité ; telle du rat mulqué est fort aplatie vers la partie du milieu jusqu'à l'extrémité, & un peu plus arrondie au commencement, c'est-à-dire, à l'origine ; les faces aplaties ne sont pas horizontales, mais verticales, en sorte qu'il semble que la queue ait été serrée & comprimée des deux côtés dans toute sa longueur : les doigts des pieds ne sont pas réunis par des membranes, mais ils sont garnis de longs poils assez serrés qui suppléent en partie l'effet de la membrane & donnent à l'animal plus de facilité pour nager. Il a les oreilles très-courtes & non pas nues comme le rat domestique, mais bien couvertes de poil en dehors & en dedans ; les yeux grands & de trois lignes d'ouverture ; deux dents incisives d'environ un pouce de long dans la mâchoire inférieure, & deux autres plus courtes dans la mâchoire supérieure : ces quatre dents sont très-fortes & lui servent à ronger & à couper le bois.

Les choses singulières que M. Sarrafin a observées dans cet animal, sont, 1.<sup>o</sup> la force & la grande expansion du muscle

peaucier qui fait que l'animal, en contractant sa peau, peut resserrer son corps & le réduire à un plus petit volume; 2.<sup>o</sup> la souplesse des fausses côtes qui permet cette contraction du corps, laquelle est si considérable que le rat musqué passe dans des trous où des animaux beaucoup plus petits ne peuvent entrer; 3.<sup>o</sup> la manière dont s'écoulent les urines dans les femelles, car l'urètre n'aboutit point, comme dans les autres quadrupèdes, au-dessous du clitoris, mais à une éminence velue située sur l'os pubis; & cette éminence a un orifice particulier qui sert à l'éjection des urines : organisation singulière qui ne se trouve que dans quelques espèces d'animaux, comme les rats & les singes dont les femelles ont trois ouvertures. On a observé que le castor est le seul des quadrupèdes dans lequel les urines & les excréments aboutissent également à un réceptacle commun qu'on pourroit comparer au cloaque des oiseaux : les femelles des rats & des singes sont peut-être les seules qui aient le conduit des urines & l'orifice par où elles s'écoulent, absolument séparés des parties de la généra-



tion; cette singularité n'est que dans les femelles, car dans les mâles de ces mêmes espèces l'urètre aboutit à l'extrémité de la verge, comme dans toutes les autres espèces de quadrupèdes. M. Sarrafin observe, 4.<sup>o</sup> que les testicules qui, comme dans les autres rats, sont situés des deux côtés de l'anüs, deviennent très-gros dans le temps du rut pour un animal aussi petit; *gros*, dit-il, *comme des noix muscades*; mais qu'après ce temps ils diminuent prodigieusement & se réduisent au point de n'avoir pas plus d'une ligne de diamètre; que non-seulement ils changent de volume, de consistance & de couleur, mais même de situation d'une manière marquée; il en est de même des vésicules séminales, des vaisseaux déférens, &c. toutes ces parties de la génération s'oblitérent presque entièrement après la saison des amours; les testicules, qui dans ce temps étoient au dehors & fort proéminens, rentrent dans l'intérieur du corps; ils sont attachés à la membrane adipeuse, ou plutôt ils y sont enclavés, ainsi que les autres parties dont nous venons de parler; cette membrane s'étend

& s'augmente par la surabondance de la nourriture jusqu'au temps du rut : les parties de la génération qui semblent être des appendices de cette membrane se développent, s'étendent, se gonflent & acquièrent alors toutes leurs dimensions ; mais lorsque cette sur-abondance de nourriture est épuisée par des coïts réitérés, la membrane adipeuse qui maigrit, se resserre, se contracte & se retire peu à peu du côté des reins ; en se retirant elle entraîne avec elle les vaisseaux déterens, les vésicules séminales, les épidydimes & les testicules qui deviennent légers, vides & ridés au point de n'être plus reconnoissables ; il en est de même des vésicules féminales qui, dans le temps de leur gonflement, ont un pouce & demi de longueur & ensuite sont réduites, ainsi que les testicules, à une ou deux lignes de diamètre ; 5.<sup>o</sup> les follicules qui contiennent le musc ou le parfum de cet animal sous la forme d'une humeur laiteuse, & qui sont voisins des parties de la génération, éprouvent aussi les mêmes changemens ; ils sont très-gros, très-gonflés, leur parfum très-fort, très-

exalté, & même très-sensible à une assez grande distance dans le temps des amours; ensuite ils se rient, ils se flétrissent & enfin s'oblitérent en entier. Ce changement dans les follicules qui contiennent le parfum se fait plus promptement & plus complètement que celui des parties de la génération; ces follicules qui sont communs aux deux sexes contiennent un lait fort abondant au temps du rut; ils ont des vaisseaux excrétoires qui aboutissent dans le mâle à l'extrémité de la verge & vers le clitoris dans la femelle, & cette sécrétion se fait & s'évacue à peu près au même endroit que l'urine dans les autres quadrupèdes.

Toutes ces singularités, qui nous ont été indiquées par M. Sarrafin, étoient dignes de l'attention d'un habile Anatomiste, & l'on ne peut assez le louer des soins réitérés qu'il s'est donné pour constater ces espèces d'accidens de la Nature & pour voir ces changemens dans toutes leurs périodes. Nous avons déjà parlé de changemens & d'altérations à peu près semblables à celles-ci dans les parties de la génération du rat d'eau, du

campagnol & de la taupe. Voilà donc des animaux quadrupèdes qui, par tout le reste de la conformation, ressemblent aux autres quadrupèdes, desquels cependant les parties de la génération se renouvellent & s'oblitérent chaque année à peu près comme les laitances des poissons & comme les vaisseaux séminaux du calmar dont nous avons décrit les changemens, l'anéantissement & la reproduction \* : ce sont là de ces nuances par lesquelles la Nature rapproche secrètement les êtres qui nous paroissent les plus éloignés, de ces exemples rares, de ces *instances* solitaires qu'il ne faut jamais perdre de vue, parce qu'elles tiennent au système général de l'organisation des êtres, & qu'elles en réunissent les points les plus éloignés. Mais ce n'est point ici le lieu de nous étendre sur les conséquences générales qu'on peut tirer de ces faits singuliers, non plus que sur les rapports immédiats qu'ils ont avec notre théorie de la génération ; un esprit attentif les sentira d'avance, & nous aurons bien-tôt occasion

\* Voyez le *Volume III* de cette Histoire naturelle, page 331 & suivantes.



de les présenter avec plus d'avantage en les réunissant à la masse totale des autres faits qui y sont relatifs.

Comme l'ondatra est du même pays que le castor, que comme lui il habite sur les eaux, qu'il est en petit à peu près de la même figure, de la même couleur & du même poil, on les a souvent comparés l'un à l'autre; on assure même qu'au premier coup d'œil on prendroit un vieux ondatra pour un castor qui n'auroit qu'un mois d'âge; ils diffèrent cependant assez par la forme de la queue pour qu'on ne puisse s'y méprendre, elle est ovale & plate horizontalement dans le castor; elle est très-alongée & plate verticalement dans l'ondatra: au reste ces animaux se ressembtent assez par le naturel & l'instinct; les ondatras, comme les castors, vivent en société pendant l'hiver; ils font des petites cabanes d'environ deux pieds & demi de diamètre, & quelquefois plus grandes, où ils se réunissent plusieurs familles ensemble; ce n'est point, comme les marmottes, pour y dormir pendant cinq ou six mois, c'est seulement pour se mettre à l'abri de la rigueur de

l'air : ces cabanes sont rondes & couvertes d'un dôme d'un pied d'épaisseur ; des herbes, des joncs entrelacés mêlés avec de la terre grasse qu'ils pétrissent avec les pieds, sont leurs matériaux. Leur construction est impénétrable à l'eau du ciel, & ils pratiquent des gradins en dedans pour n'être pas gagnés par l'inondation de celle de la terre ; cette cabane, qui leur sert de retraite, est couverte pendant l'hiver de plusieurs pieds de glaces & de neiges sans qu'ils en soient incommodés. Ils ne font pas de provisions pour vivre comme les castors, mais ils creusent des puits & des espèces de boyaux au-dessous & à l'entour de leur demeure pour chercher de l'eau & des racines ; ils passent ainsi l'hiver fort tristement quoiqu'en société, car ce n'est pas la saison de leurs amours : ils sont privés pendant tout ce temps de la lumière du ciel ; aussi lorsque l'haleine du printemps commence à dissoudre les neiges & à découvrir les sommets de leurs habitations, les Chasseurs en ouvrent le dôme, les offusquent brusquement de la lumière du jour, & assomment ou prennent tous

ceux qui n'ont pas eu le temps de gagner les galeries souterraines qu'ils se sont pratiquées & qui leur servent de derniers retranchemens où on les suit encore , car leur peau est précieuse & leur chair n'est pas mauvaise à manger. Ceux qui échappent à la main du Chasseur, quittent leur habitation à peu près dans ce temps ; ils sont errans pendant l'été, mais toujours deux à deux , car c'est le temps des amours : ils vivent d'herbes & se nourrissent largement des productions nouvelles que leur offre la surface de la terre ; la membrane adipeuse s'étend , s'augmente , se remplit par la sur-abondance de cette bonne nourriture ; les follicules se renouvellent , se remplissent aussi ; les parties de la génération se dérident , se gonflent ; & c'est alors que ces animaux prennent une odeur de musc si forte qu'elle n'est pas supportable ; cette odeur se fait sentir de loin , & quoique suave \* pour les Européens, elle déplaît

\* Le rat musqué de l'Amérique septentrionale est un peu plus gros & un peu plus long que le rat d'eau de France ; son élément est l'eau , mais il ne laisse pas d'aller quelquefois à terre ; il a la queue plate.

si fort aux Sauvages qu'ils ont appelé *puante* une rivière sur les bords de laquelle habitent en grand nombre ces rats musqués qu'ils appellent aussi *rats puants*.

Ils produisent une fois par an, & cinq ou six petits à la fois; la durée de la gestation n'est pas longue, puisqu'ils n'entrent en amour qu'au commencement

elle est de huit ou dix poudes de long, de la largeur d'un doigt, couverte de petites écailles noires; la peau rouille, couleur de minime-brun, le poil en est fort fin, assez long: il porte des rognons proche les testicules qui ont l'odeur de musc très-agréable, & n'est point incommode à tous ceux à qui le musc donne des incommodités. Si on les tue l'hiver, pendant que la peau est bonne pour fourrer, les rognons ne sentent rien; au printemps ils commencent à prendre leur senteur qui dure jusqu'à l'automne. . . . Pour la chair elle n'a point le goût de musc, elle est excellente à manger. *Description de l'Amérique septentrionale, par Denys. Paris, 1672, tome II, page 258.* — Les rats musqués de Canada répandent une odeur admirable; la civette & la gazelle n'exhalent rien de si fort ni de si doux. *Voyage de la Fontaine. La Haye, 1706, tome I, page 95.* — Les Sauvages de l'Amérique n'aiment point l'odeur que répand le rat musqué, ils lui ont même donné le nom de *puant*, tant cette odeur leur déplait. *Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1725, page 327.*

*de l'Ondatra & du Desman.* 15

de l'été, & que les petits sont déjà grands au mois d'octobre lorsqu'il faut suivre leurs père & mère dans la cabane qu'ils construisent de nouveau tous les ans; car on a remarqué qu'ils ne reviennent point à leurs anciennes habitations. Leur voix est une espèce de gémissement que les Chasseurs imitent pour les piper & pour les faire approcher : leurs dents de devant sont si fortes & si propres à ronger, que quand on enferme un de ces animaux dans une caisse de bois dur, il y fait en très-peu de temps un trou assez grand pour en sortir; & c'est encore une de ces facultés naturelles qu'il a commune avec le castor, que nous n'avons pu garder enfermé qu'en doublant de fer-blanc la porte de sa loge. L'ondatra ne nage ni aussi vite ni aussi long-temps que le castor; il va plus souvent à terre, il ne court pas bien & marche encore plus mal en se berçant à peu près comme une oye. Sa peau conserve une odeur de musc qui fait qu'on ne s'en sert pas volontiers pour fourrure, mais on emploie le second poil ou duvet dans la fabrique des chapeaux.



Ces animaux sont peu farouches , & en les prenant petits on peut les apprivoiser aisément ; ils sont même très-jolis lorsqu'ils sont jeunes ; leur queue longue & presque nue , qui rend leur figure désagréable , est fort courte dans le premier âge : ils jouent innocemment & aussi lestement que des petits chats ; ils ne mordent point \* , & on les nourriroit aisément si leur odeur n'étoit point incommode. L'ondatra & le desman sont au reste les seuls animaux des pays septentrionaux qui donnent du parfum ; car l'odeur du *castoreum* est très-désagréable , & ce n'est que dans les climats chauds qu'on trouve les animaux qui fournissent

\* Les rats musqués de Canada , que les Hurons appellent *Ondathra* , paissent l'herbe sur terre & le blanc des jones autour des lacs & des rivières ; il y a plaisir à les voir manger & faire leurs petits tours quand ils sont jeunes. J'en avois un très-joli ; je le nourrissois du blanc des jones & d'une certaine herbe semblable au chien-dent : je faisois de ce petit animal tout ce que je voulois , sans qu'il me mordît aucunement , aussi n'y sont-ils pas sujets. *Voyage de Sagarl Theodat. Paris, 1632, pages 322. & 323. NOTA.* Que la plante dont M. Sarrafin dit que le rat musqué se nourrit le plus volontiers est le *Calamus aromaticus*.

le vrai musc, la civette & les autres parfums.

Le desman ou rat musqué de Moscovie nous offriroit peut-être des singularités remarquables & analogues à celles de l'ondatra, mais il ne paroît pas qu'aucun Naturaliste ait été à portée de l'examiner vivant, ni de le disséquer; nous ne pouvons parler nous-mêmes que de sa forme extérieure, celui qui est au Cabinet du Roi ayant été envoyé de Lapponie dans un état de dessèchement qui n'a pas permis d'en faire la dissection; je n'ajouterai donc à ce que j'en ai déjà dit que le seul regret de n'en pas savoir davantage.



## DESCRIPTION DE L'ONDATRA.

L'ONDATRA (*pl. I*) est de grandeur moyenne, entre celle du surmulot & celle de la marmotte : il ressemble beaucoup au rat d'eau, tant par la forme extérieure du corps que par la conformation des parties intérieures, principalement en ce qu'il a le museau court & épais, les oreilles courtes & entièrement couvertes de poil, &c. La queue a presque la même longueur que celle du rat d'eau à proportion de la grandeur du corps, mais elle est aplatie sur les côtés dans toute sa longueur, excepté la première portion près de l'origine qui est cylindrique : elle a dans le milieu de sa longueur sept lignes & demie de largeur sur quatre lignes & demie d'épaisseur ; les bords sont encore plus minces, presque tranchans, & garnis d'un poil court beaucoup plus épais que sur les deux faces de la queue où le poil est rare & placé entre les écailles qui la recouvrent. Ces écailles sont petites comme celles de la queue du rat ; elles ont une couleur brune noirâtre : les poils sont de la même couleur.

Les couleurs du poil de l'ondatra ont plus de rapport à celles du poil du castor qu'à celles du poil du rat d'eau : il y a de deux sortes de poils, le plus long & le plus ferme est peu

épais ; au contraire le poil court & doux est fort touffu : ce duvet a près de la racine une couleur cendrée , & à la pointe une couleur brune ou roussâtre sur la tête , sur le dos , sur les épaules , sur la croupe , sur la face extérieure de la cuisse ; mais sur le haut des côtés du corps le duvet a une couleur roussâtre près de la racine & à la pointe , & il y a du cendré au-dessous de la pointe roussâtre ; le duvet du dessous & des côtés de la tête & du cou , des bras , de la poitrine , du ventre & de la face intérieure de la cuisse est de couleur grise-claire & brillante sur la plus grande partie de sa longueur : la pointe est de couleur roussâtre plus ou moins foncée. Les longs poils sont brillans ; ceux du nez , du front , du sommet de la tête & ceux du cou & du dos , sur l'épine depuis la tête jusqu'à la queue sont d'un brun mêlé de roussâtre ; ceux du reste du corps sont roussâtres. Ainsi cet animal a une large bande mal terminée & de couleur brune-roussâtre qui s'étend depuis le nez sur la tête , sur le cou & le dos jusqu'à la queue ; les côtés de la tête , du cou & du corps ont une couleur rousse mêlée de cendré ; le dehors de la cuisse est presque entièrement de couleur cendrée : il y a sur le flanc une tache brune ; le dessous de la tête & du cou , la poitrine & le ventre sont mêlés de gris & de roussâtre. Les quatre pieds ont un poil court , luisant , roussâtre sur les pieds de devant , & cendré sur les pieds de

derrière, les ongles sont rougeâtres : les doigts des pieds de devant, sur-tout le ponce, sont plus petits que ceux des pieds de derrière. Il m'a paru que cet animal est souvent dans l'eau, parce qu'il y a sur les côtés des doigts des pieds de derrière & du métatarse des poils un peu longs qui semblent tenir lieu de nageoires comme dans la musaraigne d'eau \*.

	pieds. pouc. lignes		
Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	1.	"	7.
Hauteur du train de devant.....	"	3.	6.
Hauteur du train de derrière.....	"	4.	6.
Longueur de la tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput...	"	3.	"
Circonférence du bout du museau..	"	4.	"
Circonférence du museau, prise au-dessous des yeux.....	"	5.	6.
Contour de l'ouverture de la bouche.	"	2.	2.
Distance entre les deux naseaux...	"	"	3.
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil.....	"	1.	3.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....	"	1.	3.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.	"	"	3.
Ouverture de l'œil.....	"	"	2.
Distance entre les angles antérieurs des yeux, en suivant la courbure du chanfrein.....	"	1.	2.

\* Voyez le *Volume XV* de cet Ouvrage, page 85.



pieds. pouc. ligne

La même distance en ligne droite..	"	"	10.
Circonférence de la tête, prise entre les yeux & les oreilles. ....	"	6.	4.
Longueur des oreilles. ....	"	"	6.
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure. ....	"	"	8.
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas. ....	"	"	10.
Longueur du cou. ....	"	"	8.
Circonférence du cou. ....	"	4.	"
Circonférence du corps, prise der- rière les jambes de devant. ....	"	9.	6.
La même circonférence à l'endroit le plus gros. ....	"	10.	"
La même circonférence prise devant les jambes de derrière. ....	"	9.	"
Longueur du tronçon de la queue..	"	9.	"
Circonférence de la queue à l'ori- gine du tronçon. ....	"	2.	2.
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet. ....	"	2.	"
Largeur de l'avant-bras au coude. ....	"	"	8.
Épaisseur au même endroit. ....	"	"	5 $\frac{1}{2}$
Circonférence du poignet. ....	"	1.	2.
Circonférence du métacarpe. ....	"	1.	1.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des ongles. ....	"	1.	4.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon. ....	"	2.	4.

Largeur du haut de la jambe. . . . .	"	1.	1.
Épaisseur. . . . .	"	"	9.
Largeur à l'endroit du talon. . . . .	"	"	7.
Circonférence du métatarse. . . . .	"	1.	8.
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles. . . . .	"	2.	10.
Largeur du pied de devant. . . . .	"	"	6.
Largeur du pied de derrière. . . . .	"	"	10.
Longueur des plus grands ongles. " "	"	"	6.
Largeur à la base. . . . .	"	"	2.

L'épiploon étoit très-court & s'étendoit peu au-delà de l'estomac qui se trouvoit placé en entier dans le côté gauche ; la plus grande partie du foie étoit à droite.

Le duodenum s'étendoit dans le côté droit jusqu'au-delà du rein, & il se replioit en dedans avant de se joindre au jejunum ; cet intestin faisoit ses circonvolutions dans la partie antérieure de la région ombilicale, dans la région épigastrique & dans le côté gauche ; les circonvolutions de l'ileum étoient dans le côté droit, & il aboutissoit au cœcum dans la partie postérieure de la région ombilicale. Le cœcum avoit beaucoup de volume ; il s'étendoit depuis la partie postérieure de la région ombilicale dans l'iliaque gauche où il se replioit en bas sous lui-même, ensuite il passoit de l'iliaque gauche dans l'iliaque droite en traversant la partie postérieure de la région

ombilicale; enfin il se replioit en avant dans l'iliaque droite & s'étendoit jusque dans l'hypocondre droit, où son extrémité se replioit en dehors & se prolongeoit en arrière jusqu'au-delà du rein. Les circonvolutions du colon étoient dans la région hypogastrique & dans l'iliaque droite où elles formoient une spirale comme dans le rat d'eau & le campagnol, ensuite le colon s'étendoit sur les autres intestins depuis l'iliaque droite jusqu'à la région épigastrique où il se recourboit à gauche, & enfin il s'étendoit en arrière avant de se joindre au rectum.

Les intestins grêles avoient deux pieds & demi de long depuis le pylore jusqu'au cœcum, la longueur de cet intestin étoit de sept pouces, & celle du colon d'un pied dix pouces. L'estomac & les intestins avoient beaucoup de rapport à ces mêmes viscères vus dans le rat d'eau, tant pour leur longueur & leurs différentes grosseurs, que pour leur conformation à l'extérieur & à l'intérieur.

Le foie avoit quatre grands lobes semblables à ceux du rat d'eau \*, mais je n'en ai pas trouvé deux autres petits qui correspondissent au cinquième & au sixième lobe du foie de cet animal : il y a lieu de croire qu'ils avoient été racornis & déformés par l'action de l'esprit-de-vin dans lequel l'ondatra, qui a servi de sujet pour cette description, avoit été gardé pendant plusieurs années. La rat

\* Voyez le *Volume XV* de cet Ouvrage, page 206.

étoit longue & avoit trois faces ; le rein droit étoit plus avancé que le gauche d'environ le tiers de sa longueur ; les poumons ressembloient à ceux du rat d'eau.


M. Sarrafin a observé <sup>a</sup> que les mamelles de l'ondatra sont au nombre de six , trois de chaque côté sur le ventre.

Le scrotum étoit très-large & contenoit de gros testicules. Le gland de la verge ressembloit à celui du rat , car il renfermoit un os qui paroissoit environné d'un second prépuce <sup>b</sup> ; cet os différoit de celui du rat d'eau , &c. en ce qu'il étoit composé de quatre pièces , dont trois étoient fort petites & se trouvoient à l'extrémité antérieure de la quatrième qui étoit beaucoup plus grande. Les parties internes de la génération , & sur-tout les vésicules séminales , ressembloient beaucoup à celles du rat d'eau , autant que j'ai pu juger de tous les rapports de ressemblance & de différence sur un animal qui avoit été pendant long-temps dans l'esprit-de-vin. Aussi n'ai-je pas trouvé que les glandes ou follicules dont les canaux excrétoires aboutissent au bord du prépuce comme dans le rat <sup>c</sup> , le rat d'eau , &c. eussent une odeur de musc plus forte que celle des autres parties du corps de

<sup>a</sup> Mémoires de l'Académie royale des Sciences , année 1725 , page 334.

<sup>b</sup> Idem , page 190.

<sup>c</sup> Voyez le Volume XV de cette Histoire naturelle , page 122.



*De Seve del.*

*Baron Sculp.*

L'ONDATRA.








De Sève del.

LE DESMAN.

Herissey fils sculp.



Ondatra. Suivant les observations de M. Sarrafin<sup>a</sup>, les parties de la génération de la femelle de l'ondatra ressemblent à celles de la femelle du rat, sur-tout par la situation de l'urètre<sup>b</sup>.


La seule différence marquée que j'aie reconnue entre le squelette de l'ondatra & celui du rat d'eau, pour la figure des os de la tête, est que l'os frontal est plus large entre les deux orbites du rat d'eau qu'entre celles de l'ondatra, où cet os ne forme qu'une arête fort étroite.

L'ondatra a seize dents comme le rat d'eau, une incisive & trois mâchelières de chaque côté de chacune des mâchoires; les dents de ces deux animaux ne diffèrent qu'en ce que la couleur orangée de la face antérieure des incisives de l'ondatra qui a servi de sujet pour cette description, étoit plus foncée que dans le rat d'eau, & que la partie de chaque mâchelière qui sortoit au dehors de la gencive étoit noire.

Les trous ovalaires sont à proportion plus étroits dans l'ondatra, parce que les os ischioïques qui font partie des bords de ces trous sont moins échancrés que dans le rat d'eau.

<sup>a</sup> Voyez les Mémoires de l'Académie royale des Sciences; année 1725; page 333.

<sup>b</sup> Voyez le Volume XV de cet Ouvrage, page 125.



## LE PECARI ou LE TAJACU \*.

L'ESPÈCE du Pecari est une des plus nombreuses & des plus remarquables parmi les animaux du nouveau

\* Le *Pecari*, le *sanglier pecari*, nom que les François habitués dans l'Amérique méridionale ont donné à cet animal, & que nous avons adopté.

Sanglier appelé *Pecari*. Voyage de Desmarchais, tome III, page 312. — Cochon qu'on appelle *pecari*. Voyage de Wafer imprimé à la suite de celui de Dampier. Rouch, 1715, tome IV, page 222. — *Pecaris*, espèce de cochons sauvages. Voyage de Dampier; tome IV, page 69.

Nota. Il y a peu d'animaux qui aient reçu autant de différens noms que celui-ci : les Sauvages du Brésil l'appeloient *Tajassou* suivant de Lery; *Tajacu* suivant Pilon & Marcgrave; *Caaigoara* aussi suivant Marcgrave; *Tajoussou* suivant Coreal ( Voyage aux Indes orientales. Paris, 1722, tome I, page 173 ). Les Mexicains l'appeloient *Quauhthi coymatl*, ou *Quapizotl* ou *Coyameth*. Les Voyageurs l'ont aussi désigné par des noms différens; il s'appelle *Pelas* à la baie de tous les Saints suivant Dampier ( tome IV, page 69 ). *Javari* ou *Paquiré* à l'île de Tabago suivant Rochefort ( Relation de l'île de Tabago. Paris, 1666, page 31 ). *Paquirá* dans le pays des Amazones selon Jumilla ( Avignon, 1758, tome II, page 6 ). *Saino* ou *Zaino* dans plusieurs endroits de l'Amérique selon Joseph Acosta ( Paris, 1600, page 196 ). *Chuchie*

monde. Le pecari ressemble au premier coup d'œil à notre sanglier, ou plutôt au cochon de Siam qui, comme nous l'avons dit, n'est, ainsi que notre cochon domestique, qu'une variété du sanglier ou cochon sauvage; aussi le pecari a-t-il été appelé *Sanglier* ou *Cochon d'Amérique*: cependant il est d'une espèce particulière, & qui ne peut se mêler avec celle de nos sangliers ou cochons,

selon Oviedo (*Vide* Hernand. *Hist. Mex.* p. 649).  
*Coscui* selon Coreal (*Voyage de Coreal, tome 1, page 84.*

*Aper Mexicanus.* Faber, *apud* Hernand. *Hist. Mex.* pag. 637.

*Sus umbilicum in dorso habens.* Aldrov. *de quadrup. bisul.* p. 939.

*Tajacu.* Pison, *Hist. Brasil.* pag. 98; & Marcgr. *Hist. nat. Brasil.* pag. 229.

*Tajacu seu aper Mexicanus moschiferus.* Ray, *Synops. quadrup.* pag. 97.

*Sus minor umbilico in dorso.* Cochon noir. Barrère; *Hist. Franc. équin.* pag. 161.

*Sus dorso cystifero caudâ nullâ.* Linn. *Syst. nat.* edit. IV, pag. 69; & edit. VI, pag. 12. — *Tajacu.*  
*Sus dorso cystifero caudâ nullâ,* edit. X, page 50.

*Sus ecaudatus, folliculum ichorosum in dorso gerens.*  
*Aper Mexicanus.* Le sanglier du Mexique. Briffon, *Regn. animal.* pag. 111.

comme nous nous en sommes assurés par des essais réitérés , ayant nourri & gardé pendant plus de deux ans un pecari avec des truies sans qu'il ait rien produit. Il diffère encore du cochon par plusieurs caractères essentiels , tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ; il est de moindre corpulence & plus bas sur ses jambes ; il a l'estomac & les intestins différemment conformés ; il n'a point de queue , ses foies sont beaucoup plus rudes que celles du sanglier ; & enfin il a sur le dos , près de la croupe , une fente de deux ou trois lignes de largeur , qui pénètre à plus d'un pouce de profondeur , par laquelle suinte une humeur ichoreuse fort abondante & d'une odeur très-désagréable : c'est de tous les animaux le seul qui ait une ouverture dans cette région du corps ; les civettes , le blaireau , la genette ont le réservoir de leur parfum au-dessous des parties de la génération ; l'ondatra ou rat musqué de Canada , le musc ou chevreuil du musc l'ont sous le ventre. La liqueur qui sort de cette ouverture , que le pecari a sur le dos , est fournie par de grosses glandes que M. Daubenton



a décrites avec soin<sup>a</sup>, aussi-bien que toutes les autres singularités de conformation qui se trouvent dans cet animal. On en voit aussi une bonne description faite par Tyson dans les *Transactions Philosophiques*, *numéro 153*. Je ne m'arrêterai pas à exposer en détail les observations de ces deux habiles Anatomistes, & je remarquerai seulement que le Docteur Tyson s'étoit trompé en assurant que cet animal avoit trois estomacs, ou, comme le dit Ray<sup>b</sup>, un gésier & deux estomacs. M. Daubenton démontre clairement qu'il n'a qu'un seul estomac, mais partagé par deux étranglemens qui en font paroître trois ; qu'il n'y a qu'une seule de ces trois poches qui ait une issue de sortie ou pylore, & que par conséquent on ne doit regarder les deux autres poches que comme des appendices, ou plutôt des portions du même estomac, & non pas comme des estomacs différens.

Le pecari pourroit devenir animal domestique comme le cochon ; il est à peu

<sup>a</sup> Voyez ci-après la description du Pecari.

<sup>b</sup> Ray, *Synops. quadrup.* pag. 99.

près du même naturel ; il se nourrit des mêmes alimens ; sa chair, quoique plus sèche & moins chargée de lard que celle du cochon, n'est pas mauvaise à manger : elle deviendrait meilleure par la castration : lorsqu'on veut manger de cette viande il faut avoir grand soin d'enlever au mâle non-seulement les parties de la génération, comme l'on fait au sanglier, mais encore toutes les glandes qui aboutissent à l'ouverture du dos dans le mâle & dans la femelle ; il faut même faire ces opérations au moment qu'on met à mort l'animal, car si l'on attend seulement une demi-heure sa chair prend une odeur si forte qu'elle n'est plus mangeable.

Les pecaris sont très-nombreux dans tous les climats chauds de l'Amérique méridionale ; ils vont ordinairement par troupes, & sont quelquefois deux ou trois cents ensemble ; ils ont le même instinct que les cochons pour se défendre, & même pour attaquer ceux surtout qui veulent ravir leurs petits ; ils se secourent mutuellement, ils enveloppent leurs ennemis, & blessent souvent les

chiens & les Chasseurs. Dans leur pays natal ils occupent plutôt les montagnes que les lieux bas ; ils ne cherchent pas les marais & la fange comme nos sangliers ; ils se tiennent dans les bois où ils vivent de fruits sauvages , de racines , de graines ; ils mangent aussi les serpens , les crapaux , les lézards qu'ils écorchent auparavant avec leurs pieds : ils produisent en grand nombre & peut-être plus d'une fois par an ; les petits suivent bien-tôt leur mère & ne s'en séparent que quand ils sont adultes : on les apprivoise , ou plutôt on les prive aisément en les prenant jeunes ; ils perdent leur férocité naturelle , mais sans se dépouiller de leur grossièreté , car ils ne connoissent personne , ne s'attachent point à ceux qui les soignent ; seulement ils ne font point de mal , & l'on peut , sans inconvéniens , les laisser aller & venir en liberté ; ils ne s'éloignent pas beaucoup , reviennent d'eux-mêmes au gîte , & n'ont de querelle qu'auprès de l'auge ou de la gamelle , lorsqu'on la leur présente en commun : ils ont un grognement de colère plus fort & plus dur que celui du cochon , mais on les

entend très-rarement crier ; ils soufflent aussi comme le sanglier lorsqu'on les surprend & qu'on les épouvante brusquement ; leur haleine est très-forte , leur poil se hérissé lorsqu'ils sont irrités ; il est si rude qu'il ressemble plutôt aux piquans du hérisson qu'aux soies du sanglier.

L'espèce du pecari s'est conservée sans altération & ne s'est point mêlée avec celle du *cochon maron* ; c'est ainsi qu'on appelle le cochon d'Europe transporté & devenu sauvage en Amérique : ces animaux se rencontrent dans les bois & vont même de compagnie sans qu'il en résulte rien ; il en est de même du cochon de Guinée qui s'est aussi multiplié en Amérique , après y avoir été transporté d'Afrique. Le cochon d'Europe , le cochon de Guinée & le pecari sont trois espèces qui paroissent être fort voisines , & qui cependant sont distinctes & séparées les unes des autres , puisqu'elles subsistent toutes trois dans le même climat sans mélange & sans altération : notre sanglier est le plus fort , le plus robuste & le plus redoutable des trois ; le pecari

quoiqu'assez féroce est plus foible , plus pesant & plus mal armé ; ces grandes dents tranchantes qu'on appelle *défenses* , sont beaucoup plus courtes que dans le sanglier ; il craint le froid & ne pourroit subsister sans abri dans notre climat tempéré , comme notre sanglier ne peut lui-même subsister dans les climats trop froids : ils n'ont pu ni l'un ni l'autre passer d'un continent à l'autre par les terres du Nord ; ainsi l'on ne doit pas regarder le pecari comme un cochon d'Europe dégénéré ou dénaturé sous le climat d'Amérique , mais comme un animal propre & particulier aux terres méridionales de ce nouveau continent.

Ray & plusieurs autres Auteurs ont prétendu que la liqueur du pecari , qui suinte par l'ouverture du dos , est une espèce de musc , un parfum agréable , même au sortir du corps de l'animal ; que cette odeur agréable se fait même sentir d'assez loin , & parfume les endroits où il passe & les lieux qu'il habite. J'avoue que nous avons éprouvé mille fois tout le contraire ; l'odeur de cette liqueur , au sortir du corps de l'animal , est si desa-

gréable que nous ne pouvions la sentir ;  
ni la faire recueillir sans un extrême  
dégoût ; il semble seulement qu'elle  
devienne moins fétide en se desséchant  
à l'air , mais jamais elle ne prend l'odeur  
suave du musc ni le parfum de la civette ,  
& les Naturalistes auroient parlé plus  
juste s'ils l'eussent comparée à celle du  
Castoreum.





# DESCRIPTION

## DU PECARI.

**L**E Pecari (*pl. III*) ressemble beaucoup aux cochons par la forme du corps, & même par la conformation des parties extérieures qui caractérisent ces animaux & qui les font distinguer des autres ; il a la tête grosse, le museau allongé & terminé par un groin de cochon, le cou gros & court, le corps épais, les jambes courtes & le pied fourchu. Le pecari qui a servi de sujet pour cette description, étoit plus petit que les cochons domestiques & presque aussi grand qu'un cochon de Siam de médiocre grandeur : il ressembloit même plus à ceux de cette race qu'à ceux de la race domestique ; il n'y avoit point d'enfoncement sur le bas du front ; les oreilles étoient petites & droites. Les défenses du dessous ne sortoient pas au dehors des lèvres, elles formoient seulement une convexité de chaque côté dans la lèvre supérieure à l'endroit des défenses du dessus : cet animal n'a point de queue.

Mais le caractère le plus particulier au pecari & le plus extraordinaire est un orifice assez grand, placé au-dessus de la croupe (*pl. IV, où le pecari est vu par-derrière pour faire paroître cet orifice*) ; lorsque l'on com-

primoit les environs de ses bords, il en sortoit une liqueur qui s'échappoit d'abord par jets & couloit ensuite peu à peu : cet orifice étoit caché sous les soies de l'animal, & placé au milieu d'un espace où il ne s'en trouvoit point de grosses comme sur le reste du corps ; il y avoit seulement un poil noir, doux & assez rare, de sorte que l'on voyoit la peau qui étoit aussi fort douce & de couleur brune. Les bords de l'orifice étoient un peu saillans ; dans l'état naturel il formoit une fente qui avoit deux lignes de longueur, & en effet on pouvoit y introduire un stilet de deux lignes de diamètre qui pénéroit jusqu'à environ un pouce de profondeur.

Les soies du pecari avoient beaucoup plus de rapport aux piquans du hérifson qu'aux soies des cochons, & même du sanglier, car elles étoient plus grosses & plus fermes, en partie noires ou brunes, & en partie blanches ou fauves. Les plus longues avoient jusqu'à quatre pouces & demi ; elles étoient placées entre les oreilles le long du cou & du dos, où elles formoient une sorte de crinière qui se hériffoit au gré de l'animal ; les soies de la tête, des côtés du cou & du corps, & celles de la face extérieure de la cuisse avoient moins de longueur ; celles du museau, de la poitrine, du ventre & des jambes étoient fort courtes & entièrement noires, principalement sur le chanfrein, sur la face extérieure de l'avant-bras & sur le bas des quatre jambes.

Les soies qui avoient plusieurs couleurs étoient brunes près de la racine ; il y avoit du blanc ou du fauve au-dessus du brun ; plus haut elles étoient alternativement noires & blanches , ou fauves jusqu'à la pointe qui avoit une couleur noire : mais ces couleurs étoient distribuées irrégulièrement , car les soies avoient du blanc ou du fauve en un , ou deux , ou trois endroits ; celles qui étoient entre les oreilles avoient beaucoup de noir vers la pointe ; au contraire il s'en trouvoit sur le cou qui avoient peu de noir à la pointe , mais elles étoient fauves sur un assez long espace au - dessous de la pointe , & l'assemblage de ces soies formoit sur les côtés & le dessus du cou une sorte de collier de couleur fauve qui avoit environ un pouce de largeur. Au reste, la plus grande partie du corps de cet animal étoit mouchetée de noir & de blanc , ou de fauve ; on ne voyoit du blanc que sur le dos , & le fauve se trouvoit sur la tête , sur les côtés du corps , &c. Les oreilles , la partie antérieure de la poitrine , les aisselles , la face intérieure de l'avant-bras , le milieu du ventre , les aines & la face intérieure de la cuisse & de la jambe étoient presque nus.

Les ergots des pieds de devant étoient plus longs que ceux des pieds de derrière , qui n'avoient point d'ergot extérieur. Les défenses du dessus sortoient un peu au dehors de la bouche ; mais celles du dessous glissoient le long de la face antérieure des défenses du

dessus ; & même le long de la gencive sous la lèvre supérieure. Quoique cet animal n'eût point de queue , le bord supérieur de l'anüs formoit cependant un tubercule d'un demi-pouce de longueur , de sept lignes d'épaisseur & de dix lignes de largeur à sa base , ce tubercule se rabattoit sur l'anüs & en fermoit exactement l'ouverture ; il y avoit un os au dedans , & il ressembloit à une petite queue.

	pieds. pouc. lignes		
Longueur du corps entier , mesuré en ligne droite depuis le boutoir jusqu'à l'anüs.....	2.	7.	11
Hauteur du train de devant.....	1.	6.	6.
Hauteur du train de derrière.....	1.	4.	4.
Longueur de la tête , depuis le boutoir jusqu'à l'entre-deux des oreilles...	11	10.	11
Circonférence du bout du groin , prise sur le boutoir.. . . . .	11	5.	4.
Circonférence du groin , prise derrière le boutoir à l'endroit le plus mince. 11	4.	8.	
Circonférence prise sur les coins de la bouche.....	1.	11	11
Circonférence prise au-dessus des yeux. 1.	3.	6.	
Contour de la bouche depuis l'une des commissures des lèvres jusqu'à l'autre. 11	7.	4.	
Distance entre les deux naseaux... 11	11	6 $\frac{1}{2}$	
Distance entre le boutoir & l'angle antérieur de l'œil..... 11	6.	11	
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille..... 11	3.	11	

Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. # #	11.	
Ouverture de l'œil. . . . . # #	7.	
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en suivant la courbure du chanfrein. . . . . #	4.	6.
La même distance mesurée en ligne droite. . . . . #	2.	9.
Circonférence de la tête, prise entre les yeux & les oreilles. . . . . 1.	10.	#
Longueur des oreilles. . . . . #	2.	4.
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure. . . . . #	3.	#
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas. . . . . #	2.	8.
Longueur du cou. . . . . #	3.	9.
Circonférence prise derrière les oreilles. 1.	8.	#
Circonférence prise devant les épaules. 1.	11.	4.
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant. . . . . 2.	4.	9.
Circonférence à l'endroit le plus gros. 2.	7.	8.
Circonférence prise devant les jambes de derrière. . . . . 2.	4.	#
Hauteur du bas du ventre au-dessus de terre sous les flancs. . . . . #	8.	#
La même hauteur sous la poitrine. . . #	7.	6.
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet. . . . . #	5.	6.
Circonférence à l'endroit le plus gros. #	6.	8.
Largeur de l'avant-bras au coude. #	2.	9.

	pieds.	pouc.	ligne
Épaisseur au même endroit . . . . .	"	1.	5.
Circonférence du poignet . . . . .	"	3.	10.
Circonférence du métacarpe . . . . .	"	3.	2.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des sabots . . . . .	"	4.	6.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon . . . . .	"	7.	"
Circonférence près du ventre . . . . .	"	9.	6.
Largeur à l'endroit des talons . . . . .	"	1.	11.
Circonférence du métatarse . . . . .	"	3.	8.
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des sabots . . . . .	"	6.	4.
Longueur des ergots . . . . .	"	"	10.
Hauteur des sabots . . . . .	"	1.	1.
Longueur depuis la pince jusqu'au derrière de la corne . . . . .	"	1.	1.
Longueur depuis la pince jusqu'au derrière du pied . . . . .	"	1.	3.
Largeur des deux sabots, prise ensem- ble dans les pieds de devant . . . . .	"	1.	5.
Largeur dans les pieds de derrière . . .	"	1.	1.
Distance entre les deux sabots . . . . .	"	"	3.
Circonférence des deux sabots réunis, prise sur les pieds de devant . . . . .	"	4.	3.
Circonférence sur les pieds de derrière .	"	3.	4.
Circonférence de la couronne dans les pieds de devant . . . . .	"	4.	3.
Circonférence dans les pieds de derrière .	"	3.	4.



Ce pecari étoit mâle , & il pesoit quarante-deux livres & demie. En enlevant la peau il s'est trouvé à l'endroit de l'orifice (*A*, *pl. v*) qui paroissoit au dehors sur la croupe , à trois pouces neuf lignes de distance de l'anus (*B*) , une très-grosse glande (*CD* *vue par-dessus*, *pl. v*; & *AB* *vue par-dessous*, *pl. VI*) : elle étoit de figure ovale, convexe sur sa face supérieure & plate sur l'inférieure ; son grand diamètre avoit quatre pouces quatre lignes de longueur , & le petit trois pouces : l'épaisseur étoit d'un pouce trois lignes dans le milieu , & d'environ un demi-pouce sur les bords. Elle tenoit à un muscle peaucier (*CD*, *pl. VI*) qui s'étendoit sur le dos & sur les côtés du corps ; ce muscle avoit une ligne & demie d'épaisseur ; il se prolongeoit sous les bords de la glande (*jusqu'à l'endroit EEE*), & il y avoit une aponévrose fort mince qui revêtoit la face inférieure (*AB*) de cette glande : après avoir enlevé le muscle (*CD*) , on voyoit sur la face interne (*FG*) de la peau les racines des soies. En ouvrant la glande j'ai trouvé une sorte de basset ou de poche qui avoit un pouce de profondeur, neuf lignes de largeur de devant en arrière , & dont les parois latérales étoient à une distance fort petite l'une de l'autre. La substance de la glande étoit composée de petits corps glanduleux pelotonnés ensemble , adhérens les uns aux autres , & de couleur jaunâtre.

A l'ouverture de l'abdomen, je n'ai vu

qu'une très - petite portion de l'épiploon qui recouvroit le troisième estomac (*A*, *pl. VII*, *fig. 1 & 2*) dans le côté droit. Je dis le troisième estomac, parce qu'on en a distingué trois dans le pecari; mais je ne les distingue ici que pour désigner plus clairement la situation du viscère que l'on a prétendu être triple dans cet animal. Ce viscère occupoit presque la moitié antérieure de l'abdomen; l'une (*B*, *fig. 1*) des cornes du second estomac (*C*, *fig. 1 & 2*) étoit placée près du cartilage xiphoïde & du foie; & l'autre (*D*) dans le côté gauche contre la rate. Le premier estomac (*E E*) se trouvoit entre ces deux cornes sur les fausses côtes & un peu en arrière; le troisième estomac (*A*) étoit dans le côté droit, il tenoit au premier (*E E*) & il touchoit à la corne antérieure (*B*, *fig. 1*) du second, au foie & à la rate. Le foie se trouvoit en entier dans le côté droit. La rate s'étendoit transversalement de gauche à droite dans le milieu de l'abdomen à l'endroit où les estomacs touchoient aux intestins. Le cœcum étoit à gauche dans la partie postérieure de l'abdomen; le colon faisoit de grandes circonvolutions à peu près ovales, placées obliquement de droite à gauche, & de devant en arrière dans le milieu & dans le côté gauche de l'abdomen; enfin on voyoit quelques portions des intestins grêles dans la région hypogastrique.

Le duodenum (*L K*, *pl. VII*, *fig. 1*;

& *Q R*, *fig. 2*) formoit quelques petites sinuosités dans la région épigastrique ; les circonvolutions du jejunum étoient dans la même région sur les estomacs ; celles de l'ileum se trouvoient dans la région ombilicale sur les grandes circonvolutions ovales du colon, dont il a déjà été fait mention, & dans la région hypogastrique.

Les intestins grêles avoient tous à peu près la même grosseur jusqu'à l'extrémité (*A*, *pl. VIII*, *fig. 1*) de l'ileum ; le cœcum (*B*) étoit gros, court & pointu ; le commencement (*C*) du colon étoit aussi gros que celui (*D*) du cœcum à l'endroit où ces deux intestins se touchoient, mais le colon diminuoit peu à peu de grosseur jusqu'au rectum qui avoit à peu près le même diamètre dans toute son étendue.

L'estomac du pecari a une figure si irrégulière & si extraordinaire que Tyson en a compté trois ; mais Falcoburgius n'en reconnoît qu'un avec deux appendices.

En supposant qu'un estomac doive avoir deux orifices, & qu'il en faille trois pour distinguer deux estomacs dans le même animal, on peut conclure que le pecari n'a qu'un seul estomac, car il n'a que deux orifices, comme l'estomac de l'homme & de la plupart des animaux. Les alimens y entrent par l'orifice qui est à l'extrémité de l'œsophage (*F*, *pl. VII*, *fig. 1 & 2*) & en sortent par le pylore (*G*) ; mais l'estomac du pecari

a tant d'étranglemens, de renflemens & d'appendices qu'il paroît former plusieurs estomacs lorsqu'on ne l'observe qu'à l'extérieur, aussi m'a-t-il paru à la première inspection des viscères de cet animal, qu'il avoit plusieurs estomacs : j'ai décrit plus haut leur situation en les supposant au nombre de trois. Après avoir introduit de l'air dans ces prétendus estomacs, j'ai cru en distinguer au moins deux, mais après les avoir ouverts j'ai reconnu bien distinctement qu'il n'y en avoit qu'un seul.

La partie (*EE*, *fig. 1 & 2*) que Tyson \* donne pour le premier estomac, parce qu'elle est le plus près de l'orifice de l'œsophage (*F*), n'est séparée de la partie gauche (*BCD*, *fig. 1*), que le même Auteur appelle le *second estomac*, & de la partie droite (*A*, *fig. 1 & 2*) qu'il nomme le *troisième estomac*, que par des étranglemens (*HI*) qui ne forment point d'orifice au dedans; quoique la cavité de l'estomac soit rétrécie dans ces deux endroits, elle a cependant sept pouces de tour dans l'étranglement (*H*) du côté droit, & dix pouces dans celui (*I*) du côté gauche. De telles ouvertures ne doivent pas être regardées comme des orifices dans l'estomac d'un animal de la taille du pecari, d'autant plus qu'il n'y a au dedans de l'étranglement gauche qu'un ligament musculueux pareil à celui qui se trouve à l'entrée des

\* Transactions Philosophiques, numéro 20, année 1683.

deux convexités postérieures de la panse du bœuf<sup>a</sup> & des autres ruminans.

Il m'a paru que l'étranglement (*I*) du côté gauche n'est formé que par la base des deux prolongemens (*B D*, *fig. 1*; & *D*, *fig. 2*) qui ressemblent en quelque sorte à deux cornes, & qui tiennent au grand cul-de-sac (*C*, *fig. 1*) de l'estomac du pecari, comme le prolongement qui est au fond du grand cul-de-sac de l'estomac du sanglier, du cochon de Siam & du cochon domestique<sup>b</sup>. L'étranglement (*H*, *fig. 1* & *2*) du côté droit, qui est à peu près à égale distance du pylore (*G*) & de l'insertion de l'œsophage (*F*), se trouve marqué, au moins en partie, dans la plupart des animaux quadrupèdes qui n'ont qu'un estomac, car il y a un angle très-aigu sur le côté antérieur de la partie droite de leur estomac.

La partie *EE*, *fig. 1* & *2*, de l'estomac avoit un pied trois pouces de circonférence longitudinale, prise au côté gauche *K*, *fig. 2*, de l'œsophage; cette circonférence s'étendoit de part & d'autre jusqu'à l'endroit *L*. La circonférence transversale de cette même partie, prise aux endroits *M N*, étoit d'un pied quatre pouces. La partie *NO*, *fig. 1*, avoit en circonférence un pied neuf pouces &

<sup>a</sup> Voyez le tome VIII de cet Ouvrage, planche V, figures 1 & 2.

<sup>b</sup> Voyez le tome IX de cet Ouvrage, planche XVIII, figure 1.

de mi. La grande circonférence de la partie *A*, fig. 2, étoit d'un pied six lignes, & la petite circonférence de huit pouces quatre lignes étant prise aux endroits *O P*.

On a représenté, *planche IX*, les parois intérieures *ABC* de l'estomac, une portion *DE* du duodenum, & la partie inférieure *F* de l'œsophage. Cet estomac a été coupé dans les endroits *KLMHE*, *pl. VII*, fig. 1, jusqu'à *C*, & dans les endroits *BCD*, de sorte que les parties *GGHH*, *pl. IX*, correspondent aux parties *EE*, *pl. VII*, fig. 2. La partie *I*, *pl. IX*, correspond à la partie *C*, *pl. VII*, fig. 1. La partie *A*, *pl. IX*, correspond à la partie *B*, *pl. VII*, fig. 1. La partie *B*, *pl. IX*, correspond à la partie *D*, *pl. VII*, fig. 1; & la partie *KK*, *pl. IX*, correspond à la partie *A*, *pl. VII*, fig. 1. Ainsi pour rapprocher toutes les parties qui ont été séparées par la coupe, il faudroit que les bords *L MNO*, *pl. IX*, fussent appliqués contre les bords *PQRS*, & les bords *TVIX* contre les bords *YPLZ*. Les parties *GGHH* étoient revêtues d'une membrane blanche & dure dont les bords *aaaaaa* étoient dentelés : cette membrane ressembloit à celle dont il a été fait mention dans la description de l'estomac du cheval, du cochon, du rat d'eau & du campagnol. Les membranes intérieures de la partie *KK*, *pl. IX*, qui correspondoit à la partie *A*, *pl. VII*,

*fig. 1 & 2*, étoient fort épaisses, & formoient des plis qui avoient rapport à ceux de la caillette des ruminans : les membranes du reste de l'estomac du pecari étoient fort minces, & ne différoient pas de celles de l'estomac de la plupart des autres quadrupèdes.

Le foie étoit composé de trois grands lobes, & il avoit un ligament suspensoir (*A, pl. X, fig. 1*) placé dans une profonde scissure (*B*) du lobe moyen (*C D*), & qui se trouvoit à peu près dans le milieu du foie : cependant ce viscère étoit presque en entier du côté droit, les estomacs occupant le côté gauche. Tyson a compté quatre grands lobes dans le foie du pecari, & Falcoburgius prétend qu'il n'a point de ligament suspensoir ; le foie du pecari que je décris en avoit un (*tel qu'il est représenté A, pl. X, fig. 1*), & ce foie n'étoit composé que de trois grands lobes, en ne prenant pour des lobes distincts que ceux qui sont séparés des autres jusqu'à la racine du foie. En regardant celui-ci par sa face postérieure, il paroissoit en effet composé de quatre lobes, parce que la scissure (*B*), où se trouvoit le ligament suspensoir, étoit très-profonde, & s'étendoit presque jusqu'à la racine du foie sur cette face ; mais en le retournant on voyoit que la même scissure ne s'étendoit que jusqu'à la partie moyenne (*E*) du lobe sur sa face antérieure : cette scissure partageoit le lobe moyen en deux portions (*C D*) à peu près égales ; celle du dessus (*C*)



étoit sous-divisée en deux parties (*FG*) par une petite scissure (*H*) où auroit été la vésicule du fiel si le pecari en avoit eu une comme le sanglier, le cochon de Siam & le cochon domestique. Le lobe antérieur (*I*) étoit plus alongé, mais beaucoup plus étroit que le moyen; le lobe postérieur (*K*) étoit le plus petit des trois, & il avoit deux ou trois appendices près de sa racine. Il se trouvoit encore dans ce foie des échancrures & de petites scissures qui ne m'ont paru que des variétés accidentelles. Ce viscère étoit de couleur rougeâtre, plus pâle au dehors qu'au dedans: il pesoit dix onces cinq gros.

La rate (*pl. X, fig. 2*) étoit plate & peu épaisse; sa partie droite (*A*) étoit fort large, & diminuoit peu à peu de largeur jusqu'à la partie gauche (*B*) qui étoit terminée en pointe: ce viscère avoit au dehors une couleur brune-grisâtre, & au dedans une couleur rouge-noirâtre: il pesoit une once deux gros.

Le pancréas étoit placé en entier du côté gauche; il avoit deux branches, la plus longue s'étendoit en arrière jusqu'à l'extrémité gauche de la rate, c'est-à-dire, jusque dans le milieu de l'abdomen, comme il a déjà été dit; la petite branche étoit dirigée du côté du duodenum.

Le rein gauche (*pl. VIII, fig. 2*) étoit mince & alongé, il avoit peu d'enfoncement (*A*); le bassinet étoit aussi très-peu étendu, & on ne distinguoit presque aucun  
des

des mamelons. Le rein droit (*fig. 3*) étoit difforme sur sa face inférieure (*A*), parce qu'il portoit l'empreinte du troisieme estomac, qui avoit formé une troisieme face (*B*) sur la partie antérieure du rein.

Le centre nerveux du diaphragme étoit très-luisant & assez mince, mais la partie charnue avoit beaucoup d'épaisseur.

Le poumon gauche n'avoit que deux lobes (*AB, pl. XI*); ils ressembloient à ceux de la plupart des animaux quadrupèdes. Je n'ai pas vu le troisieme dont Falcoburgius a fait mention. Le poumon droit étoit composé d'un très-grand lobe (*C*) & de trois petits, dont l'un se trouvoit près de la base du cœur : une partie du grand lobe (*C*) sembloit tenir la place d'une partie du lobe moyen & du lobe antérieur presque entier, de sorte que le lobe antérieur (*D*) étoit le plus petit de tous, & que le lobe moyen n'avoit pas autant d'étendue que dans les autres animaux où il se trouve. Il y avoit dans la partie supérieure du grand lobe une vessie (*E*) qui s'étendoit presque d'un bout à l'autre; cette vessie s'est remplie d'air lorsque l'on a soufflé le poumon, & l'air y est resté quoique le poumon se soit désenflié : elle étoit presque cylindrique, & avoit six pouces & demi de longueur sur deux pouces de diamètre dans les endroits les plus gros; ses parois étoient fort minces & aussi transparentes qu'une membrane allantoïde. Le lobe postérieur

droit avoit aussi une vessie (*F*), mais elle étoit un peu moins grande que l'autre, car elle n'avoit que trois pouces dix lignes de longueur, & un pouce huit lignes de diamètre dans les endroits les plus gros.

Le cœur (*A*, *pl. XII*, *fig. 1 & 2*) se trouvoit placé dans le milieu de la poitrine le long du sternum; sa pointe n'étoit que très-peu tournée à gauche.

L'aorte descendante (*BC*) étoit très-dilatée à environ quatre pouces de distance de la division du tronc (*D*, *fig. 1*) de l'aorte en ascendante (*E*, *fig. 1 & 2*) & en descendante. La dilatation de l'aorte descendante formoit une protubérance (*FG*, *fig. 1*) qui ressembloit à un anévrisme, & qui avoit cinq pouces sept lignes de longueur, & six pouces quatre lignes de circonférence à l'endroit le plus gros. Les membranes de cette portion de l'aorte étoient osseuses & si dures qu'elles résistoient au tranchant des ciseaux lorsque je les ai ouvertes dans leur longueur (*HHII*, *fig. 2*). Il s'est trouvé dans le dedans (*KL*) un très-gros caillot de sang qui est tombé de lui-même; en l'observant, j'y ai reconnu une substance polypeuse à laquelle le caillot adhéroit, & qui formoit l'un de ses côtés. Après en avoir séparé le sang & avoir étendu cette substance, elle s'est trouvée plate; elle avoit environ deux pouces de longueur & de largeur, & trois lignes d'épaisseur à l'endroit le plus épais, car elle étoit très-mince sur ses

Bords, & se terminoit par des fibres très-fines : cette substance étoit molle. Les membranes de l'aorte avoient un quart de ligne, & même une demi-ligne d'épaisseur dans quelques endroits de la croupe (*HI*) ; ses parois étoient en partie osseuses & en partie membraneuses. Sa substance osseuse étoit formée par écailles qui adhéroient aux parois intérieures de l'artère. La dilatation de l'aorte n'étoit pas une conformation accidentelle & particulière au pecari qui m'a servi de sujet pour cette description : il n'y a guère lieu de douter que tous les individus de cette espèce ne soient ainsi conformés, puisque celui qui a été décrit par Tyson avoit aussi l'aorte dilatée au même endroit ; cependant la forme du gonflement étoit différente, car il y avoit trois protubérances de grosseur inégale, peu éloignées l'une de l'autre ; la plus grosse étoit du côté du cœur, & la plus petite se trouvoit près des artères iliaques. Tyson a vu dans l'intérieur de deux de ces protubérances, qu'il ouvrit, des cellules que je n'ai pas trouvées dans mon sujet & qui n'y étoient pas, puisque dès que l'aorte fut ouverte, la substance qu'elle renfermoit tomba d'elle-même, comme je l'ai déjà fait remarquer.

La langue étoit, comme celle du cochon, parsemée de grains blancs & couverte de papilles très-fines. Il y avoit sur la partie postérieure deux glandes plates placées comme

celles de la langue du cochon , & à peu près de la même grandeur.

Le palais étoit traversé par environ quatorze sillons , dont les bords ressembloient , par leur forme & leur position , à ceux du palais du cochon. L'épiglotte étoit épaisse & échancrée dans le milieu de ses bords. Le cervelet étoit placé derrière le cerveau , comme le cervelet du cochon , mais les anfractuosités du cerveau & du cervelet du pecari n'étoient pas figurées comme celles du cerveau & du cervelet du cochon. Le cerveau du pecari pesoit deux onces cinq gros , & le cervelet quatre gros & vingt-six grains.

Je n'ai point reconnu de mamelons sur le ventre ni sur la poitrine , sans doute qu'ils étoient confondus avec des tubercules assez gros qui étoient sur la peau à la racine de chacune des soies.

Le pecari avoit pour la génération les mêmes parties que le sanglier , le verrat & le cochon de Siam : je n'y ai trouvé que des différences de proportion que l'on pourra reconnoître en comparant la table suivante avec celle des parties molles intérieures des cochons , qui est dans la description de ces animaux \*. Le gland du pecari avoit à proportion autant de longueur que celui des cochons , mais il étoit aplati sur les côtés , & sa pointe n'avoit qu'une très-petite courbure. Les deux plis de la verge n'étoient éloignés

\* Voyez le volume IX de cet Ouvrage , page 207.

l'un de l'autre que de neuf lignes. Les testicules & les tubercules des épidydimes n'étoient pas si gros à proportion que dans le verrat & le sanglier. La vessie avoit une figure fort irrégulière; elle étoit oblongue, & son côté supérieur étoit très-convexe, tandis que l'inférieur étoit presque plat sur sa longueur. J'ai vu dans les vésicules séminales des pelotons de matière épaisse & jaunâtre; il y avoit à la racine des vésicules deux glandes qui avoient chacune sept lignes de longueur, cinq lignes de largeur & trois lignes d'épaisseur; leur substance étoit compacte & jaunâtre; elles contenoient une liqueur fluide qui m'a paru suinter dans l'urètre par plusieurs petits orifices placés à quelque distance au devant des grands orifices des vésicules séminales. Les prostates étoient fort longues, & placées à côté de l'urètre comme celles du sanglier auxquelles elles ressembloient parfaitement. La substance intérieure des testicules avoit la même couleur & la même conformation que dans cet animal. Le pecari avoit aussi des cordons sous la verge comme les cochons.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur des intestins grêles depuis le pylore jusqu'au cœcum . . . . .	19.	"	"
Circonférence du duodenum dans les endroits les plus gros . . . . .	"	2.	9.
Circonférence dans les endroits les plus minces . . . . .	"	2.	"

	pieds.	poucs.	lignes
Circonférence du jejunum dans les endroits les plus gros.....	"	2.	3.
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	"	(2.	"
Circonférence de l'ileum dans les endroits les plus gros.....	"	3.	"
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	"	2.	9.
Longueur du cœcum.....	"	3.	6.
Circonférence à l'endroit le plus gros.	"	10.	6.
Circonférence à l'extrémité.....	"	1.	3.
Circonférence du colon dans les endroits les plus gros.....	"	8.	"
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	"	3.	6.
Circonférence du rectum près du colon.....	"	3.	6.
Circonférence du rectum près de l'anus.....	"	4.	6.
Longueur du colon & du rectum pris ensemble.....	8.	"	"
Longueur du canal intestinal en entier, non compris le cœcum..	27.	"	"
Circonférence de l'œsophage.....	"	1.	4.
Circonférence du pylore.....	"	1.	9.
Longueur du foie.....	"	6.	3.
Largeur.....	"	6.	2.
Sa plus grande épaisseur.....	"	1.	1.
Longueur de la rate.....	"	8.	1.



	pieds.	pouc.	lign.
Largeur dans le milieu.....	"	1.	7.
Largeur de l'extrémité droite.....	"	2.	1.
Largeur de l'extrémité gauche.....	"	"	5.
Épaisseur.....	"	"	5.
Épaisseur du pancréas.....	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des reins.....	"	2.	11.
Largeur.....	"	1.	5.
Épaisseur.....	"	"	9.
Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave jusqu'à la pointe...	"	1.	10.
Largeur.....	"	4.	2.
Longueur de la partie charnue entre le centre nerveux & le sternum.	"	1.	"
Largeur de chaque côté du centre nerveux.....	"	2.	"
Circonférence de la base du cœur.	"	6.	2.
Hauteur depuis la pointe jusqu'à la naissance de l'artère pulmonaire.	"	3.	"
Hauteur depuis la pointe jusqu'au sac pulmonaire.....	"	2.	2.
Longueur de la langue.....	"	5.	6.
Longueur de la partie antérieure depuis le filet jusqu'à l'extrémité.	"	2.	"
Largeur de la langue.....	"	"	11.
Longueur du cerveau.....	"	2.	6.
Largeur.....	"	2.	3.
Épaisseur.....	"	1.	1.
Longueur du cervelet.....	"	1.	1.

	pieds.	pouc.	lignes
Largeur.....	"	1.	6.
Épaisseur.....	"	"	11.
Distance entre l'anus & le scrotum.	"	1.	9.
Épaisseur du scrotum.....	"	2.	2.
Distance entre le scrotum & l'orifice du prépuce.....	"	8.	"
Distance entre les bords du prépuce & l'extrémité du gland.....	"	2.	5.
Longueur du gland.....	"	4.	2.
Largeur.....	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Épaisseur.....	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la verge depuis la bifur- cation des corps caverneux jusqu'à l'insertion du prépuce.....	"	6.	9.
Largeur de la verge.....	"	"	2.
Épaisseur.....	"	"	2 $\frac{3}{4}$ .
Longueur des testicules.....	"	1.	6.
Largeur.....	"	1.	1.
Épaisseur.....	"	"	7 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de l'épidydimé.....	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Épaisseur.....	"	"	1 $\frac{3}{4}$ .
Longueur des canaux déférens.....	"	9.	6.
Diamètre dans la plus grande partie de leur étendue.....	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Grande circonférence de la vessie...	1.	1.	"
Petite circonférence.....	"	10.	"
Longueur de l'urètre.....	"	3.	"
Circonférence.....	"	"	9.

Longueur des vésicules féminales. . .	»	2.	»
Largeur. . . . .	»	1.	2.
Épaisseur. . . . .	»	»	3 $\frac{1}{2}$ .

Le museau du squelette (*pl. XIII*) du pecari est moins alongé que celui du cochon à proportion de la longueur de la tête depuis les orbites des yeux jusqu'à l'occiput; le front est plus convexe que celui du cochon de Siam; mais le chanfrein ne forme point de concavité au devant des orbites, & le sommet de la tête est bien moins élevé que dans le sanglier & le cochon. La partie inférieure de la mâchoire du dessous est arquée sur sa longueur, les branches sont verticales & leur contour est plus arrondi & plus saillant que dans le sanglier & les cochons; le bord osseux des orbites est interrompu d'environ la dixième partie de leur circonférence; l'extrémité antérieure des os du nez est moins saillante que dans les cochons. L'os de la pomette & celui de la mâchoire supérieure forment de chaque côté de la tête une arête très-forte qui ne se trouve point sur l'os de la pomette du sanglier & des cochons, & qui est très-petite sur l'os de leur mâchoire. L'apophyse styloïde de l'os temporal du pecari est dirigée obliquement en bas & en arrière, & non pas verticalement en bas comme dans le sanglier & les cochons.

Le pecari a quatre dents incisives, deux

canines & douze mâchelières dans la mâchoire du dessus ; six incisives , deux canines & douze mâchelières dans celle du dessous , ce qui ne fait en tout que trente-huit dents au lieu de quarante-quatre qui se trouvent dans le sanglier & dans les cochons. La partie saillante des défenses de la mâchoire supérieure du pecari est dirigée en bas & un peu obliquement en dehors ; elle passe derrière la partie saillante des canines de la mâchoire du dessous qui est dirigée moins obliquement en dehors que dans le sanglier & les cochons , aussi elle approche de plus près l'os de la mâchoire supérieure , & elle passe à l'endroit où est la troisième dent incisive des cochons & contre l'arête osseuse qui est dans le pecari comme dans les cochons au-dessus des défenses de la mâchoire supérieure , le contact des défenses inférieures du pecari donne à cette arête une forme différente de celle qu'elle a dans les cochons , car au lieu d'être transversale elle est en grande partie verticale. Les mâchelières diffèrent principalement de celles des cochons en ce qu'elles ne sont pas hérissées de tubercules ; il n'y a point de dent mâchelière contre la défense du dessous , ni contre la défense du dessus comme dans les cochons , aussi ne s'en trouve-t-il que six de chaque côté de chacune des mâchoires , dans le pecari , au lieu de sept qui sont dans les cochons.

Les apophyses transverses de la première vertèbre cervicale du pecari ont moins de

longueur de devant en arrière que celles du cochon ; l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre est moins large , plus épaisse & moins inclinée en arrière ; celles de la troisième & de la quatrième vertèbre ne forment que de petites tubérosités.

Le pecari a , comme le cochon , quatorze vertèbres dorsales & quatorze côtes de chaque côté , sept vraies & sept fausses. Le sternum du squelette , qui sert de sujet pour cette description , paroît avoir été composé de six os comme celui du cochon , mais il n'y a que l'articulation du premier os avec le second , qui soit bien marquée ; on n'aperçoit que des vestiges de l'articulation du second os avec le troisième ; les autres os sont anchi-losés ; mais en comparant le sternum du pecari à celui du cochon , tant pour la forme que pour les articulations des côtes , on reconnoît qu'elles s'articulent avec les mêmes parties du sternum dans ces deux animaux.

Il n'y a que cinq vertèbres lombaires dans le pecari ; à juger du nombre des fausses vertèbres de l'os sacrum par le nombre des trous , il est composé de cinq fausses vertèbres : il n'y en a que sept dans la queue. Le côté supérieur de la partie antérieure de l'os de la hanche ne s'étend pas comme dans le cochon jusqu'à la seconde fausse vertèbre de l'os sacrum : les trous ovalaires ont à proportion moins de largeur.

Les os de l'épaule , du bras , de l'avant,

bras, de la cuisse, de la jambe, du carpe, du métacarpe, du tarse & des doigts des pieds de devant m'ont paru ne différer de ceux du cochon que par les dimensions. On pourra juger de ces différences en comparant la table suivante avec celle des dimensions des os du cochon<sup>a</sup>.

Il n'y a que trois os dans le métatarse & trois doigts dans les pieds de derrière<sup>b</sup>; le doigt du milieu & le doigt extérieur sont aussi grands l'un que l'autre, & à peu près aussi grands que les deux doigts du milieu des pieds de devant; le doigt intérieur des pieds de derrière est beaucoup plus petit que les deux autres & à peu près de même longueur que les doigts extérieur & intérieur des pieds de devant, quoique son ergot soit plus petit que celui de ces deux doigts, comme il a déjà été dit au commencement de cette description.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur de la tête mesurée en ligne droite depuis le bout de la mâchoire supérieure jusqu'à l'extrémité des prolongemens de l'occiput.	"	9.	"
Largeur de la tête au-dessous des orbites.	"	4.	"

<sup>a</sup> Voyez le tome IX de cet Ouvrage, page 226 & suivantes.

<sup>b</sup> Tyfon donne quatre doigts aux pieds de derrière, & seulement trois aux pieds de devant. *Transf. Phil.* n.º 20, 1683. Cependant c'étoit le contraire dans notre pecari; il avoit quatre doigts aux pieds de devant, & seulement trois aux pieds de derrière,

pieds. pouc. lignes

Longueur de la mâchoire inférieure depuis l'extrémité des dents incisives jusqu'au contour de ses branches..	"	6.	3.
Largeur de la mâchoire inférieure à l'endroit des défenses.....	"	1.	2 $\frac{1}{2}$ .
Distance mesurée de dehors en de- hors à l'endroit du contour des branches.....	"	2.	9.
Distance entre les orbites des yeux & l'ouverture des narines.....	"	4.	"
Longueur de cette ouverture....	"	1.	1.
Largeur.....	"	"	11.
Largeur des orbites.....	"	1.	2.
Hauteur.....	"	1.	" $\frac{1}{2}$ .
Longueur des crochets du dessus au dehors de l'os.....	"	1.	3.
Largeur à la base.....	"	"	6.
Longueur des crochets du dessous au dehors de l'os.....	"	1.	3.
Largeur.....	"	"	5.
Longueur des plus grosses dents mâ- chelières au dehors de l'os.....	"	"	3.
Largeur.....	"	"	8.
Épaisseur.....	"	"	5.
Longueur des deux principales parties de l'os hyoïde.....	"	2.	3.
Longueur des troisièmes os.....	"	"	8.
Largeur de la fourchette, prise au devant de la bifurcation.....	"	"	8.



	pieds.	pouc.	lignes
Longueur des côtés de la fourchette. #	#	11.	
Largeur du trou de la première vertèbre de haut en bas..... #	#	8.	
Longueur d'un côté à l'autre.... #	#	8.	
Longueur des apophyses transverses de devant en arrière..... #	1.	8.	
Longueur du corps de la seconde vertèbre..... #	#	11½	
Hauteur de l'apophyse épineuse... #	#	10.	
Largeur..... #	1.	3.	
Hauteur de l'apophyse épineuse de la première vertèbre dorsale..... #	3.	4	
Hauteur de celle de la dernière, qui est la plus courte..... #	#	11.	
Longueur du corps de la dernière vertèbre, qui est la plus longue.. #	#	9.	
Longueur des premières côtes..... #	2.	9.	
Distance entre les premières côtes à l'endroit le plus large..... #	1.	3.	
Longueur de la huitième côte, qui est la plus longue..... #	6.	9.	
Longueur de la dernière des fausses côtes, qui est la plus courte.... #	4.	3.	
Largeur de la côte la plus large.... #	#	6½	
Longueur du sternum..... #	7.	#	
Hauteur des apophyses épineuses des premières vertèbres lombaires, qui sont les plus longues..... #	#	11½	

Longueur de l'apophyse transverse de la quatrième vertèbre, qui est la plus longue. . . . .	1.	4
Longueur du corps de la troisième vertèbre lombaire, qui est la plus longue. . . . .	10	$\frac{1}{2}$
Longueur de l'os sacrum. . . . .	3.	6.
Largeur de la partie antérieure. . .	2.	11
Largeur de la partie postérieure. . .	8	$\frac{1}{2}$
Longueur de la première fausse ver- tèbre de la queue, qui est la plus longue. . . . .	8	
Longueur du côté supérieur de l'os de la hanche. . . . .	1.	7
Hauteur de l'os depuis le milieu de la cavité cotyloïde jusqu'au milieu du côté supérieur. . . . .	3.	5
Largeur au-dessus de la cavité coty- loïde. . . . .	8	$\frac{1}{2}$
Longueur de la gouttière. . . . .	2.	1.
Longueur des trous ovalaires. . . . .	1.	2.
Largeur. . . . .	8.	
Largeur du bassin. . . . .	1.	9.
Hauteur. . . . .	2.	5.
Longueur de l'omoplate. . . . .	5.	1.
Longueur de sa base. . . . .	2.	7.
Largeur de l'omoplate à l'endroit le plus étroit. . . . .	2.	


Hauteur de l'épine à l'endroit le plus élevé. . . . .	"	"	7 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'humérus. . . . .	"	5.	6.
Circonférence à l'endroit le plus petit. . . . .	"	1.	11.
Diamètre de la tête. . . . .	"	"	10.
Largeur de la partie inférieure. . . . .	"	1.	1.
Longueur de l'os du coude. . . . .	"	5.	2.
Hauteur de l'olécrane. . . . .	"	1.	4.
Longueur de l'os du rayon. . . . .	"	3.	9.
Largeur de l'extrémité supérieure. . . . .	"	"	8.
Longueur du fémur. . . . .	"	5.	8.
Diamètre de la tête. . . . .	"	"	7 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence du milieu de l'os. . . . .	"	1.	10.
Largeur de l'extrémité inférieure. . . . .	"	1.	2.
Longueur des rotules. . . . .	"	1.	11 $\frac{1}{2}$ .
Largeur. . . . .	"	"	8.
Épaisseur. . . . .	"	"	6 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du tibia. . . . .	"	5.	1.
Largeur de la tête. . . . .	"	1.	3.
Circonférence du milieu de l'os. . . . .	"	1.	8.
Largeur de l'extrémité inférieure. . . . .	"	"	8.
Longueur du péroné. . . . .	"	4.	11.
Circonférence à l'endroit le plus mince. . . . .	"	"	7.
Largeur de la partie supérieure. . . . .	"	"	5 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de la partie inférieure. . . . .	"	"	5 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du calcaneum. . . . .	"	1.	10 $\frac{1}{2}$ .



De Sève del.

LE PECARI.

Herissot fils Sculp.





De Seve del.

Herisoot filo Jculp.








Buée Delin

R. Brunet fecit













*Fig. 2.*









*Fig. 3.*



*Fig. 2.*















*Fig. 2.*














Fig. 1.

Fig. 2.





De Seve del.

C<sup>ne</sup> Haussard Sculp.



Longueur des deux os du milieu du métacarpe.....	”	2.	1.
Longueur des os extérieur & intérieur du métacarpe.....	”	1.	5.
Longueur de l'os du milieu & de l'os extérieur du métatarse.....	”	2.	2.
Longueur de l'os intérieur du méta- tarse.....	”	1.	8.
Longueur des os des premières pha- langes des deux doigts du milieu des pieds de devant.....	”	”	10.
Longueur des os des secondes pha- langes.....	”	”	6.
Longueur des os des troisièmes pha- langes.....	”	”	10.
Longueur des os des premières pha- langes des doigts intérieur & ex- térieur des pieds de devant.....	”	”	5.
Longueur des os des secondes pha- langes.....	”	”	3.
Longueur des os des troisièmes pha- langes.....	”	”	4.



## DESCRIPTION

## DE LA PARTIE DU CABINET

*qui a rapport à l'Histoire Naturelle*DE L'ONDATRA, DU DESMAN  
& du PECARI.

N.º DCCCLXXXIX.

*Le squelette d'un ondatra.*

**L**A longueur de ce squelette est de onze pouces une ligne depuis le bout des mâchoires jusqu'à l'extrémité postérieure des os ischions ; la tête a deux pouces cinq lignes de longueur & quatre pouces dix lignes de circonférence, prise à l'endroit le plus gros.

N.º DCCCXC.

*L'os hyoïde d'un ondatra.*

Cet os ressemble à peu près à celui du rat d'eau par son corps & par ses cornes, mais il a de plus deux osselets plats, longs de deux lignes, larges d'une ligne & demie, & placés au-dessus de l'extrémité antérieure des cornes près du corps de l'os : peut-être

trouveroit-on ces deux osselets dans de vieux rats d'eau.

N.° DCCCXCI.

*L'os de la verge d'un ondatra.*

La longueur de cet os est de trois lignes ; il a la même forme que celui du rat d'eau, mais il en diffère en ce qu'il s'articule par son extrémité antérieure avec trois osselets oblongs ; le plus petit de ces osselets étoit placé directement au bout de l'os ; les deux autres osselets se trouvoient aux côtés du petit ; ils avoient une ligne de longueur.

N.° DCCCXCII.

*Un desman.*

Ce desman (*pl. II*) est plus petit que l'ondatra : il n'a que neuf pouces un quart de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue. Le museau est alongé & effilé, le nez s'étend plus en avant que la mâchoire inférieure ; au reste il m'a paru que la forme du corps est à peu près la même dans ces deux animaux, mais la ressemblance est entière par rapport à la conformation de la queue de l'un & de l'autre ; de sorte que la description qui a été faite de celle de l'ondatra \* peut servir pour la queue du desman : celle-ci a six pouces & demi de longueur. Il y a cinq doigts à chaque pied ; ils diffèrent

\* Page 18 de ce Volume.



de ceux de l'ondatra en ce que le premier doigt est beaucoup plus long que celui de cet animal, relativement à la longueur du second doigt, sur-tout dans les pieds de devant, & que le desman a entre les doigts des pieds de derrière une membrane qui ne se trouve pas entre ceux de l'ondatra.

Le desman a, comme l'ondatra, deux fortes de poils, l'un court, doux & touffu; l'autre est plus long, plus ferme & peu épais; celui-ci a jusqu'à huit lignes de longueur. Tout le poil est de couleur cendrée près de la racine, mais le poil court a une couleur brune à l'extrémité, & le poil long & ferme est luisant & de même couleur sur la tête & sur toute la face supérieure du corps de l'animal: l'extrémité des poils courts a une couleur sale & grisâtre avec quelques légères teintes de jaunâtre, & le poil long est de couleur grise, claire, blanchâtre & luisante sur toute la face inférieure de la tête & du corps. Il y a peu de poils sur les pieds de derrière & ils sont fort courts; les poils des pieds de devant ont plus de longueur, principalement autour de la plante & sur le côté extérieur du pouce & du dernier doigt.

Ce desman a été apporté de Lapponie par M. de Maupertuis.

## N.º DCCCXCIII.

*De longues soies de la crinière d'un pecari.*

Les plus longues de ces soies ont jusqu'à

quatre pouces & demi de longueur ; elles sont plates ; leur plus grande largeur n'est que d'environ un quart de ligne.

N.° DCCCXCIV.

*Des soies d'autres parties du corps d'un  
pecari.*

Les plus petites de ces soies ont moins d'un pouce de longueur, & les plus grandes ont jusqu'à trois pouces & demi ; elles sont plates comme celles de la crinière.

N.° DCCCXCV.

*La glande odoriférante d'un pecari avec la  
portion des tégumens qui la recouvre.*

Cette portion des tégumens de la croupe du pecari est assez grande pour que l'on y voie non-seulement l'orifice de la glande odoriférante & la peau qui l'environne, & qui n'a qu'un poil noir & doux, mais aussi les soies qui sont au-delà & qui couvrent l'orifice lorsqu'elles sont couchées. La glande se trouve en entier dans cette pièce qui est conservée dans l'esprit-de-vin.

N.° DCCCXCVI.

*Le cœur & une portion de l'aorte descendante  
d'un pecari.*

On a gardé cette pièce dans l'esprit-de-vin

pour faire voir la partie de l'aorte descendante du pecari, qui est dilatée & qui forme une grosse protubérance. Elle est fendue d'un bout à l'autre, de sorte que ses parois intérieures & l'épaisseur de ses membranes sont en évidence.

## N.º DCCCXCVII.

### *Le squelette d'un pecari.*

C'est le squelette qui a servi de sujet pour la description & les dimensions des os du pecari.

## N.º DCCCXC VIII.

### *Os hyoïde d'un pecari.*

Les deux premiers os sont très-longs en comparaison des seconds & des troisièmes : les seconds ont le moins de longueur. On n'aperçoit presque aucun vestige d'articulation dans la fourchette. Cet os hyoïde vient du pecari qui a servi de sujet pour la description de cet animal.



# LA ROUSSETTE\*,

la ROUGETTE\*\* & le VAMPIRE\*\*\*.

LA Rouffette & la Rougette nous paroissent faire deux espèces distinctes, mais qui sont si voisines l'une de

\* La Rouffette. Vulgairement le Chien-volant.

*Vespertilio ingens*. Chusii, *Exotic.* pag. 94.

*Vespertilio*. Gesh. *Hist. avium.* pag. 772.

*Canis volans ternatanus orientalis*. Seba, vol. I, pag. 91, Tab. 57, fig. n.° 1 & 2.

*Vespertilio caudâ nullâ*. Linn. *Syst. nat.* edit. IV, pag. 66; & edit. VI, pag. 7. — *Vampyrus*. *Vespertilio ecaudatus naso simplici, membranâ inter fœmora divisâ*, edit. X, pag. 31.

*Vespertilio cynocephalus ternatanus*. Klein, *de quadr.* pag. 61.

*Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutiusculis*..... La Rouffette. Brisson, *Regn. animal.* pag. 216.

*The Great bat, from Madagascar*. Edwards, *Hist. of Birds*, part. IV, pag. 180.

\*\* La Rougette. Le Chien-volant à col rouge.

*Pteropus fuscus, auriculis brevibus acutiusculis, collo superiore rubro*..... La Rouffette à col rouge. Brisson, *Regn. animal.* pag. 217.

*Nota*. Que M. Brisson a séparé avec raison le genre de la rouffette & de la rougette de celui des

l'autre, & qui se ressemblent à tant d'égards,

chauve-fouris, & que M. Linnæus s'est trompé lorsqu'il a dit que les chauve-fouris & les rouffettes avoient également quatre dents incisives à la mâchoire supérieure, & autant à l'inférieure : cela est vrai des rouffettes, mais cela est autrement dans les chauve-fouris; elles ont, à la vérité, quatre dents incisives à la mâchoire supérieure, mais en même temps elles en ont six à la mâchoire inférieure; ainsi elles ne peuvent être du même genre dans une méthode qui, comme celle de cet Auteur, est fondée sur le nombre & l'ordre des dents.

\*\*\* Le *Vampire*, animal de l'Amérique qui n'a été indiqué que par les noms vagues de *grande Chauve-fouris d'Amérique*, ou de *Chien-volant de la nouvelle Espagne*.

Nota. Que M. Linnæus a donné ce même nom *Vampyrus* à la rouffette; ce n'est cependant pas de la rouffette des Indes orientales à laquelle M. Linnæus applique ce nom de *Vampire*, mais de l'animal d'Amérique dont il est ici question, que les Voyageurs ont dit qu'il suçoit le sang des hommes sans les éveiller; c'est donc à cette troisième espèce & non pas à la première qu'on peut donner le nom de *Vampire*.

*Canis volans maximus, auritus, ex novâ Hispaniâ.* Seba, vol. I, pag. 92, Tab. 58. fig. n.º 1.

*Vesperilio cynocephalus maximus, auritus, ex novâ Hispaniâ.* Klein, de quadrup. pag. 62.

*Spectrum, vesperilio ecaudatus naso infundibuliformi lanceolato.* Linn. Syst. nat. edit. x, pag. 31.

*Pteropus auriculis longis patulis, naso membranâ anteriorum inflexâ aucto.* Brisson, Regn. animal. pag. 217.

que

que nous croyons devoir les présenter ensemble. La seconde ne diffère de la première que par la grandeur du corps & les couleurs du poil ; la rouffette dont le poil est d'un roux-brun, a neuf pouces de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité du corps, & trois pieds d'envergure lorsque les membranes qui lui servent d'ailes sont étendues ; la rougette, dont le poil est cendré-brun, n'a guère que cinq pouces & demi de longueur & deux pieds d'envergure ; elle porte sur le cou un demi-collier d'un rouge vif, mêlé d'orangé dont on n'aperçoit aucun vestige sur le cou de la rouffette : elles sont toutes deux à peu près des mêmes climats chauds de l'ancien continent ; on les trouve à Madagascar \*, à l'île de Bourbon, à Ternate, aux Philippines & dans les autres îles de l'Archipel indien, où il paroît qu'elles sont plus communes que dans la terre ferme des continens voisins.

\* Aux îles de Mascareigne & de Madagascar, les chauve-souris sont grosses comme des poules, & si communes que quelquefois j'en ai vu l'air obscurci. Leur cri est épouvantable. *Voyage de Madagascar, par de V. Paris, 1722, pages 83 & 245.*

On trouve aussi dans les pays les plus chauds du nouveau monde un autre quadrupède volant, dont on ne nous a pas transmis le nom américain, & que nous appellerons *Vampire*, parce qu'il suce le sang des hommes & des animaux qui dorment, sans leur causer assez de douleur pour les éveiller : cet animal d'Amérique est d'une espèce différente de celles de la roussette & de la rougette, qui toutes deux ne se trouvent qu'en Afrique & dans l'Asie méridionale. Le vampire est plus petit que la rougette qui est plus petite elle-même que la roussette ; le premier, lorsqu'il vole, paroît être de la grosseur d'un pigeon, la seconde de la grandeur d'un corbeau ; & la troisième de celle d'une grosse poule. La rougette & la roussette ont toutes deux la tête assez bien faite, les oreilles courtes, le museau bien arrondi & à peu près de la forme de celui d'un chien. Le vampire au contraire a le museau plus allongé, il a l'aspect hideux comme les plus laides chauvesouris, la tête informe & surmontée de grandes oreilles fort ouvertes & fort droites ; il a le nez contrefait, les narines



en entonnoir, avec une membrane au-dessus qui s'élève en forme de corne ou de crête pointue & qui augmente de beaucoup la difformité de sa face. Ainsi l'on ne peut douter que cette espèce ne soit toute autre que celles de la rouffette & de la rougette : le vampire est aussi mal-faisant que difforme, il inquiète l'homme, tourmente & détruit les animaux. Nous ne pouvons citer un témoignage plus authentique & plus récent que celui de M. de la Condamine : « les chauve-souris, dit-il \* qui sucent le sang « des chevaux, des mulets, & même des « hommes quand ils ne s'en garantissent « pas en dormant à l'abri d'un pavillon, « sont un fléau commun à la plupart des « pays chauds de l'Amérique ; il y en a de « monstrueuses pour la grosseur ; elles ont « entièrement détruit à *Borja* & en divers « autres endroits le gros bétail que les Mis- « sionnaires y avoient introduit, & qui « commençoit à s'y multiplier. » Ces faits sont confirmés par plusieurs autres His-

\* Voyage de la rivière des Amazones, par M. de la Condamine. Paris, 1745, page 171.

toriens & Voyageurs. Pierre Martyr<sup>a</sup>, qui a écrit assez peu de temps après la conquête de l'Amérique méridionale ; dit qu'il y a dans les terres de l'isthme de Darien, des chauve-souris qui sucent le sang des hommes & des animaux, pendant qu'ils dorment, jusqu'à les épuiser & même au point de les faire mourir ; Jumilla<sup>b</sup> assure la même chose, aussi-bien

[<sup>a</sup> *In Darienæ novi orbis regione Hispani noctu vesper-tilionum morsibus torquebantur, quæ si dormientem forte momorderint quempiam, exhausto sanguine trahunt in vitæ discrimen & mortuos fuisse nonnullos ex ea rabe compertum est. Petrus Martyr, Oceani decadis tertiæ, lib. VI.*

<sup>b</sup> Dans l'Amérique méridionale les chauve-souris sont encore un fléau si cruel & si funeste qu'il faut l'avoir éprouvé pour le croire : il y en a de deux sortes, les unes sont de la grosseur de celles que nous voyons en Espagne, les autres sont si grosses qu'elles ont trois quarts d'aune de longueur d'un bout de l'aile à l'autre. Les unes & les autres sont d'adroites sangsues s'il en fût jamais, qui rôdent toute la nuit pour boire le sang des hommes & des bêtes : si ceux que leur état oblige de dormir par terre n'ont pas soin de se couvrir depuis les pieds jusqu'à la tête, ce qui est extrêmement incommodé dans des pays aussi chauds, ils doivent s'attendre à être piqués des chauve-souris ; à l'égard de ceux qui dorment dans les maisons sous des *mosquiteros*, quand ils n'auroient que le front découvert, ils en sont infailliblement mordus, & si par malheur ces

que Don George Juan & Don Antoine de Ulloa \*. Il paroît, en conférant ces témoignages, que l'espèce de ces chauve-souris qui sucent le sang est nombreuse & très-commune dans toute l'Amérique méridionale; néanmoins nous n'avons pu jusqu'ici nous en procurer un seul individu, mais on peut voir dans Seba la figure & la description de cet animal, dont le nez est si extraordinaire que je suis très-étonné que les Voyageurs ne l'aient pas remarqué & ne se soient point écriés sur cette difformité qui saute aux yeux,

oiseaux leur piquent une veine, ils passent des bras du sommeil dans ceux de la mort, à cause de la quantité de sang qu'ils perdent sans s'en apercevoir, tant leur piqure est subtile; outre que battant l'air avec leurs ailes, elles rafraîchissent le dormeur auquel elles ont dessein d'ôter la vie. *Histoire naturelle de l'Orénoque, par le Père Jumilla, traduite de l'espagnol, par M. Eidous. Avignon, 1758, tome III, page 100.*

\* Les chauve-souris sont communes à Carthagène; elles saignent fort adroitement les habitans en leur tirant assez de sang, sans les éveiller, pour les affoiblir extrêmement. *Extrait de la Relation historique du voyage de l'Amérique méridionale, par D. George Juan & D. Antoine de Ulloa, &c. Bibliothèque raisonnée, tome XLIV, page 409.*

& de laquelle cependant ils n'ont fait aucune mention. Il se pourroit donc que l'animal étrange dont Seba nous a donné la figure, ne fût pas celui que nous indiquons ici sous le nom de *vampire*, c'est-à-dire celui qui suce le sang; il se pourroit aussi que cette figure de Seba fût infidèle ou chargée, enfin il se pourroit que ce nez difforme fût une monstruosité ou une variété accidentelle, quoiqu'il y ait des exemples de ces difformités constantes dans quelques autres espèces de chauve-souris : le temps éclaircira ces obscurités & fixera nos incertitudes.

A l'égard de la rouffette & de la rougette, elles sont toutes deux au Cabinet du Roi, & elles sont venues de l'île de Bourbon; ces deux espèces ne se trouvent que dans l'ancien continent & ne sont nulle part aussi nombreuses, en Afrique & en Asie, que celle du vampire l'est en Amérique. Ces animaux sont plus grands, plus forts & peut-être plus méchans que le vampire; mais c'est à force ouverte, en plein jour aussi-bien que la nuit qu'ils font leur dégât, ils tuent les volailles & les petits animaux, ils se

jettent même sur les hommes, les insultent & les blessent au vilage par des morsures cruelles; & aucun Voyageur ne dit qu'ils sucent le sang des hommes & des animaux endormis.

Les Anciens connoissoient imparfaitement ces quadrupèdes ailés, qui sont des espèces de monstres, & il est vraisemblable que c'est d'après ces modèles bizarres de la Nature que leur imagination a dessiné les harpies. Les ailes, les dents, les griffes; la cruauté, la voracité, la saleté; tous les attributs difformes, toutes les facultés nuisibles des harpies conviennent assez à nos rouffettes. Hérodote \* paroît les avoir indiquées lorsqu'il a dit qu'il y avoit de grandes chauve-souris qui incommodoient beaucoup les hommes qui alloient recueillir la casse autour des marais de l'Asie; qu'ils étoient obligés de se couvrir de cuir le corps & le vilage pour se garantir de leurs morsures dangereuses.

\* *Herodot. Lib. III. Nota.* Il est singulier que Pline, qui nous a transmis comme vrais tant de faits apocryphes & même merveilleux, accuse ici Hérodote de mensonge, & dise que ce fait des chauve-souris, qui se jettent sur les hommes, n'est qu'un conte de la vieille & fabuleuse antiquité.

Strabon<sup>a</sup>, parle de très-grandes chauve-fouris dans la Mésopotamie, dont la chair est bonne à manger. Parmi les modernes Albert, Isidore, Scaliger ont fait mention, mais vaguement, de ces grandes chauve-fouris. Linscot, Nicolas Mathias<sup>b</sup>, François Pyrard<sup>c</sup> en ont parlé plus précisément, & Oliger Jacobeus<sup>d</sup>

<sup>a</sup> *In Mesopotamiâ inter Euphratis conversiones, est maxima vespertilionum multitudo, qui longe majores sunt quam in cæteris locis. Capiuntur, & in esum con-diuntur. Strabo, lib. XVI.*

<sup>b</sup> Nicolas Mathias, dans son voyage imprimé à Visurgbourg, en Suédois, dit, page 123, que ces grandes chauve-fouris, volent en troupe pendant la nuit, qu'elles boivent du suc des palmiers en si grande quantité qu'elles s'enivrent, & tombent comme mortes au pied des arbres; que lui-même en avoit pris une dans cet état, & que l'ayant attachée avec des clous à une muraille, elle rongea les clous & les arrondit avec ses dents comme si on les eût limés; il dit aussi que son museau ressembloit à celui d'un renard.

<sup>c</sup> On voit dans l'île de Saint-Laurent & aux Maldives des chauve-fouris plus grosses que des corbeaux. *Voyage de Pyrard. Paris, 1619, tome I, pages 38 & 132.* — Les chauve-fouris volent en plein jour dans le Malabar; elles sont grosses comme des chats, & on les mange sans répugnance. *Extrait de la Relation des Missions du Tranquebar. Bibliothèque raisonnée, tome XXXII, page 194.*

<sup>d</sup> Il y a deux de ces chauve-fouris dans le Mu-

en a donné une courte description avec la figure ; enfin l'on en trouve des descriptions & des figures bien faites dans Seba & dans Edwards , lesquelles s'accordent avec les nôtres.

Les rouffettes sont des animaux carnassiers, voraces & qui mangent de tout ; car lorsque la chair ou le poisson leur manque, elles se nourrissent de végétaux & de fruits de toute espèce \*, elles

*Jeun regium Haffnia, 1696, pag. 12, Tab. 5 ; fig. 3.* Il dit que chacune de ces chauve-souris étoient grandes comme un gros corbeau ; qu'elles avoient, de la tête en bas, un pied de longueur ; que le membre génital avoit deux pouces de long : & il ajoute, d'après *Linscot*, que les Indiens les mangent & les trouvent aussi bonnes que des perdrix.

\* Aux îles Manilles on voit sur les arbres une infinité de grandes chauve-souris qui pendent attachées les unes aux autres sur les arbres, & qui prennent leur vol à l'entrée de la nuit pour aller chercher leur nourriture dans les bois fort éloignés : elles volent quelquefois en si grand nombre & si serrées qu'elles obscurcissent l'air de leurs grandes ailes, qui ont quelquefois six palmes d'étendue : elles savent discerner, dans l'épaisseur des bois, les arbres dont les fruits sont mûrs ; elles les dévorent pendant toute la nuit avec un bruit qui se fait entendre de deux milles, & vers le jour elles retournent vers leurs retraites. Les Indiens qui voient manger leurs meilleurs fruits par ces animaux leur

boivent le suc des palmiers, & il est aisé de les enivrer & de les prendre en mettant à portée de leur retraite des vases remplis d'eau de palmier ou de quelque autre liqueur fermentée : elles s'attachent & se suspendent aux arbres avec leurs ongles; elles vont ordinairement en troupe, & plus la nuit que le jour; elles fuient les lieux trop fréquentés & demeurent dans des déserts, sur-tout dans les îles inhabitées. Elles se portent au coït avec ardeur; le sexe dans le mâle est très-apparent; la verge n'est point engagée dans un fourreau comme celle des quadrupèdes, elle est hors du corps à peu près comme dans l'homme & le singe\*; le sexe des femelles est aussi fort apparent; elles n'ont que deux mamelles placées sur la poitrine, & ne produisent qu'en petit nombre, mais plus d'une fois

font la guerre, non-seulement pour se vanger, mais pour se nourrir de leur chair à laquelle ils prétendent trouver le goût du lapin. *Histoire générale des Voyages*, par M. l'Abbé Prevost, tome X, page 389.

\* *In hoc animali uterque sexus dignoscebatur : nam eorum aliquot qui mihi conspecti sunt satis longum exercitumque penem habebant quales fere simiarum est.* Carol. Clusii. *Exotic. Raphelingiæ*, 1605, tom. II, p. 94.



par an. La chair de ces animaux, sur-tout lorsqu'ils sont jeunes, n'est pas mauvaise à manger, les Indiens la trouvent bonne, & ils en comparent le goût à celui de la perdrix ou du lapin.

Les Voyageurs de l'Amérique s'accordent à dire que les grandes chauve-souris de ce nouveau continent, sucent, sans les éveiller, le sang des hommes & des animaux endormis. Les Voyageurs de l'Asie & de l'Afrique, qui font mention de la rouffette ou de la rougette, ne parlent pas de ce fait singulier ; néanmoins leur silence ne fait pas une preuve complète, sur-tout y ayant tant de conformité & tant d'autres ressemblances entre les rouffettes & ces grandes chauve-souris que nous avons appelées *Vampires* ; nous avons donc cru devoir examiner comment il est possible que ces animaux pussent sucer le sang sans causer en même temps une douleur au moins assez sensible pour éveiller une personne endormie. S'ils entamoient la chair avec leurs dents, qui sont très-fortes & grosses comme celles des autres quadrupèdes de leur taille, l'homme le plus profondément endormi,

& les animaux sur-tout , dont le sommeil est plus léger que celui de l'homme , seroient brusquement réveillés par la douleur de cette morsure : il en est de même des blessures qu'ils pourroient faire avec leurs ongles ; ce n'est donc qu'avec la langue qu'ils peuvent faire des ouvertures assez subtiles dans la peau pour en tirer du sang & ouvrir les veines sans causer une vive douleur. Nous n'avons pas été à portée de voir la langue du vampire , mais celle des roussettes que M. Daubenton a examinée avec soin \* semble indiquer la possibilité du fait : cette langue est pointue & hérissée de papilles dures très-fines , très-aiguës & dirigées en arrière ; ces pointes qui sont très-fines peuvent s'insinuer dans les pores de la peau , les élargir & pénétrer assez avant pour que le sang obéisse à la succion continuelle de la langue. Mais c'est assez raisonner sur ce fait dont toutes les circonstances ne nous sont pas bien connues , & dont quelques-unes sont peut-être exagérées ou mal rendues par les Écrivains qui nous les ont transmises.

\* Voyez ci-après dans ce volume la description des parties intérieures de la Roussette.



# DESCRIPTION

## DE LA ROUSSETTE.

**L**A Rouffette (*pl. XIV*) a beaucoup de rapport aux Chauve-fouris, sur-tout pour la conformation extérieure, mais elle est d'une grandeur excessive en comparaison des chauve-fouris qui ont déjà été décrites dans cet ouvrage, elle en diffère aussi par la forme de la tête, des oreilles, &c. Elle a le museau gros & alongé, & la tête longue en quelque façon comme celle d'un chien, c'est d'où vient le nom de *chien-volant* \*, qui lui a été donné par plusieurs Auteurs.

Le nez est bien formé, les yeux sont grands & posés obliquement comme ceux du loup; les oreilles sont très-courtes & pointues, elles n'ont point d'oreillon. Autant la rouffette diffère des chauve-fouris par la forme de la tête, autant il se trouve de ressemblance entr'elles par la forme du corps & des jambes: il n'y a d'autre différence que celles de la grandeur, & d'un ongle qui se trouve au bout de la troisième phalange du premier doigt; les chauve-fouris n'ont ni cet ongle, ni cette troisième phalange; au reste la rouffette ressemble parfaitement aux chauve-fouris

\* Voyez les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1759.

par les ailes & par les pieds de derrière; elle n'a point de queue, cependant la membrane des ailes s'étend au-delà des jambes de derrière & aboutit de part & d'autre à l'endroit de l'origine de la queue des chauve-souris.

Le bout du museau de la rouffette, la plus grande partie des oreilles & les doigts sont dégarnis de poil & ont une couleur brune. Le poil de la face de cet animal avoit différentes teintes de roux, depuis la plus claire jusqu'à la plus foncée; les coins de la bouche, les joues, le tour des yeux & le front avoient une teinte de roux si claire qu'elle étoit presque jaunâtre ou blonde; au contraire les branches de la mâchoire inférieure, les tempes, les à-l'entour des oreilles & le sommet de la tête avoient une couleur rousse-foncée & rougeâtre, cette même couleur rousse-foncée formoit une bande qui s'étendoit de chaque côté du dos & des lombes depuis l'épaule jusqu'à la croupe; il y avoit des poils roux sur le bras & des poils jaunâtres sur l'avant-bras & sur la jambe, des poils roux & roussâtres sur la face extérieure de la partie de la membrane qui s'étendoit au-delà de chacune des jambes, il se trouvoit du poil de ces mêmes teintes de roux autour de l'anus & de l'origine de la verge & sur la face intérieure des ailes près de l'avant-bras, du bras & des côtés du corps; le poil du cou, du dos, du milieu des lombes, de la poitrine & du ventre étoit noir, les plus grands poils

Étoient longs d'un demi-pouce, la membrane des ailes & des jambes de derrière, & les ongles avoient différentes teintes de brun & de noirâtre.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	//	9.	//
Envergure.....	3.	//	//
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	//	2.	8.
Circonférence du bout du museau.	//	2.	7.
Circonférence du museau, prise au-dessous des yeux.....	//	3.	10.
Contour de l'ouverture de la bouche.	//	2.	//
Distance entre les deux naseaux...	//	//	4 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil.....	//	1.	1.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....	//	1.	1.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.	//	//	6.
Ouverture de l'œil.....	//	//	3 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en suivant la courbure du chanfrein.....	//	//	8 $\frac{1}{2}$ .
La même distance en ligne droite..	//	//	6 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence de la tête prise entre les yeux & les oreilles.....	//	5.	3.
Longueur des oreilles.....	//	//	9.
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure.....	//	//	6.

Distance entre les deux oreilles , prise dans le bas.....	..	1.	5.
Longueur du cou .....	..	1.	11.
Circonférence du cou.....	..	4.	6.
Circonférence du corps , prise derrière les jambes de devant à travers les ailes .....	..	8.	9.
Circonférence prise dans le milieu. .	..	8.	9.
Circonférence prise devant les jambes de derrière. ....	..	7.	6.
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet.....	..	5.	6.
Largeur de l'avant-bras au coude..	..	..	6.
Épaisseur de l'avant-bras au même endroit.....	..	..	6.
Longueur du poignet.....	..	..	6.
Épaisseur du poignet.....	..	..	7.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des doigts.....	..	10.	6.
Longueur des ailes.....	1.	5.	..
Largeur à l'endroit le plus large....	..	6.	8.
Longueur du pouce des pieds de devant jusqu'au bout de l'ongle.....	..	2.	6.
Longueur du premier doigt.....	..	4.	6.
Longueur du second doigt. ....	..	11.	..
Longueur du troisième doigt.....	..	8.	9.
Longueur du quatrième doigt.....	..	7.	10.
Longueur de l'ongle du pouce des pieds de devant, .....	..	..	10.

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur de l'ongle du premier doigt	"	"	2.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon.....	"	2.	8.
Largeur du haut de la jambe.....	"	"	5.
Épaisseur.....	"	"	4.
Largeur à l'endroit du talon.....	"	"	4.
Épaisseur au même endroit.....	"	"	3.
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles.....	"	2.	5.
Longueur des doigts des pieds de der- rière.....	"	1.	10.
Largeur du pied de derrière.....	"	"	5.
Longueur des plus grands ongles...	"	"	10.
Largeur à la base.....	"	"	$1\frac{3}{4}$ .

L'épiploon étoit caché, comme celui de la noctule \* ; entre l'estomac & les intestins ; le foie & l'estomac avoient aussi la même position que dans cet animal.

Le duodenum s'étendoit dans le côté droit comme dans la plupart des autres animaux, & se replioit en avant & ensuite en dedans avant de se joindre au jejunum. La suite du canal intestinal faisoit ses circonvolutions dans le côté gauche ; dans les régions iliaque & hypogastrique, dans la région ombilicale & dans le côté droit ; enfin il se replioit en dedans derrière l'estomac avant de former le rectum :

\* Voyez la description de la noctule dans le volume XVI de cet Ouvrage.

il n'y avoit point de cœcum. Les intestins avoient cinq pieds & demi de longueur depuis le pylore jusqu'à l'anus.

L'estomac a paru sous une forme très-extraordinaire & fort différente de celle de l'estomac de la noctule. Le grand cul-de-sac étoit très-profond, car il avoit un pouce de longueur; la partie droite étoit au contraire très-courte: le corps ou la partie moyenne de l'estomac s'élevoit de près d'un pouce vers l'œsophage, en sorte que le grand cul-de-sac étoit séparé de cette partie par un angle profond, & cependant y adhéroit par un tissu cellulaire; ce qui m'a fait croire que la forme singulière du grand cul-de-sac étoit un caractère réel de cet animal, & ne venoit pas du racornissement causé dans les membranes de l'estomac par l'esprit-de-vin dans lequel il avoit été gardé pendant long-temps.

Le foie étoit composé d'un grand lobe placé à droite, d'un petit qui tenoit à sa racine; il y avoit dans le milieu un autre grand lobe qui n'étoit plus entier, on y distinguoit seulement une profonde scissure, dans laquelle se trouvoit la vésicule du fiel: au reste on ne voyoit plus que des fragmens du foie. La vésicule du fiel étoit de forme oblongue.

La rate étoit large, épaisse & courte; mais on ne doit guère compter sur cette figure, parce qu'elle étoit déformée par l'impression de l'esprit-de-vin.



Les reins n'étoient pas plus avancés l'un que l'autre ; ils avoient à peu près la même forme que ceux de la noctule.

Le poumon droit étoit composé de quatre lobes bien distincts , & disposés comme dans la plupart des animaux quadrupèdes : il y avoit à gauche deux lobes , le postérieur étoit presque entièrement séparé en deux parties par une profonde scissure qui coupoit la face postérieure. Le cœur étoit gros & dirigé obliquement à gauche ; il sortoit deux branches de la crosse de l'aorte.

La partie antérieure de la langue (*pl. XV, fig. 1, qui représente la langue vue au microscope*) depuis le filet jusqu'à l'extrémité étoit très-longue ; quoique raccourcie par l'impression de l'esprit-de-vin , elle avoit encore quinze lignes de longueur. L'extrémité (*A*) étoit fort étroite , presque pointue & hérissée jusque sur les côtés (*BC*) de papilles dures , pointues , dirigées en arrière , & longues d'une demi-ligne. On dit que cet animal s'insinue pendant la nuit sous les couvertures des gens qui dorment ; qu'il s'attache à leurs pieds & en suce le sang au point de s'en remplir , sans leur causer assez de douleur pour les éveiller , & que cependant il fait une plaie qui laisse couler le sang après que l'animal s'est retiré , & que l'homme endormi se trouve épuisé & mourant à son réveil. Il ne paroît pas que la rouffette puisse faire cette succion par le moyen de ses dents

qui sont grosses & grandes : les papilles du bout de la langue semblent être plus propres à cet effet, & mieux encore d'autres papilles qui sont placées sur le milieu de la partie moyenne antérieure (*DE*) de la langue : celles-ci ont chacune trois pointes comme un trident ; ces pointes sont très-déliées, très-acérées & dirigées en arrière ; la papille entière a deux tiers de ligne de longueur & un tiers de largeur. (*On a représenté fig. 2, une de ces papilles, vue au microscope, avec une lentille beaucoup plus forte que celle avec laquelle on a dessiné la langue, fig. 1*). Il y a sur la partie moyenne postérieure (*FG*) de cette langue d'autres papilles plus petites, qui ont cependant quatre, cinq, six & même jusqu'à douze pointes, & qui sont dirigées de dehors en dedans. (*On a représenté, fig. 3, une papille à douze pointes, vue avec la même lentille que la papille fig. 2*). Enfin il se trouve sur les bords de la partie postérieure de longues papilles coniques & pointues, aussi dirigées de dehors en dedans. Il y avoit aussi sur la partie postérieure (*HI, fig. 1*) trois glandes à calice, une grosse dans le milieu & une petite de chaque côté. On peut voir dans cette figure de la langue de la rouffette des papilles qui ont deux pointes, & reconnoître la forme & la direction de toutes les papilles.

Le palais étoit traversé par douze sillons ; les premiers avoient jusqu'à une ligne &

demie de largeur, ils étoient presque en ligne droite, mais les derniers étoient convexes en devant & fort irréguliers; leurs bords étoient interrompus dans le milieu & hérissés de petites papilles roides & pointues.

J'ai vu quelques apparences de deux mamelles sur la poitrine, une de chaque côté.

Les testicules se trouvoient placés de chaque côté de l'anús comme dans la noctule, mais le tubercule de l'épidydime avoit peu de volume. Les canaux déférens étoient courts & gros; les vésicules séminales avoient une grandeur proportionnée à celles des vésicules séminales de la noctule; on voyoit très-distinctement les prostates sur l'urètre près du col de la vessie: quoique racornies par l'esprit-de-vin, elles avoient chacune deux lignes de longueur & de largeur, & une ligne d'épaisseur.

La verge étoit saillante, & grosse à proportion comme celle de la noctule; le gland, quoique déformé, paroissoit n'avoir jamais été pointu, il étoit au contraire cylindrique & terminé par un petit bourrelet contourné de façon qu'il ressembloit à peu près aux lèvres d'une carpe; il y avoit au milieu une grande cavité qui étoit l'orifice de l'urètre; il ne renfermoit point d'os.

Le squelette de la rouffette (*pl. XVI*) a en général beaucoup de rapport avec celui de la chauve-souris \*, mais en l'examinant en

\* Voyez la description de la Chauve-souris dans le *volume XVI* de cet Ouvrage.

détail on y trouve de grandes différences, principalement dans la tête. La mâchoire du dessus n'est pas interrompue à son extrémité; les os du nez (*A*) sont presque aussi saillans en avant que les deux mâchoires: je n'ai pas pu découvrir leur articulation avec l'os frontal. Le museau est très-long & fort gros; le chanfrein & le front sont sur un même plan en ligne droite. L'os frontal, au lieu d'être convexe, forme une concavité en gouttière, qui s'étend sur la partie postérieure du chanfrein: cet os a de chaque côté une apophyse orbitaire assez longue, de sorte que les bords osseux des orbites ne sont interrompus qu'à peu près dans une sixième partie de leur étendue. Il y a une crête osseuse longitudinale sur le sommet de la tête qui aboutit à une autre crête transversale placée sur l'occiput (*B*). La partie postérieure (*C*) des branches de la mâchoire inférieure est très-large; l'apophyse coronoïde a beaucoup de hauteur & de largeur.

La rouffette a trente-deux dents; savoir, quatre incisives & deux canines dans chaque mâchoire, huit mâchelières dans la mâchoire du dessus & douze dans celle du dessous \*. Les deux incisives du dessus ne sont pas éloignées l'une de l'autre, comme dans les chauve-souris; elles sont toutes larges & plus grosses que celles du dessous, qui ont chacune

\* Voyez les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1759.

deux lobes : il n'y a que deux pointes sur les plus grosses mâchelières dans la mâchoire supérieure ; la première de ces dents est la plus grande , & la dernière est la plus petite. La première & la dernière de la mâchoire inférieure sont les plus petites ; la seconde est la plus grande.

Il y a treize vertèbres dorsales & treize côtes , sept vraies & six fausses. Les apophyses épineuses des vertèbres & le sternum ressemblent à ces mêmes parties vues dans les chauve-souris ; & les articulations des côtes de la rouffette ne diffèrent de celles de ces animaux qu'en ce que la septième côte s'articule avec le second os du sternum auprès de la sixième côte , & qu'il y avoit deux grandes apophyses plates sur la face inférieure du premier os & une sur le second.

Les vertèbres lombaires ne sont qu'au nombre de quatre. La partie antérieure de l'os de la hanche n'est pas triangulaire comme dans la chauve-souris , elle n'a que deux faces dont l'extérieure est très-convexe. Il y a dans la rouffette , comme dans la chauve-souris , une apophyse (*D*) au-dessous de la cavité cotyloïde sur le bord du bassin. Le corps des os pubis de la rouffette est fort mince de devant en arrière , & fort alongé d'un côté à l'autre. Ces deux os forment seuls , par leur réunion , la gouttière (*E*) du bassin , aussi elle est très-courte ; les os ischions , au lieu de la prolonger en arrière comme dans les autres animaux ,

même dans les chauve-souris, la ferment en en haut en se réunissant l'un à l'autre par leurs tubérosités, de sorte que le bassin a des bords postérieurs continus dans une circonférence entière (*E F G H*) formés par les branches des os pubis & ischions, & séparés des bords antérieurs par les trous ovalaires. La rouffette n'a point de queue : il est vrai que le sacrum est fort long ; on y voit, comme dans la chauve-souris, quatre fausses vertèbres distinguées par trois paires de trous, & il y a de plus un prolongement qui paroît composé de trois fausses vertèbres ; la dernière s'articule par symphyse avec les os ischions à l'endroit où ils sont réunis par le même genre d'articulation.

L'omoplate, au lieu de former un carré long comme dans la chauve-souris, forme un triangle fort allongé : le côté antérieur de l'omoplate fait la base du triangle ; le côté inférieur de l'omoplate & sa base représentent les deux côtés du triangle dont le sommet se trouve à l'angle formé par la rencontre du côté inférieur de l'omoplate & de sa base : l'épine est fort courte & fort élevée par sa partie inférieure ; la partie supérieure est au milieu de la base de l'omoplate.

Les clavicules de la rouffette sont à proportion moins convexes que celles de la chauve-souris, mais l'os du bras forme une double convexité ; il n'y a point de crête, comme dans celui de la chauve-souris, sur le côté inférieur

inférieur de la partie antérieure, mais seulement une arête peu apparente; l'os du rayon (*I*) est moins convexe que celui de la chauve-souris: mais il y a de plus, dans la rouffette, une longue épine osseuse (*K*) placée sous l'os du rayon; elle s'étend en arrière au-delà de cet os, & en avant jusqu'à environ les deux tiers de la longueur du même os du rayon; cette épine, qui est placée à l'endroit où se trouve l'os du coude des autres animaux, paroît en tenir lieu dans la rouffette; l'extrémité postérieure, qui correspond à l'olécrane, est séparée du reste de l'épine par un joint cartilagineux.

Les os de la cuisse, de la jambe & des pieds ne diffèrent de ceux de la chauve-souris qu'en ce que le péroné ne s'étend que jusqu'aux deux tiers de la longueur du tibia depuis son extrémité inférieure, & que le premier doigt des pieds de devant a une troisième phalange & un ongle (*L*) bien formé que je n'ai jamais vus dans les chauve-souris: enfin la rouffette n'avoit pas dans le tarse les deux os longs & courbes qui sont de plus que les sept os dans les chauve-souris.

pieds. pouc. lign.

Longueur de la tête depuis le bout  
de la mâchoire inférieure jusqu'à

l'occiput..... " 2. 10.

La plus grande largeur de la tête... " 1. 4.

Longueur de la mâchoire inférieure

Tome XX.

E

	pieds.	pouc.	lignes
Jusqu'au bout postérieur de l'apophyse condyloïde.....	11	2.	1.
Largeur de la mâchoire inférieure à l'endroit des dents canines.....	11	11	3 $\frac{1}{4}$ .
Largeur de la mâchoire supérieure à l'endroit des dents canines.....	11	11	6.
Distance entre les orbites & l'ouverture des narines.....	11	11	10 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de cette ouverture.....	11	11	2 $\frac{1}{3}$ .
Hauteur.....	11	11	3.
Longueur des plus longues dents canines au dehors de l'os.....	11	11	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des deux principales parties de l'os hyoïde.....	11	11	2 $\frac{1}{4}$ .
Longueur des seconds os.....	11	11	1 $\frac{2}{3}$ .
Longueur des troisièmes.....	11	11	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'os du milieu.....	11	11	1 $\frac{3}{4}$ .
Longueur des branches de la fourchette.....	11	11	3 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du cou.....	11	1.	7.
Largeur du trou de la première vertèbre de haut en bas.....	11	11	2 $\frac{1}{3}$ .
Longueur d'un côté à l'autre.....	11	11	2 $\frac{2}{3}$ .
Longueur de la portion de la colonne vertébrale, qui est composée des vertèbres dorsales.....	11	2.	6.
Longueur des premières côtes.....	11	11	7.



Distance entre les premières côtes à l'endroit le plus large.....	"	"	10.
Longueur de la cinquième, qui est la plus longue.....	"	2.	5.
Longueur de la dernière des fausses côtes.....	"	"	7.
Longueur du sternum.....	"	1.	8.
Longueur du second os qui est le plus long.....	"	1.	"
Largeur du premier os, qui est le plus large.....	"	"	8 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du corps de la quatrième vertèbre lombaire, qui est la plus longue.....	"	"	3.
Longueur des trous ovalaires.....	"	"	4.
Largeur.....	"	"	5 $\frac{1}{2}$ .
Largeur du bassin.....	"	"	6 $\frac{1}{2}$ .
Hauteur.....	"	1.	11 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'omoplate.....	"	1.	9 $\frac{1}{2}$ .
Largeur.....	"	"	7.
Longueur des clavicules.....	"	1.	3.
Longueur de l'humérus.....	"	4.	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'os de l'avant-bras.....	"	5.	7 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'os de la cuisse.....	"	2.	2.
Longueur du tibia.....	"	2.	7.
Hauteur du carpe.....	"	"	2.
Longueur du calcaneum.....	"	"	3.

	pieds. pouc. lign.		
Longueur du premier os du méta- carpe . . . . .	"	"	6.
Longueur du second . . . . .	"	2.	11.
Longueur du troisième . . . . .	"	4.	1.
Longueur du quatrième . . . . .	"	4.	"
Longueur du cinquième . . . . .	"	4.	1.
Longueur du quatrième os du méta- tarse . . . . .	"	"	5.
Longueur de la première phalange du pouce des pieds de devant . . . . .	"	1.	5.
Longueur de la seconde . . . . .	"	"	2.
Longueur de la première phalange du premier doigt . . . . .	"	"	10.
Longueur de la seconde . . . . .	"	"	6.
Longueur de la troisième . . . . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la première phalange du second doigt . . . . .	"	2.	11.
Longueur de la seconde . . . . .	"	3.	6.
Longueur de la troisième . . . . .	"	"	7.
Longueur de la première phalange du troisième doigt . . . . .	"	2.	5.
Longueur de la seconde . . . . .	"	2.	6.
Longueur de la première phalange du quatrième doigt . . . . .	"	1.	11.
Longueur de la seconde . . . . .	"	1.	11.
Longueur de la première phalange du quatrième doigt des pieds de derrière . . . . .	"	"	5 $\frac{1}{2}$ .



De Seve del.

M<sup>re</sup> Rousselot, i<sup>me</sup> Tardieu Sculp

LA ROUSSETTE.



Fig. 1.





Fig. 2.



Fig. 3.











	pieds.	pouc.	lign.
Longueur de la seconde . . . . .	//	//	5.
Longueur de la troisieme. . . . .	//	//	7.
Longueur de la première phalange du pouce . . . . .	//	//	8.
Longueur de la seconde . . . . .	//	//	7.



# DESCRIPTION

## DE LA ROUGETTE.

**L**A Rougette (*pl. XVII*) qui a servi de sujet pour cette description étoit desséchée, ainsi je n'ai pas pu reconnoître si elle ressembloit autant à la roussette par les viscères que par les os & par les dents que j'ai trouvés entièrement semblables dans ces deux animaux, tant pour le nombre que pour la forme & la situation. Mais la rougette est plus petite que la roussette, & en diffère beaucoup par les couleurs du poil. La tête, le dos, les côtés du corps jusqu'aux ailes, la croupe & la face extérieure des cuisses & des jambes sont de couleur cendrée, mêlée de gris & de brun, ou de noirâtre. Il y a sur le cou une couleur très-vive, mêlée d'orangé & de rouge \*. Il ne restoit que peu de poil sur la face inférieure de cette rougette; il avoit à peu près les mêmes couleurs que celui de la face supérieure, à l'exception du cou. Cet animal ressembloit parfaitement à la roussette par la forme de la tête, du corps & des ailes, & par l'ongle qui terminoit le premier doigt des pieds de devant. En com-

\* Voyez les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1759, les caractères de la Rougette sous le nom de Roussette.

parant les dimensions rapportées dans la table suivante avec celles qui y correspondent dans la description de la rouffette, on peut voir quelle différence de grandeur il y a entre ces deux animaux, au moins entre ceux que j'ai observés.

	pieds, pouc. lignes		
Envergure.....	2.	"	"
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	"	1.	8.
Longueur des oreilles.....	"	5.	"
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure.....	"	"	3 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet.....	"	4.	"
Longueur du poignet.....	"	4.	"
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des doigts.....	"	7.	8.
Longueur de l'aile.....	"	11.	"
Largeur à l'endroit le plus large...	"	4.	10.
Longueur du pouce des pieds de devant jusqu'au bout de l'ongle.....	"	1.	5.
Longueur du premier doigt.....	"	2.	11.
Longueur du second doigt.....	"	7.	9.
Longueur du troisième doigt.....	"	6.	2.
Longueur du quatrième doigt.....	"	5.	4.
Longueur de l'ongle du pouce des pieds de devant.....	"	"	5.
Longueur de l'ongle du premier doigt.	"	"	1.

Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon.....	"	2.	"
Longueur des doigts des pieds de derrière.....	"	1.	1.
Longueur des plus grands ongles....	"	"	7.
Largeur à la base.....	"	"	" $\frac{2}{3}$ .





De Sève del.

L. le Grand Sculp

LA ROUGETTE.



# DESCRIPTION

## DE LA PARTIE DU CABINET

*qui a rapport à l'Histoire Naturelle*

DE LA ROUSSETTE, DE LA ROUGETTE  
& de quatre espèces de CHAUVÉ-SOURIS.

N.º D C C C X C I X.

*Une roussette.*

CETTE Roussette est desséchée les ailes étendues ; elle est à peu près de la même grandeur que celle qui a servi de sujet pour la description de cet animal ; & elle lui ressemble , tant par la figure du corps que par les couleurs du poil. Elle a été envoyée de l'île de Bourbon, par M. de la Nux, ancien Conseiller au Conseil royal de cette île, & Correspondant de l'Académie royale des Sciences.

N.º D C D.

*La langue d'une roussette.*

La description de cette langue se trouve aux pages 91 & 92 de ce volume, & on en a représenté la figure, *pl. XV.* Elle est dans l'esprit-de-vin.

E v

## N.º D C D I.

*Le squelette d'une rouffette.*

Ce squelette a servi de sujet pour la description & pour les dimensions des os de la rouffette; la membrane de l'aile gauche & la peau du côté gauche de la tête & du corps tiennent à ce squelette.

## N.º D C D II.

*L'os hyoïde d'une rouffette.*

Cet os est composé de neuf pièces : les branches de la fourchette sont plus longues qu'aucun des autres os, & courbées en bas.

## N.º D C D III.

*Le cartilage thyroïde d'une rouffette.*

Ce cartilage est entièrement ossifié & dur, quoiqu'il ait été pendant long-temps dans l'esprit-de-vin avec l'animal dont il a été tiré.

## N.º D C D IV.

*Une rougette.*

Cette rougette est celle qui a servi de sujet pour la description de cet animal. Elle a été envoyée de l'île de Bourbon par M. de la Nux; elle est desséchée.



N.<sup>o</sup> D C D V.

*Une chauve-souris.*

Cette chauve-souris (*pl. XVIII*) a la tête alongée, le museau large & gros, les oreilles courtes & pointues, & l'oreillon étroit, long & terminé en pointe; le poil du dessus & des côtés du museau, de la tête & du cou, & celui des épaules, du dos & de la croupe sont de couleur fauve-brune, mêlée d'une teinte de cendré; la gorge, le dessus du cou, la poitrine, le ventre, &c. ont une couleur fauve très-pâle & cendrée: les plus longs poils ont quatre lignes. La membrane des ailes & de la queue est noirâtre; les deux dernières vertèbres de la queue ne sont pas enveloppées par la membrane.

pieds. pouc. lignes

Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anüs.....	II	4.	II
Envergure.....	I.	6.	II
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	II	I.	I.
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil.....	II	II	6.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....	II	II	3 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre, ..	II	II	1 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre les angles antérieurs			

E. vj.

	pieds.	pouc.	lign.
des yeux , mesurée en suivant la courbure du chanfrein. . . . .	"	"	8 $\frac{1}{2}$ .
La même distance mesurée en ligne droite. . . . .	"	"	6.
Circonférence de la tête , prise entre les yeux & les oreilles. . . . .	"	2.	6.
Longueur des oreilles. . . . .	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de la base , mesurée sur la courbure extérieure. . . . .	"	"	5.
Distance entre les deux oreilles , prise dans le bas. . . . .	"	"	8.
Longueur du tronçon de la queue. .	"	3.	"
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet. . . . .	"	3.	3.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des doigts. . . . .	"	5.	3.
Longueur du pouce des pieds de devant jusqu'au bout de l'ongle. . .	"	"	5.
Longueur du premier doigt. . . . .	"	3.	4.
Longueur du second doigt. . . . .	"	5.	3.
Longueur du troisième doigt. . . . .	"	4.	5.
Longueur du quatrième doigt. . . .	"	3.	5.
Longueur de l'ongle du pouce des pieds de devant. . . . .	"	"	1.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon. . . . .	"	1.	5.
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles. . . . .	"	"	10 $\frac{1}{2}$ .

pieds. pouc. lign.

Longueur des doigts des pieds de derrière.....	"	"	$4\frac{1}{2}$ .
Longueur des plus grands ongles..	"	"	$1\frac{1}{2}$ .
Largeur à la base.....	"	"	$\frac{1}{3}$ .

Cet animal a vingt-huit dents ; savoir, deux incisives dans la mâchoire du dessus & six dans celle du dessous , & dans chaque mâchoire deux canines & huit mâchelières. Les incisives du dessus sont grosses , longues , pointues & éloignées l'une de l'autre à la distance d'une ligne & demie ; les incisives du dessous ont des lobes \*.

Cette chauve-souris a été apportée du Sénégal par M. Adanson, de l'Académie royale des Sciences ; elle est desséchée.

## N.° D C D V I.

### *Autre chauve-souris.*

Le museau de cette chauve-souris (*pl. XIX, fig. 1*) est très-gros, les lèvres sont longues, & le nez est bien formé. Les oreilles sont arrondies & très-larges ; elles se touchent l'une l'autre par leur base au-dessous du front ; elles forment un pli en avant qui s'étend depuis le conduit auditif jusqu'au bord de la conque ,

\* Il a été fait mention de cette chauve-souris sous le nom de *Marmotte volante* , & ses principaux caractères sont rapportés dans les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1759.

à deux lignes de distance de l'endroit où les deux oreilles se touchent ; il y a une concavité sur la face interne de la conque de chaque côté de ce pli : l'oreillon est court , large & arrondi. Le sommet & le derrière de la tête , le dessus & les côtés du cou , les épaules , le dos & la croupe ont une couleur cendrée-brune ; le milieu du ventre est brun ; le reste de cette partie , la poitrine , la gorge , &c. ont une couleur cendrée sans teinte de brun. La membrane des ailes & de la queue est d'un brun-noirâtre ; l'avant-bras , les doigts des pieds de devant & la jambe sont de couleur cendrée. Il sort de la membrane une portion de la queue longue de sept lignes , & composée de cinq fausses vertèbres.

pieds. pouc. lign.

Longueur du corps entier , mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus . . . . .	II	2.	II
Envergure . . . . .	II	8.	4.
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput . . . . .	II	II	9.
Circonférence du bout du museau . .	II	I.	II
Circonférence du museau , prise au-dessous des yeux . . . . .	II	I.	2.
Contour de l'ouverture de la bouche .	II	II	10.
Distance entre les deux naseaux . .	II	II	1.
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil . . . . .	II	II	3.

# *du Cabinet.*

rrr

pieds. pouc. lign.

Distance entre l'angle postérieur & l'oreille. . . . .	rr	rr	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. . . . .	rr	rr	rr $\frac{3}{4}$ .
Ouverture de l'œil. . . . .	rr	rr	rr $\frac{1}{4}$ .
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en suivant la courbure du chanfrein. . . . .	rr	rr	4 $\frac{1}{2}$ .
La même distance mesurée en ligne droite. . . . .	rr	rr	3.
Circonférence de la tête, prise entre les yeux & les oreilles. . . . .	rr	rr	1. 2.
Longueur des oreilles. . . . .	rr	rr	4.
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure. . . . .	rr	rr	6.
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas. . . . .	rr	rr	1.
Longueur du cou. . . . .	rr	rr	2.
Circonférence du cou. . . . .	rr	rr	1. 7.
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant à travers les ailes. . . . .	rr	rr	2. 5.
Circonférence prise à l'endroit le plus gros. . . . .	rr	rr	2. 9.
Circonférence prise devant les jambes de derrière. . . . .	rr	rr	1. 13.
Longueur du tronçon de la queue. . . . .	rr	rr	1. 8.
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon. . . . .	rr	rr	4 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet. . . . .	rr	rr	1. 5.

	pieds.	pouc.	lign.
Largeur de l'avant-bras près du coude. . . . .	"	"	2.
Épaisseur de l'avant-bras au même endroit. . . . .	"	"	1.
Longueur du poignet. . . . .	"	"	2.
Épaisseur du poignet. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des doigts. . . . .	"	2.	6.
Longueur de l'aile. . . . .	"	3.	10.
Largeur à l'endroit le plus large. . . . .	"	1.	3.
Longueur du pouce des pieds de devant jusqu'au bout de l'ongle. . . . .	"	"	1 $\frac{2}{3}$ .
Longueur du premier doigt. . . . .	"	1.	4.
Longueur du second doigt. . . . .	"	2.	7.
Longueur du troisième doigt. . . . .	"	2.	"
Longueur du quatrième doigt. . . . .	"	1.	3.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon. . . . .	"	"	6 $\frac{1}{2}$ .
Largeur du haut de la jambe. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Épaisseur. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{4}$ .
Largeur à l'endroit du talon. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{4}$ .
Épaisseur au même endroit. . . . .	"	"	1.
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles. . . . .	"	"	4.
Longueur des doigts des pieds de derrière. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Largeur du pied de derrière. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{4}$ .
Largeur des plus grands ongles. . . . .	"	"	1.

Cet animal a vingt-six dents; savoir, dans

la mâchoire supérieure deux incisives, deux canines & huit mâchelières; & dans la mâchoire inférieure deux incisives, deux canines & dix mâchelières. Les deux incisives du dessus se touchent & ont chacune deux pointes dont l'intérieure est la plus longue, les deux canines de la mâchoire inférieure se touchent par une petite pointe qu'elles ont au côté interne de leur base; au-dessous de ces deux pointes on aperçoit sur l'os de la mâchoire inférieure deux dents incisives qui sortent de cet os & qui ont chacune deux lobes de figure assez régulière pour leur donner la forme d'un cœur. La première mâchelière de chaque côté de la mâchoire inférieure est très-petite\*.

## N.° D C D V I I.

*Autre chauve-souris.*

Cette chauve-souris (*pl. X I X, fig. 2*) paroît être de même espèce que celle qui est rapportée sous le numéro précédent, quoiqu'elle en diffère à quelques égards; elle est plus petite, car elle n'a qu'un pouce huit lignes de longueur depuis le bout des lèvres jusqu'à l'anus.

La tête est moins charnue, & par conséquent le museau est moins gros & le nez

\* Cette chauve-souris est sous le nom de *Mulot-volant* dans les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1759.

encore mieux formé que celui de la chauve-souris qui vient d'être décrite. Toute la face supérieure du corps est de couleur fauve, mêlée d'une teinte de cendré. La face inférieure est d'un blanc-sale, tirant sur le cendré & un peu sur le fauve. La membrane des ailes & de la queue a des teintes de brun & de fauve.

Il n'y a point de dents incisives dans la mâchoire inférieure, cependant on y voit des apparences d'alvéoles qui donnent lieu de croire qu'il y a peut-être eu des dents. Les différences de couleur, de grandeur & même de figure qui se trouvent entre cette chauve-souris & celle du numéro précédent peuvent venir de l'âge & du desséchement : elles sont toutes les deux dans l'esprit-de-vin depuis long-temps.

## N.° D C D V I I I.

### *Autre chauve-souris.*

Cette chauve-souris est desséchée : elle paroît être de la même espèce que les deux précédentes, mais elle ressemble plus à la première qu'à la seconde. Elle a été envoyée de la Martinique par M. Thibaut de Chavallon, Conseiller au Conseil supérieur de cette île, & Correspondant de l'Académie royale des Sciences.



N.<sup>o</sup> D C D I X.*Autre chauve-souris.*

Cette chauve-souris (*pl. XX, vue en face, fig. 1, & vue de côté, fig. 2*) a le nez, le chanfrein, le front & le sommet de la tête conformés d'une manière très-particulière. Le cartilage du nez est presque nul, & le front est très-enfoncé. Les narines ne sont pas séparées l'une de l'autre, comme dans la plupart des autres animaux, par une cloison qui s'étende en avant; elles sont placées chacune au devant d'une petite gouttière, ouverte d'un bout à l'autre par le dessus; le bord interne de cette gouttière est fort petit, l'externe est plus gros & terminé à son extrémité postérieure par un petit oreillon. Les bords externes des deux gouttières se réunissent au-dessus de la lèvre supérieure, & forment par cette réunion l'extrémité d'un grand sillon qui s'étend depuis la lèvre du dessus le long du chanfrein jusqu'au front, où il y a une fosse large, profonde & nue, mais les bords de la fosse ont de longs poils. Celui de la tête, à l'exception du sommet, & celui de la gorge, de la poitrine & du ventre sont de couleur blanchâtre avec quelque légère teinte de fauve: le poil du sommet & du derrière de la tête, du dessus du cou, des épaules, du dos & de la croupe est d'un brun-roussâtre: la longueur des plus longs poils est de quatre lignes & demie. Les oreilles & la membrane

des ailes & de la queue ont différentes teintes de brun-noirâtre & de brun-roussâtre. La queue est enveloppée dans sa membrane jusqu'à l'extrémité : les ongles sont jaunâtres. Cet animal est conservé dans l'esprit-de-vin.

	pieds.	pouc.	ligne
Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	"	1.	5.
Envergure.....	"	7.	4.
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	"	"	5.
Circonférence du bout du museau..	"	"	7.
Circonférence du museau, prise au-dessous des yeux.....	"	"	10 $\frac{1}{2}$ .
Contour de l'ouverture de la bouche.	"	"	6.
Distance entre les deux naseaux...	"	"	1 $\frac{3}{4}$ .
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil.....	"	"	3 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille .....	"	"	2.
Circonférence de la tête, prise entre les yeux & les oreilles.....	"	1.	"
Longueur des oreilles.....	"	"	9.
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure.....	"	"	7 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas.....	"	"	3.
Longueur du cou.....	"	"	2.

	pieds.	pouc.	lign.
Circonférence du cou.....	#	1.	1.
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant à travers les ailes.....	#	1.	9.
Circonférence prise à l'endroit le plus gros.....	#	2.	#
Circonférence prise devant les jambes de derrière.....	#	1.	8.
Longueur du tronçon de la queue..	#	1.	2.
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon.....	#	#	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet.....	#	1.	7.
Largeur de l'avant-bras près du coude.	#	#	1 $\frac{1}{2}$ .
Épaisseur de l'avant-bras au même endroit.....	#	#	1.
Longueur du poignet.....	#	#	2.
Épaisseur du poignet.....	#	#	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des doigts.....	#	2.	1.
Longueur de l'aile.....	#	3.	6.
Largeur à l'endroit le plus large.....	#	2.	#
Longueur du pouce des pieds de devant jusqu'au bout de l'ongle...	#	#	5.
Longueur du premier doigt.....	#	1.	#
Longueur du second doigt.....	#	2.	1.
Longueur du troisième doigt.....	#	1.	7.
Longueur du quatrième doigt.....	#	1.	9.

	pieds.	pouces	lignes
Longueur de l'ongle du pouce des pieds de devant. . . . .	"	"	1.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon. . . . .	"	"	7½
Largeur du haut de la jambe. . . . .	"	"	1½
Épaisseur. . . . .	"	"	1½
Largeur à l'endroit du talon. . . . .	"	"	1½
Épaisseur au même endroit. . . . .	"	"	1½
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles. . . . .	"	"	5.
Longueur des doigts des pieds de der- rière. . . . .	"	"	3½
Largeur du pied de derrière. . . . .	"	"	2½
Longueur des plus grands ongles. . . . .	"	"	1½

Cette chauve-souris a trente dents ; savoir, quatre incisives à la mâchoire du dessus & six dans celle du dessous, & dans chaque mâchoire deux canines & huit mâchelières ; toutes les incisives de la mâchoire supérieure sont placées l'une contre l'autre, elles ont chacune deux lobes ; celles du dessous ont aussi deux ou trois lobes. La première mâchelière du dessous, quoique grosse, n'a qu'une pointe \*.

\* Cette chauve-souris a été décrite sous le nom de *Campagnol-volant* dans les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1759.

## N.° D C D X.

*Autre chauve-souris.*

Elle a dix pouces d'envergure ; elle ne diffère de la précédente qu'en ce que la couleur blanchâtre du dessous du corps est mêlée d'une teinte de cendré , & que la membrane des ailes n'a point de roussâtre. Cette chauve-souris est desséchée : elle a été apportée du Sénégal par M. Adanson.

## N.° D C D X I.

*La tête d'une chauve-souris de l'espèce des deux précédentes.*

Cette tête est décharnée ; elle a dix lignes de longueur depuis le bout de la mâchoire inférieure jusqu'à l'occiput , & un pouce cinq lignes de circonférence , prise à l'endroit le plus gros. On y voit sur le front une fossette , large & profonde qui est formée non-seulement par l'enfoncement de cette partie , mais par une arête mince & saillante qui l'environne aux côtés & en arrière ; il y a aussi une petite arête qui s'étend le long du sommet de la tête.

## N.° D C D X I I.

*Autre chauve-souris.*

Cette chauve-souris (*pl. x x , fig. 3*) | a

le nez fort petit ; les oreilles sont terminées par une pointe dirigée en dehors , & il y a une petite échancrure sur le bord externe au-dessous de la pointe , l'oreillon est fort alongé , car il a plus de deux lignes de longueur ; il est étroit à la base & pointu à l'extrémité ; les oreilles sont inclinées en avant , & presque entièrement cachées dans le poil qui est long , il a sur tout le corps environ deux lignes de longueur. Celui du chanfrein , du front , du dessus de la tête , du dessus du cou , des épaules , du dos & de la croupe a une couleur fauve-blonde ; la mâchoire inférieure , la poitrine & le ventre ont le poil de couleur blanchâtre , teinte de fauve. La membrane des ailes & de la queue est mêlée de fauve & de brun ; le fauve paroît principalement le long de l'avant-bras & des doigts , sur le bord de la membrane , depuis le quatrième doigt du pied de devant jusqu'au pied de derrière , & autour de la queue qui est engagée dans la membrane.

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus. ....	"	1.	1.
Envergure. ....	"	7.	"
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput. ....	"	"	5.
Circonférence du bout du museau. .	"	"	6.
Circonférence du museau, prise au-dessous des yeux. ....	"	"	9.
			Contour

pieds, pouc, lign.

Contour de l'ouverture de la bouche. . . . .	6.
Distance entre les deux naseaux. . . . .	$1\frac{1}{4}$ .
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil. . . . .	$2\frac{1}{4}$ .
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille. . . . .	$1\frac{1}{2}$ .
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en suivant la courbure du chanfrein. . . . .	$3\frac{1}{2}$ .
La même distance en ligne droite. . . . .	$2\frac{1}{2}$ .
Circonférence de la tête, prise entre les yeux & les oreilles. . . . .	11.
Longueur des oreilles. . . . .	$4\frac{1}{4}$ .
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure. . . . .	6.
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas. . . . .	3.
Longueur du cou. . . . .	2.
Circonférence du cou. . . . .	1.
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant à travers les ailes. . . . .	1. 10.
Circonférence prise à l'endroit le plus gros. . . . .	2. 1.
Circonférence prise devant les jambes de derrière. . . . .	10.
Longueur du tronçon de la queue. . . . .	$1\frac{1}{2}$ .
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon. . . . .	$1\frac{1}{2}$ .

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet.....	"	1.	3.
Largeur de l'avant-bras près du coude.	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Épaisseur de l'avant-bras au même endroit.....	"	"	1.
Longueur du poignet.....	"	"	1 $\frac{1}{4}$ .
Épaisseur du poignet.....	"	"	1 $\frac{1}{4}$ .
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des doigts.....	"	1.	5.
Longueur de l'aile.....	"	3.	"
Largeur à l'endroit le plus large ...	"	1.	10.
Longueur du pouce des pieds de devant jusqu'au bout de l'ongle..	"	"	3.
Longueur du premier doigt.....	"	1.	5.
Longueur du second doigt.....	"	1.	6.
Longueur du troisième doigt.....	"	1.	11.
Longueur du quatrième doigt.....	"	1.	8.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon.....	"	"	6.
Largeur du haut de la jambe.....	"	"	" $\frac{3}{4}$ .
Épaisseur .....	"	"	" $\frac{3}{4}$ .
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles.....	"	"	2 $\frac{3}{4}$ .
Longueur des doigts des pieds de derrière.....	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Largeur du pied de derrière.....	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des plus grands ongles ...	"	"	1.

Cette chauve-fouris a trente-huit dents ;





de Seve del.

Louis le Grand Sculp.

**CHAUVE - SOURIS ETRANGERE.**





Fig. 2.




Fig. 1.

De Seve del.

CHAUVESOURIS ETRANGERES. c. Baquoy Sculp





De Sève del.

J. Le Grand Sculp.

CHAUVE - SOURIS ÉTRANGÈRES.



favoir , dans la mâchoire du dessus quatre incisives , deux canines & douze mâchelières ; & dans la mâchoire inférieure six incisives , deux canines & douze mâchelières. Les deux premières dents incisives de la mâchoire du dessus , une de chaque côté , sont séparées l'une de l'autre par un petit intervalle ; elles sont toutes les quatre pointues , & la première de chaque côté est plus longue que la seconde. Les incisives de la mâchoire inférieure ont chacune trois ou quatre lobes inégaux , les trois premières dents mâchelières de chaque mâchoire n'ont qu'une pointe \*.

\* Cette chauve-souris est décrite dans les Mémoires de l'Académie royale des Sciences , sous le nom de *Muscardin - volant*.





## LE POLATOUCHE \*.

Nous avons mieux aimé conserver à cet animal le nom qu'il porte dans son pays natal, que d'adopter les noms

\* Le Polatouche. *Polatucha*, nom de cet animal en Russie, que nous avons adopté; *Létaga* en Moscovie; *Wiewiorka*, *lutaiaca* en Pologne; *Sahouef-quanta* chez les Sauvages du Canada; *Assapanick* & *Quimichparlan* chez les Indiens des autres parties du nord & de l'ouest de l'Amérique.

*Mus Ponticus aut Scythicus, sciurusve alius, quem volentem cognominant*, Gesner, *Icon. quadr.* p. 111.

*Sciurus Americanus volans*. Flying Squirrel, Ray, *Synops. quadrup.* pag. 215.

Flying Squirrel, *Transact. Philosoph. ann.* 1733, pag. 35.

Écureuil-volant. Catesby, *Histoire naturelle de la Caroline*, tome II, pages 76 & 77.

*Sciurus volans*. Seba, *vol.* 1, pag. 67, Tab. 41, fig. 3.

*Sciurus hypocondriis prolixis volitans*. Linn. *Syst. nat.* edit. IV, pag. 67; edit. VI, pag. 9; edit. X, pag. 64.

*Sciurus obscure cinereus aut rufescens, cuius ab anticis cruribus ad postica, membrance in modum extensæ, volans*. . . . . *Sciurus volans*, L'écureuil-volant. Brisson, *Regn. animal.* pag. 157.

The Flying Squirrel, Edwards, *Hist. of Birds*, part. IV, pag. 191, où l'on en voit une assez bonne figure.



vagues & précaires que lui ont donné les Naturalistes ; ils l'ont appelé *Rat-volant*, *Écureuil-volant*, *Loir-volant*, *Rat de Pont*, *Rat de Scythie*, &c. Nous excluons tant que nous pourrons de l'Histoire Naturelle ces dénominations composées, parce que la liste de la Nature, pour être vraie, doit être tout aussi simple qu'elle. Le Polatouche est d'une espèce particulière qui se rapproche seulement par quelques caractères de celles de l'écureuil, du loir & du rat ; il ne ressemble à l'écureuil que par la grosseur des yeux & par la forme de la queue, qui cependant n'est ni aussi longue, ni fournie d'aussi longs poils ; il approche plus du loir par la figure du corps, par celle des oreilles qui sont courtes & nues, par les poils de la queue qui sont de la même forme & de la même grandeur que ceux du loir ; mais il n'est pas comme lui sujet à l'engourdissement par l'action du froid. Le polatouche n'est donc ni écureuil, ni rat, ni loir, quoiqu'il participe un peu de la nature de tous trois.

M. Klein est le premier qui ait donné

une description exacte de cet animal dans les Transactions Philosophiques, *année 1733*. Il étoit cependant connu longtemps auparavant ; on le trouve également dans les parties septentrionales de l'ancien & du nouveau continent \* ; il

\* Les Hurons du Canada ont de trois sortes d'écureuils. . . . Les plus estimés sont les écureuils-volans, nommés *Sahouesquanra*, qui ont la couleur cendrée, la tête un peu grosse, & sont munis d'une panne qui leur prend des deux côtés d'une patte de derrière à celle de devant, lesquelles ils étendent quand ils veulent voler. . . . Ils produisent trois ou quatre petits, &c. *Voyage du pays des Hurons, par Sagard Theodat, pages 305 & 306.* — Il y a un autre petit animal que les Indiens de Virginie appellent *Affapanich*, & les Anglois *Escurieu-volant*, lequel en élargissant les jambes & étendant la peau, comme si c'étoit des ailes, vole par fois trente ou quarante verges de dix pieds de long. *Histoire du nouveau monde, par Jean de Laët, Leyde, 1640, liv. III, page 88.* — Les écureuils-volans sont de la grosseur d'un gros rat, couleur de gris-blanc : ils sont aussi endormis que les autres sont éveillés ; on les appelle *volans* parce qu'ils volent d'un arbre à l'autre par le moyen d'une certaine peau qui s'étend en forme d'aile lorsqu'ils font ces petits vols. *Voyage de la Hontan, tome II, page 42.* — Les écureuils-volans viennent du nord de l'Amérique, mais on en a depuis peu trouvé en Pologne. *Voyez Edwards, Hist. nat. of Birds, pag. 191 ; & Catelby, Hist. nat. de la Caroline, tome II, pages 76 & 77.*

est seulement plus commun en Amérique qu'en Europe où il ne se trouve que rarement & dans quelques provinces du Nord, telles que la Lithuanie & la Russie. Ce petit animal habite sur les arbres comme l'écureuil ; il va de branches en branches, & lorsqu'il saute pour passer d'un arbre à un autre ou pour traverser un espace considérable, sa peau qui est lâche & plissée sur les côtés du corps, se tire au dehors, se bande & s'élargit par la direction contraire des pattes de devant qui s'étendent en avant, & de celles de derrière qui s'étendent en arrière dans le mouvement du saut. La peau ainsi tendue & tirée en dehors de plus d'un pouce, augmente d'autant la surface du corps sans en accroître la masse, & retarde par conséquent l'accélération de la chute, en sorte que d'un seul saut l'animal arrive à une assez grande distance : ainsi ce mouvement n'est point un vol comme celui des oiseaux, ni un voltigement comme celui des chauve-souris, qui se font tous deux en frappant l'air par des vibrations réitérées ; c'est un simple saut dans lequel tout dépend de la première

impulsion dont le mouvement est seulement prolongé & subsiste plus longtemps, parce que le corps de l'animal, présentant une plus grande surface à l'air, éprouve une plus grande résistance & tombe plus lentement. On peut voir dans la description, qui est à la suite de cet article, le détail de la mécanique & du jeu de cette extension singulière de la peau, qui n'appartient qu'au polatouche, & qui ne se trouve dans aucun autre animal, ce seul caractère suffiroit donc pour le distinguer de tous les autres écureuils, rats ou loirs; mais les choses mêmes les plus singulières de la Nature sont-elles jamais uniques? devoit-on s'attendre à trouver dans le même genre un autre animal avec une pareille peau, & dont les prolongemens s'étendent non-seulement d'une jambe à l'autre, mais de la tête à la queue. Cet animal, dont la figure & la description nous ont été données par Seba \* sous le nom d'*Écureuil-volant* de Virginie, paroît assez différent du polatouche pour constituer une autre espèce; cependant nous ne

\* Seba, *vol. I*, pag. 72, Tab. 44, fig. n.º 3.

nous presserons pas de prononcer sur sa nature, il est probable que c'est un animal dont l'espèce est réellement existante & différente de celle du polatouche; mais ce pourroit être aussi une simple variété dans cette espèce, & peut-être enfin n'est-ce qu'une production accidentelle ou une monstruosité; car aucun Voyageur, aucun Naturaliste n'a fait mention de cet animal; *Seba* est le seul qui l'ait vu dans le cabinet de *Vincent*, & je me défie toujours de ces descriptions faites dans des cabinets d'après des animaux que souvent on ajuste pour les rendre plus extraordinaires.

Nous avons vu & gardé long-temps le polatouche vivant; il a été bien indiqué par les Voyageurs: *Sagard Theodat*<sup>a</sup>, *Jean de Laët*<sup>b</sup>, *Fernandès*<sup>c</sup>, la

<sup>a</sup> Voyage au pays des Hurons, par *Sagard Theodat*, page 305.

<sup>b</sup> Histoire du nouveau monde, par *Jean de Laët*, page 88.

<sup>c</sup> *Quimichpatlan seu mus volans fusco pilo nigroque promiscue tegitur qui prope brachia & crura est prolixior ac parvarum alarum formâ. . . . . Est autem ceteris minor, parvo & murino capite, magnis auriculis, &c.* *Fernand. Hist. nov. Hisp. pag. 9. NOTA. Quic*

Hontan<sup>a</sup>, Denys<sup>b</sup> en ont tous fait mention, ainsi que M.<sup>rs</sup> Catesby<sup>c</sup>, Dumont<sup>d</sup>, le Page de Pratz<sup>e</sup>, &c. & M.<sup>rs</sup> Klein,

cet Auteur se trompe en ce qu'il dit que ce sont de longs poils qui lui tiennent lieu d'ailes, au lieu que ce sont en effet des prolongemens de la peau.

<sup>a</sup> Voyage de la Hontan, tome II, page 42.

<sup>b</sup> Les écurquils-volans ont le poil un peu plus noir que ceux de France; ils ont des ailes qui les prennent du train de derrière à celui de devant, qui s'ouvrent de la largeur de deux bons doigts; c'est une petite toile fort mince, couverte dessus d'un petit poil solet: toute sa volée ne peut aller qu'à trente ou quarante pas; mais s'il vole d'un arbre à un autre, il volera bien le double. *Description géographique de l'Amérique septentrionale, par Denys. Paris, 1672, tome II, pages 331 & 332.*

<sup>c</sup> Catesby, *Histoire nat. de la Caroline*, page 76.

<sup>d</sup> Les écurquils sont fort communs à la Louisiane, où l'on en distingue de deux sortes; les uns sont en tout semblables à ceux que nous connoissons en France; les seconds sont d'une couleur un peu plus cendrée, & ont à leurs deux pattes de devant une espèce de peau ou de membrane, au moyen de laquelle ils peuvent s'élancer d'un arbre à un autre à une distance assez éloignée, &c. *Mémoire sur la Louisiane, par Dumont, pages 81 & 82.*


<sup>e</sup> Les écurquils-volans sont ainsi nommés parce qu'ils sautent d'un arbre à un autre à la distance de vingt-cinq à trente pieds & plus; leur poil est d'un cendré-foncé: cet animal est de la grosseur

Seba & Edwards en ont donné de bonnes descriptions avec la figure. Ce que nous avons vu nous-mêmes de cet animal s'accorde très-bien avec ce qu'ils en disent : communément il est plus petit que l'écureuil ; celui que nous avons eu ne pesoit guère que deux onces, c'est-à-dire, autant qu'une chauve-souris de la moyenne espèce, & l'écureuil pèse huit ou neuf onces. Cependant il y en a de plus grands ; nous avons une peau de polatouche, dont on verra ci-après la description, qui ne peut provenir que d'un animal plus grand que le polatouche ordinaire.

Le polatouche approche, en quelque sorte, de la chauve-souris par cette extension de la peau qui, dans le saut, réunit les jambes de devant à celles de derrière, & qui lui sert à se soutenir en l'air : il paroît aussi lui ressembler un peu par le naturel, car il est tranquille &, pour ainsi dire, endormi pendant le jour ;

d'un rat ; ses pattes de derrière tiennent à celles de devant par deux membranes qui le soutiennent en l'air lorsqu'il saute, de sorte qu'il paroît voler, mais il va toujours en baissant, &c. *Histoire de la Louisiane, par M. le Page du Pratz, tome II, page 98.*

il ne prend de l'activité que le soir. Il est très-facile à apprivoiser, mais il est en même temps sujet à s'enfuir, & il faut le garder dans une cage ou l'attacher avec une petite chaîne : on le nourrit de pain, de fruits, de graines, il aime sur-tout les boutons & les jeunes pousses du pin & du bouleau; il ne cherche point les noix & les amandes comme les écureuils; il se fait un lit de feuilles dans lequel il s'enfouit & où il demeure tout le jour, il n'en sort que la nuit & quand la faim le presse. Comme il a peu de vivacité, il devient aisément la proie des martes & des autres animaux qui grimpent sur les arbres, aussi l'espèce subsistante est-elle en très-petit nombre, quoiqu'il produise ordinairement trois ou quatre petits.





## DESCRIPTION DU POLATOUCHE.

**L**E Polatouche (*pl. XXI*) a en général plus de rapport aux rats qu'à l'écureuil par la forme extérieure du corps & par la qualité du poil, & plus à l'écureuil qu'à tout autre animal par les parties intérieures; il est à peu près de la grandeur du lérot; il ressemble beaucoup à l'écureuil par la figure de la tête, quoiqu'il ait le nez à proportion moins gros, les oreilles plus éloignées l'une de l'autre, & les yeux précisément aussi gros & aussi saillans que ceux de l'écureuil, malgré la différence de grandeur qui est entre ces deux animaux. Les oreilles du polatouche sont nues, minces & transparentes comme celles des rats: la queue a de longs poils sur les côtés comme la queue de l'écureuil & du loir, mais ces poils sont plus courts que ceux de l'écureuil, & à peu près de la même longueur que ceux du loir. Le polatouche a quatre doigts & quelques vestiges du ponce dans les pieds de devant, & quatre doigts avec le ponce entier dans les pieds de derrière comme l'écureuil & les rats; mais tous les doigts sont à proportion moins longs & moins gros que ceux de l'écureuil, & à peu près de la même grandeur que ceux du lérot.

Le polatouche diffère des rats, de l'écureuil & de tout autre animal connu, par des prolongemens de la peau du dos, du ventre & des jambes qui s'étendent de la longueur d'environ un pouce de chaque côté du corps, de la longueur de neuf lignes sur le côté extérieur de l'avant-bras, seulement de trois lignes sur le côté extérieur de la jambe, & de cinq lignes à l'endroit du pli du coude; ces prolongemens (*A A B B C C*, *pl. XXII*, où le polatouche est vu par-dessus; & *pl. XXIII*, où il est vu par-dessous) embrassent le coude & le genou, & se terminent au carpe (*E E*) & au tarse (*F F*) lorsque l'animal est en repos (*tel qu'il est représenté pl. XXI*); lorsqu'il marche & qu'il court, ou qu'il nage, les prolongemens de la peau sont peu apparens; mais lorsqu'on le jette en l'air, il les étend, & alors la partie antérieure du prolongement de l'avant-bras forme une sorte d'oreillon (*A A*, *pl. XXII & XXIII*), parce qu'elle est soutenue par un os long & délié (*A A*, *pl. XXIV*) que l'on sent sous la peau & qui s'articule avec le carpe. Le polatouche ne peut pas rester en l'air, s'élever ni voler réellement par le moyen de ses prolongemens étendus, mais il se porte obliquement en avant & en bas, & il retarde sa chute, parce que le volume de son corps étant beaucoup plus étendu, quoique sa masse ne soit pas plus pesante, il oppose plus de résistance à l'air. Ainsi cet animal peut

bien passer en l'air d'un lieu à un autre , pourvu que l'endroit d'où il part soit plus élevé que celui où il doit arriver , à proportion de la distance qui est entre deux : il peut ainsi se soutenir dans sa chute en tombant d'une certaine hauteur ; mais il ne tomberoit certainement pas de bien haut sans se tuer , parce que le volume qu'il oppose à l'air ne seroit pas capable de le soutenir contre l'accélération de sa chute si elle duroit si long-temps. Il ne m'a pas paru qu'il frappât l'air avec ces prolongemens comme les oiseaux avec leurs ailes ; il agite seulement sa queue en lui faisant faire des ondulations de côté & d'un bout à l'autre. Le polatouche nage , comme les autres animaux , sans étendre les prolongemens de sa peau , & , quoique le poil soit mouillé , l'animal se soutient en l'air comme s'il étoit sec , & il peut voler à sa manière en sortant de l'eau.

Le polatouche qui a servi de sujet pour cette description , & dont les dimensions sont rapportées dans la table suivante , étant étendu avec ses prolongemens , avoit toute la face supérieure (*pl. XXII*) de la tête , du corps , des jambes & de la queue de couleur mêlée de cendré & de jaune , excepté une tache blanchâtre qui étoit au-dessus de chaque œil ; le tour des yeux avoit une couleur cendrée-noirâtre ; le dessus de la tête & du cou étoit de couleur mêlée de cendré-clair & de jaunâtre ; le dos , la croupe , la

face supérieure des prolongemens & des jambes avoient les mêmes couleurs, mais le cendré étoit noirâtre & le jaune plus foncé; la face supérieure de la queue avoit une teinte de jaunâtre mêlée avec du cendré-brun: tous les poils étoient de couleur cendrée près de la racine, & jaune à l'extrémité. La face inférieure (*pl. XXIII*) de l'animal, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue étoit de couleur blanche avec quelques teintes de jaune sur le bord des prolongemens de la peau du corps & sur les poils du côté extérieur de la cuisse & de la jambe; la face inférieure de la queue avoit une couleur jaunâtre: les plus longs poils étoient sur la queue, ils avoient huit lignes de longueur; celle des poils du corps étoit de quatre ou cinq lignes, & même de six derrière la cuisse; les moustaches avoient deux pouces de longueur, & elles étoient noires.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus. . . . .	#	4.	10.
Hauteur du train de devant. . . . .	#	2.	2.
Hauteur du train de derrière. . . . .	#	2.	6.
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput. . . . .	#	1.	3.
Circonférence du bout du museau. . . . .	#	1.	10.
Circonférence du museau, prise au dessous des yeux. . . . .	#	2.	2.

Contour de l'ouverture de la bouche. . .	"	"	7.
Distance entre les deux naseaux. . .	"	"	1.
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil. . . . .	1.	"	6.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille. . . . .	"	"	3.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre	"	"	4.
Ouverture de l'œil. . . . .	"	"	3.
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en suivant la courbure du chanfrein. . . . .	"	"	8 $\frac{1}{2}$ .
La même distance en ligne droite. .	"	"	7.
Circonférence de la tête entre les yeux & les oreilles. . . . .	"	2.	5.
Longueur des oreilles. . . . .	"	"	7.
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure. . . . .	"	"	8.
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas. . . . .	"	"	8 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du cou. . . . .	"	"	6 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence du cou. . . . .	"	2.	"
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant. . . . .	"	3.	2.
La même circonférence à l'endroit le plus gros. . . . .	"	3.	4.
La même circonférence devant les jambes de derrière. . . . .	"	2.	3.
Longueur du tronçon de la queue. .	"	3.	7.

	pièds.	pouc.	liges.
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon. . . . .	"	"	7.
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet. . . . .	"	1.	3.
Largeur de l'avant-bras au coude. . . . .	"	"	3.
Épaisseur au même endroit. . . . .	"	"	2.
Circonférence du poignet. . . . .	"	"	5 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence du métacarpe. . . . .	"	"	5.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des ongles. . . . .	"	"	8.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon. . . . .	"	"	6 $\frac{1}{2}$ .
Largeur du haut de la jambe. . . . .	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Épaisseur. . . . .	"	"	2 $\frac{2}{3}$ .
Largeur à l'endroit du talon. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{3}$ .
Circonférence du métatarse. . . . .	"	"	5 $\frac{1}{2}$ .
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles. . . . .	"	1.	1.
Largeur du pied de devant. . . . .	"	"	3.
Largeur du pied de derrière. . . . .	"	"	4.
Longueur des plus grands ongles. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{3}$ .
Largeur à la base. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{3}$ .

Cet animal pesoit deux onces. L'épiploon étoit fort mince, & ne passoit pas au-delà du milieu de l'abdomen; le foie & l'estomac s'étenoient autant à gauche qu'à droite

Le duodenum alloit presque jusque dans le flanc droit où il se replioit en dedans avant de se joindre au jejunum; les circonvolutions

de cet intestin étoient dans la région ombilicale , & celles de l'ileum se trouvoient dans le côté droit dans la région hypogastrique & dans le côté gauche. Le cœcum s'étendoit en avant dans ce même côté ; le colon passoit obliquement de devant en arrière & de gauche à droite , il formoit dans le côté droit deux boucles flottantes , dont l'une étoit un peu plus longue que l'autre ; chacune de ces boucles avoit dans le milieu un mesocolon d'environ une ligne de largeur : ensuite le colon se prolongeoit de droite à gauche derrière l'estomac avant de se joindre au rectum. Les deux boucles flottantes du colon indiquent , d'une manière très-marquée, que le polatouche a plus de rapport avec l'écureuil qu'avec les rats , parce que le colon de l'écureuil a aussi des boucles flottantes qui ne sont pas dans les rats \*.

L'estomac ressembloit à celui de l'écureuil , car il n'avoit qu'une légère courbure , & la partie gauche étoit beaucoup plus grosse que la partie droite.

Les membranes de l'estomac & des intestins étoient fort minces ; les intestins grêles avoient à peu près la même grosseur dans toute leur étendue ; le cœcum étoit un peu plus petit à son extrémité qu'à son origine ; le colon n'étoit guère plus gros que les intestins grêles , mais le rectum avoit un peu plus de grosseur près de l'anus.

\* Voyez le *tome XV* de cet *Ouvrage* , *page 88*.

Le foie avoit cinq lobes , le plus grand étoit dans le milieu , il avoit deux scissures ; le ligament suspensoire passoit dans l'une , & la vésicule du fiel étoit dans l'autre. Il y avoit un lobe à gauche qui étoit un peu moins grand que celui du milieu , & trois petits à droite ; le second embrassoit le rein , & le troisième étoit le plus petit de tous. Le foie avoit au dehors & au dedans une couleur rouge-pâle : il pesoit quarante grains.

La rate avoit trois faces , & son extrémité inférieure étoit plus large que l'extrémité supérieure : elle pesoit trois grains , & elle avoit une couleur semblable à celle du foie.

Le pancréas formoit deux branches , dont l'une étoit beaucoup plus grosse que l'autre , & s'étendoit le long de l'estomac jusqu'à la rate ; l'autre branche étoit très-mince & suivait une portion du duodenum.

Le rein droit étoit plus avancé que le gauche de la moitié de sa longueur ; ils avoient peu d'enfoncement ; le bassinet étoit étroit & n'avoit qu'un mamelon fort allongé.

La partie charnue du diaphragme étoit fort mince & à demi transparente : le centre nerveux avoit beaucoup plus de longueur que de largeur. Le cœur avoit la pointe tournée à gauche.

Le poumon gauche n'avoit qu'un lobe comme dans l'écureuil ; le droit en avoit trois comme dans la plupart des animaux ,



mais le quatrième sembloit être divisé jusqu'à la racine en deux portions.

La langue & l'épiglotte ressembloient à la langue & à l'épiglotte de l'écureuil. Il y avoit dix sillons transversaux sur le palais ; les premiers étoient les plus larges , & les autres étoient interrompus dans le milieu de leur longueur : ils formoient tous une convexité en avant.

Il n'y avoit point d'anfractuosité sur le cerveau , non plus que sur celui de l'écureuil ; mais le cervelet ressembloit à celui de la plupart des autres quadrupèdes. Le cerveau pesoit vingt-un grains , & le cervelet sept grains & demi.

Le polatouche a huit mamelons , quatre de chaque côté , placés à une grande distance les uns des autres , trois sur le ventre & un sur la poitrine.

Le scrotum étoit très-grand , & la verge sortoit de l'abdomen de la longueur de trois lignes & demie.

Il y a dans le gland un os très-délié & pointu à l'extrémité antérieure qui forme le bout du gland. Les canaux déférens ont peu de longueur ; les vésicules séminales étoient petites & en forme de crêtes minces ; les prostates paroissoient avoir à proportion plus d'étendue , mais toutes ces parties étoient déformées par l'impression de l'esprit-de-vin.

Le gland du clitoris n'étoit marqué que par une petite éminence qui se trouvoit au

milieu d'une cavité. Il y avoit quelques apparences de rides sur les parois du vagin qui étoient fort épaisses ; les cornes de la matrice tenoient à des panneaux graisseux , elles étoient longues & formoient des sinuosités ; les testicules étoient éloignés de l'extrémité des cornes de la matrice, cependant les trompes étoient pelotonnées près des testicules après avoir parcouru en ligne droite l'espace qui se trouvoit entre les cornes & les testicules.

	pieds. pouc. lign.		
Longueur des intestins grêles depuis le pylore jusqu'au cœcum. . . . .	2.	1.	"
Circonférence du duodenum dans les endroits les plus gros. . . . .	"	"	8.
Circonférence dans les endroits les plus minces. . . . .	"	"	5.
Circonférence du jejunum dans les endroits les plus gros. . . . .	"	"	8.
Circonférence dans les endroits les plus minces. . . . .	"	"	7.
Circonférence de l'ileum dans les endroits les plus gros. . . . .	"	"	6.
Circonférence dans les endroits les plus minces. . . . .	"	"	5.
Longueur du cœcum. . . . .	"	1.	3.
Circonférence à l'endroit le plus gros. "	"	1.	1.
Circonférence à l'endroit le plus mince. "	"	"	9.
Circonférence du colon dans les endroits les plus gros. . . . .	"	"	9.

Circonférence dans les endroits les plus minces. . . . .	II	II	6.
Circonférence du rectum près du colon. . . . .	II	II	6.
Circonférence du rectum près de l'anus. . . . .	II	1.	II
Longueur du colon & du rectum pris ensemble. . . . .	II	8.	II
Longueur du canal intestinal entier, non compris le cœcum. . . . .	2.	9.	II
Grande circonférence de l'estomac. . . . .	II	2.	4.
Longueur de la petite courbure depuis l'œsophage jusqu'à l'angle que forme la partie droite. . . . .	II	II	2.
Longueur depuis l'œsophage jusqu'au fond du grand cul-de-sac. . . . .	II	II	1 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence de l'œsophage. . . . .	II	II	4.
Circonférence du pylore. . . . .	II	II	6.
Longueur du foie. . . . .	II	1.	2.
Largeur. . . . .	II	1.	2.
Sa plus grande épaisseur. . . . .	II	II	2.
Longueur de la vésicule du fiel. . . . .	II	II	4.
Son plus grand diamètre. . . . .	II	II	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la rate. . . . .	II	II	1 1.
Largeur de l'extrémité inférieure. . . . .	II	II	3.
Largeur de l'extrémité supérieure. . . . .	II	II	2.
Épaisseur dans le milieu. . . . .	II	II	1.
Épaisseur du pancréas. . . . .	II	II	II $\frac{2}{3}$ .
Longueur des reins. . . . .	II	II	5.

	pieds.	pouc.	lign.
Largeur.....	"	"	3.
Épaisseur.....	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave jusqu'à la pointe...	"	"	4.
Largeur.....	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux & le sternum....	"	"	4.
Largeur de chaque côté du centre nerveux.....	"	"	5.
Circonférence de la base du cœur..	"	"	3 $\frac{1}{2}$ .
Hauteur depuis la pointe jusqu'à la naissance de l'artère pulmonaire.	"	"	5.
Hauteur depuis la pointe jusqu'au sac pulmonaire.....	"	"	4.
Diamètre de l'aorte pris de dehors en dehors.....	"	"	1.
Longueur de la langue.....	"	"	9 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la partie antérieure depuis le filet jusqu'à l'extrémité.	"	"	3.
Largeur de la langue.....	"	"	2.
Longueur du cerveau.....	"	"	6.
Largeur.....	"	"	7.
Épaisseur.....	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du cervelet.....	"	"	3 $\frac{1}{2}$ .
Largeur.....	"	"	5.
Épaisseur.....	"	"	4.
Distance entre l'anus & le scrotum.	"	"	4.
Hauteur du scrotum.....	"	"	3.
		Longueur	

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur du gland . . . . .	"	"	6.
Circonférence . . . . .	"	"	2.
Longueur de la verge depuis la bifur- cation du corps caverneux jusqu'à l'insertion du prépuce. . . . .	"	"	9.
Circonférence . . . . .	"	"	3.
Longueur des canaux déférens . . .	"	"	8.
Distance entre l'anus & la vulve..	"	"	1.
Longueur de la vulve. . . . .	"	"	1.
Longueur du vagin. . . . .	"	"	10.
Circonférence à l'endroit le plus gros.	"	"	5.
Circonférence à l'endroit le plus mince.	"	"	4.
Grande circonférence de la vessie..	"	1.	3.
Petite circonférence. . . . .	"	1.	"
Longueur de l'urètre. . . . .	"	"	2.
Circonférence. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du col & du corps de la matrice. . . . .	"	"	6 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence. . . . .	"	"	4.
Longueur des cornes de la matrice..	"	1.	4.
Circonférence. . . . .	"	"	3.
Distance en ligne droite entre les testicules & l'extrémité de la corne.	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. . . . .	"	"	5.
Longueur des testicules. . . . .	"	"	2.
Largeur. . . . .	"	"	1.
Épaisseur. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .

Quoique le squelette (*pl. XXIV*) du polatouche ait plus de rapport à celui de l'écureuil qu'à aucun de ceux que j'ai observés, il y a cependant des différences entre les squelettes de ces deux animaux. Le polatouche a le museau plus court, l'os frontal beaucoup plus étroit & les orbites plus grandes.

Les dents ne diffèrent de celles de l'écureuil que par la couleur de la face antérieure des dents incisives qui est d'un orangé plus pâle dans le polatouche. Cet animal a vingt-deux dents semblables à celles de l'écureuil, même la petite qui est placée de chaque côté de la mâchoire supérieure au devant de la première des mâchoires.

Le polatouche a douze vertèbres dorsales & douze côtes de chaque côté, sept vraies & cinq fausses. Le sternum n'est composé que de six os; les premières côtes, une de chaque côté, s'articulent avec la partie antérieure du premier os du sternum; l'articulation des secondes côtes est entre le premier & le second os; les troisièmes s'articulent entre le second & le troisième os, & ainsi de suite jusqu'aux sixièmes & septièmes côtes dont l'articulation est entre le cinquième & le sixième os du sternum. Comme le polatouche a un os de moins dans le sternum avec le même nombre de côtes que dans l'écureuil, il a une vraie côte de moins & une fausse côte de plus. Les vertèbres dorsales, les côtes,

le sternum, les vertèbres lombaires, les os du bassin & les fausses vertèbres de la queue ne diffèrent sensiblement de ces mêmes os, vus dans l'écureuil, qu'en ce que la gouttière, formée par la réunion des os pubis & ischions, est beaucoup plus courte.

Les os du bras, de l'avant-bras, de la cuisse & de la jambe du polatouche diffèrent de ceux de l'écureuil en ce que l'os du coude est fort écarté de l'os du rayon par sa partie moyenne supérieure, que sa partie inférieure est très-petite & adhère à ce même os, & que le péroné est de même adhérent au tibia par sa partie inférieure.

Les os du carpe, du métacarpe, du tarse, du métatarse & des doigts des quatre pieds ressemblent à ceux de l'écureuil pour le nombre, la figure & la situation; il y a de plus dans le polatouche un os (AA) long de cinq lignes, en forme d'arête ou d'épéron, qui tient au quatrième os du premier rang du carpe & qui s'étend obliquement en arrière & en haut le long du bord de la membrane qui forme les ailes de cet animal.

pieds. pouc. lign.

Longueur de la tête depuis le bout

des os du nez jusqu'à l'occiput. . . . # 1. 3.

La plus grande largeur de la tête. . . # " 9.

Longueur de la mâchoire inférieure

depuis son extrémité antérieure

jusqu'au bord postérieur de l'apo-

physe condyloïde. . . . . # # 8 $\frac{1}{2}$

	pieds.	pouc.	lign.
Largeur de la mâchoire inférieure à l'endroit des dents incisives.....	"	"	$1\frac{1}{4}$ .
Largeur à l'endroit du contour des branches.....	"	"	4.
Largeur de cette mâchoire à l'endroit des dents incisives.....	"	"	$1\frac{3}{4}$ .
Distance entre les orbites & l'ouverture des narines.....	"	"	4.
Longueur de cette ouverture.....	"	"	$1\frac{1}{2}$ .
Largeur.....	"	"	$1\frac{3}{4}$ .
Longueur des os propres du nez..	"	"	$4\frac{2}{3}$ .
Largeur à l'endroit le plus large..	"	"	1.
Diamètre des orbites.....	"	"	4.
Longueur des plus longues dents incisives au dehors de l'os.....	"	"	$3\frac{3}{4}$ .
Longueur des plus grosses dents machelières au dehors de l'os.....	"	"	1.
Largeur.....	"	"	$3\frac{3}{4}$ .
Épaisseur.....	"	"	$3\frac{3}{4}$ .
Longueur du corps de l'os hyoïde..	"	"	2.
Longueur des cornes.....	"	"	3.
Largeur du trou de la première vertèbre cervicale de haut en bas.....	"	"	$1\frac{1}{2}$ .
Longueur d'un côté à l'autre.....	"	"	$1\frac{2}{3}$ .
Largeur de la première vertèbre, prise sur les apophyses transverses.	"	"	$3\frac{1}{2}$ .
Hauteur de l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre, qui est la plus longue.....	"	"	$4\frac{3}{4}$ .



pieds. pouc. lign.

Longueur du corps de la dernière vertèbre dorsale, qui est la plus longue.....	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des premières côtes.....	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre les premières côtes à l'endroit le plus large.....	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la huitième côte, qui est la plus longue.....	"	"	9.
Longueur de la dernière des fausses côtes. ....	"	"	6.
Longueur du sternum.....	"	"	9 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du premier os, qui est le plus long. ....	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Hauteur de la plus longue apophyse épineuse des vertèbres lombaires qui est celle de la dernière. ....	"	"	1.
Longueur de la plus longue apophyse accessoire qui est celle de la der- nière vertèbre.....	"	"	1 $\frac{1}{4}$ .
Longueur du corps de la cinquième vertèbre qui est la plus longue..	"	"	2 $\frac{1}{4}$ .
Longueur de l'os sacrum.....	"	"	4.
Largeur de la partie antérieure.....	"	"	2 $\frac{1}{4}$ .
Longueur de la huitième & de la neu- vième fausse vertèbre de la queue, qui sont les plus longues.....	"	"	3 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de la partie antérieure de l'os de la hanche.....	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Hauteur de l'os depuis le milieu de la cavité cotyloïde.....	"	"	6 $\frac{1}{2}$ .

	pieds.	pouc.	lign.
Diamètre de cette cavité. . . . .	//	//	1.
Longueur de la gouttière. . . . .	//	//	$3\frac{1}{2}$ .
Largeur dans le milieu. . . . .	//	//	$3\frac{1}{2}$ .
Profondeur . . . . .	//	//	$2\frac{1}{3}$ .
Longueur des trous ovales. . . . .	//	//	$3\frac{1}{4}$ .
Largeur . . . . .	//	//	2.
Largeur du bassin. . . . .	//	//	$3\frac{3}{4}$ .
Hauteur. . . . .	//	//	6.
Longueur de l'omoplate. . . . .	//	//	$7\frac{1}{4}$ .
Largeur à l'endroit le plus large. . . . .	//	//	$3\frac{1}{4}$ .
Largeur à l'endroit le plus étroit. . . . .	//	//	$1\frac{1}{4}$ .
Hauteur de l'épine à l'endroit le plus élevé. . . . .	//	//	$1\frac{1}{4}$ .
Longueur des clavicules. . . . .	//	//	$6\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'humérus. . . . .	//	//	$11\frac{1}{2}$ .
Largeur de la partie inférieure. . . . .	//	//	2.
Longueur de l'os du coude. . . . .	//	1.	2.
Longueur de l'olécrane. . . . .	//	//	$1\frac{1}{4}$ .
Longueur de l'os du rayon. . . . .	//	1.	1.
Longueur du fémur . . . . .	//	1.	$1\frac{1}{2}$ .
Diamètre de la tête. . . . .	//	//	1.
Largeur de l'extrémité inférieure. . . . .	//	//	2.
Longueur du tibia. . . . .	//	1.	3.
Longueur du péroné . . . . .	//	1.	3.






De Seve del.

Herisvet fils sculp.

LE POLATOCHE.


















## LE PETIT-GRIS \*.

ON trouve dans les parties septentrionales de l'un & de l'autre continent l'animal que nous donnons ici sous le nom de *Petit-gris*, il ressemble beaucoup à l'Écureuil, & n'en diffère à l'extérieur que par les caractères suivans : il est plus grand que l'écureuil ; il n'a pas le poil roux, mais d'un gris plus ou moins foncé ; les oreilles sont dénuées de ces longs poils qui surmontent l'extrémité de celles de l'écureuil. Ces différences qui sont constantes, paroissent suffisantes pour constituer une espèce particulière à laquelle nous avons donné

\* *Petit-gris*, nom que nous avons donné à cet animal qu'on appelle *Écureuil gris*, *grand écureuil gris*, *écureuil de Canada*, *écureuil de Virginie*.

*Sciurus Virginianus cinereus major*. Ray, *Synops. quadrup.* pag. 215.

*Grand écureuil gris*. Catesby, *Hist. nat. de l Caroline.* tome II, page 74.

*Sciurus cinereus*, *auriculis ex albo flavicantibus*...  
*Sciurus Virginianus*. L'écureuil de Virginie. Brisson,  
*Regn. animal.* pag. 153.

le nom de *petit-gris*, parce que l'on connoît sous ce même nom la fourrure de cet animal. Plusieurs Auteurs prétendent que les petits-gris d'Europe sont différens de ceux d'Amérique; que ces petits-gris d'Europe sont des écureuils de l'espèce commune, dont la saison change seulement la couleur dans le climat de notre nord. Sans vouloir nier absolument ce dernier fait, qui cependant ne nous paroît pas assez constaté; nous regardons le petit-gris d'Europe & celui d'Amérique comme le même animal, & comme une espèce distincte & séparée de celle de l'écureuil commun; car on trouve dans l'Amérique septentrionale & dans le nord de l'Europe nos écureuils; ils y sont de la même grosseur & de la même couleur, c'est-à-dire, d'un rouge ou roux plus ou moins vif, selon la température du pays; & en même temps on y voit d'autres écureuils qui sont plus grands, & dont le poil est gris ou noirâtre dans toutes les saisons. D'ailleurs la fourrure de ces petits-gris est beaucoup plus fine & plus douce que celle de nos écureuils; ainsi nous croyons pouvoir

assurer que ce sont des animaux, dont les différences étant constantes, les espèces, quoique voisines, ne se font pas mêlées, & doivent par conséquent avoir chacune leur nom. M. Regnard \* dit affirmati-

\* Ces petits-gris sont ce que nous appelons *Écureuils* en France, qui changent leur couleur rousse lorsque l'hiver & les neiges leur en font prendre une grise; plus ils sont avant vers le Nord, & plus ils sont gris: les Lapons leur font beaucoup la guerre pendant l'hiver, & leurs chiens sont si bien faits à cette chasse, qu'ils n'en laissent passer aucuns sans les apercevoir sur les arbres les plus élevés, & avertir par leur aboiment les Lapons qui étoient avec nous. Nous en tuâmes quelques-uns à coup de fusil, car les Lapons n'avoient pas pour lors leurs flèches rondes avec lesquelles ils les assomment, & nous eumes le plaisir de les voir écorcher avec une vitesse surprenante. Ils commencent à faire la chasse aux petits-gris vers la Saint-Michel, & tous les Lapons généralement s'occupent à cet emploi, ce qui fait qu'ils sont à grand marché, & qu'on en donne un timbre pour un écu; ce timbre est composé de quarante peaux. Mais il n'y a point de marchandises où l'on soit plus trompé qu'à ces petits-gris & aux hermines, parce que vous achetez la marchandise sans la voir & que la peau est retournée, en sorte que la fourrure est en dedans. Il n'y a point de distinction à faire, toutes sont de même prix, & il faut prendre les méchantes comme les belles, qui ne coûtent pas plus les unes que les autres. Nous apprîmes avec nos Lapons une particularité surprenante touchant les petits-gris, & qui nous a été confirmée par notre

vement que les petits-gris de Laponie sont les mêmes animaux que nos écureuils de France ; ce témoignage est si positif qu'il seroit suffisant , s'il n'étoit pas contredit par d'autres témoignages ; mais

expérience : on ne rencontre pas toujours de ces animaux dans une même quantité , ils changent bien souvent de pays , & l'on n'en trouvera pas un dans tout un hiver où l'année précédente on en aura trouvé des milliers. Ces animaux changent de contrée ; lorsqu'ils veulent aller en un autre endroit , & qu'il faut passer quelque lac ou quelque rivière , qui se rencontre à chaque pas dans la Laponie , ces petits animaux prennent une écorce de pin ou de bouleau qu'ils tirent sur le bord de l'eau , sur laquelle ils se mettent & s'abandonnent ainsi au gré du vent , élevant leurs queues en forme de voiles , jusqu'à ce que le vent se faisant un peu fort & la vague élevée , elle renverse en même temps & le vaisseau & le pilote. Ce naufrage , qui est bien souvent de trois ou quatre mille voiles , enrichit ordinairement quelques Lapons qui trouvent ces débris sur le rivage , & les font servir à leur usage ordinaire , pourvu que ces petits animaux n'aient pas été trop long-temps sur le sable ; il y en a quantité qui font une navigation heureuse & qui arrivent à bon port , pourvu que le vent leur ait été favorable & qu'il n'ait point causé de tempêtes sur l'eau , qui ne doit pas être bien violente pour engloutir tous ces petits bâtimens. Cette particularité pourroit passer pour un conte si je ne la tenois par ma propre expérience. *Œuvres de M. Regnard, Paris , 1742 , tome 1 , page 163.*

M. Regnard, qui nous a donné d'excellentes pièces de théâtre, ne s'étoit pas fort occupé d'histoire naturelle; & il n'a pas demeuré assez long-temps en Laponie pour avoir vu de ses yeux les écureuils changer de couleur. Il est vrai que des Naturalistes, entr'autres M. Linnæus, ont écrit que dans le Nord le poil de l'écureuil change de couleur en hiver\*. Cela peut être vrai, car les lièvres, les loups, les belettes changent aussi de couleur dans ce climat; mais c'est du fauve ou du roux au blanc que se fait ce changement, & non pas du fauve ou du roux au gris-cendré: & pour ne parler que de l'écureuil, M. Linnæus, dans le *Fauna Suecica*, dit, *æstate ruber, hyeme incanus*, il change donc du rouge au blanc, ou plutôt du roux au blanchâtre; & nous ne croyons pas que cet auteur ait eu de fortes raisons pour substituer, comme il l'a fait, à ce mot *incanus* celui de *cinereus*, qui se trouve dans la dernière

\* *Sciurus vulgaris*. . . . *habitat in arboribus frequens, æstate ruber, hyeme incanus*, *Fauna Suecica*. Stockholm, 1746, pag. 9. — *Sciurus vulgaris*. . . . *Æstate ruber, hyeme cinereus*. *Syst. nat.* edit. x, pag. 63.

édition du *Système naturæ* : M. Klein<sup>a</sup> assure au contraire que les écureuils autour de Dantzic sont rouges en hiver comme en été, & qu'il y en a communément en Pologne de gris & de noirâtres qui ne changent pas plus de couleur que les roux ; ces écureuils gris & noirâtres se retrouvent en Canada<sup>b</sup> & dans toutes les parties septentrionales de l'Amérique : ainsi nous nous croyons fondés à regarder le petit-gris, ou, si l'on

<sup>a</sup> *Sciurus vulgaris rubicundus*. . . . . *Nesrates tam in silvis quam in caveis vulgares & hyeme & æstate rubri*. . . . . *In Poloniâ utique vulgares cinerei non mutantem pellem ; hæud rari quoque vulgares nigricantes , &c.* Klein , de *quadrup.* pag. 53. — *In Ukrainâ , inter sciuros coloris rutili , nigricantes spectantur.* Rzaczynski, *quæst. Hist. nat. Polon.* p. 321.

<sup>b</sup> Les escurieux de Virginie approchent fort de la grandeur de nos conuils ; ils sont noirs ou mêlés de noir & de blanc. Toutefois la plus grande partie sont cendrés. *Description des Indes occidentales , par Jean de Laët , page 88.* — La plus fine pelletterie du pays des Iroquois est la peau des écureuils noirs. Cet animal est gros comme un chat de trois mois, d'une grande vivacité , fort doux & très-facile à apprivoiser. Les Iroquois en font des robes qu'ils vendent jusqu'à sept ou huit pistoles. *Histoire de la nouvelle France , par le Père Charlevoix, Paris, 1744. tome I, page 273.*



veut, l'écureuil gris comme un animal commun aux deux continens, & d'une espèce différente de celle de l'écureuil ordinaire.

D'ailleurs nous ne voyons pas que les écureuils, qui sont en assez grand nombre dans nos forêts, se réunissent en troupes; nous ne voyons pas qu'ils voyagent de compagnie, qu'ils s'approchent des eaux, ni qu'ils se hasardent à traverser les rivières sur des écorces d'arbres; ils diffèrent donc des petits-gris, non-seulement par la grandeur & la couleur, mais aussi par les habitudes naturelles; car quoique ces navigations des petits-gris paroissent peu croyables, elles sont auestées par un si grand nombre de témoins \* que nous ne pouvons les nier.

\* *Rei veritate nititur, quod Gesnerus ex Vincentio Beluacensi & Olao M. refert: sciuros, quando aquam transire cupiunt, lignum levissimum aquæ imponere eiqñe insidentes & caudâ non tamen ut vult, erectâ sed continuo mota, velificantes, neque flante vento, sed tranquillo æquore transire; quod fide dignus fidusque meus emissarius ad insulas Gothlandiæ plus simplici vice observavit, & cum spoliis in litoribus ibidem collectis redux, mirabundus mihi rettulit. Dissertatio de sciuro volante Trantact. Angl. n.º 427, pag. 38. Klein, de quadrup. pag. 53. — Corrice interdum sciurus navigat. Linnæi, Syst. nat. edit. x, pag. 63.*

Au reste , de tous les animaux quadrupèdes non domestiques , l'écureuil est peut-être celui qui est le plus sujet aux variétés, ou du moins celui dont l'espèce a le plus d'espèces voisines. L'écureuil blanc de Sibérie<sup>a</sup> ne paroît être qu'une variété de notre écureuil commun. L'écureuil noir<sup>b</sup> & l'écureuil gris-foncé<sup>c</sup>, tous deux de l'Amérique , pourroient bien n'être aussi que des variétés de l'espèce du petit-gris. L'écureuil de Barbarie , le palmiste & l'écureuil Suisse, dont nous parlerons dans l'article suivant, sont trois espèces fort voisines l'une de l'autre.

On a peu d'autres faits sur l'histoire des petits-gris; Fernandès<sup>d</sup> dit que l'écureuil gris ou noirâtre d'Amérique se

<sup>a</sup> *Sciurus albus Sibericus*. L'écureuil blanc de Sibérie Briffon , *Regn. animal.* pag. 151.

<sup>b</sup> *Sciurus Mexicanus*. Hernandès , *Hist. Mexic.* pag. 582. — *Sciurus niger*. L'écureuil noir. Briffon , *Regn. animal.* pag. 151.

<sup>c</sup> L'écureuil d'Amérique. Seba , *vol. I*, pag. 78, *pl. XLVIII*, fig. 5. — *Sciurus obscurus cinereus*. . . . *Sciurus Americanus*. L'écureuil d'Amérique. Briffon , *Regn. animal.* pag. 152.

<sup>d</sup> Francisci Fernand. *Hist. animal. nov. orbis*, p. 8.

tient ordinairement sur les arbres & particulièrement sur les pins , qu'il se nourrit de fruits & de graines, qu'il en fait provision pour l'hiver, qu'il les dépose dans le creux d'un arbre où il se retire lui-même pour passer la mauvaise saison qu'il y fait aussi ses petits , &c. Ces habitudes du petit-gris sont encore différentes de celles de l'écureuil , lequel se construit un nid au-dessus des arbres comme font les oiseaux : cependant nous ne prétendons pas assurer positivement que cet écureuil noirâtre de Fernandès soit le même que l'écureuil gris de Virginie , & que tous deux soient aussi les mêmes que le petit-gris du nord de l'Europe ; nous le disons seulement comme une chose qui nous paroît être très-vraisemblable , parce que ces trois animaux sont à peu près de la même grandeur , de la même couleur & du même climat froid , qu'ils sont précisément de la même forme , & qu'on emploie également leurs peaux dans les fourrures qu'on appelle *Petit-gris*.



## DESCRIPTION DU PETIT-GRIS.

LE Petit-gris (*pl. xxv*) ressemble à l'écureuil par la forme du corps, mais il en diffère beaucoup par les couleurs du poil. Celui qui a servi de sujet pour cette description n'avoit point de bouquets de poils au-dessus des oreilles; il étoit plus gros que l'écureuil; son poil n'avoit que de très-légères teintes de roux sur le museau, sur le sommet & les côtés de la tête, sur les oreilles, sur le dos & sur la queue; il y avoit une tache de couleur rousse très-foncée sur la face supérieure du métatarse. Le dessus du museau, le front, le sommet de la tête & l'occiput avoient des teintes de gris & de noir mêlées avec le fauve; les mêmes teintes formoient une large bande qui s'étendoit depuis l'entre-deux des épaules jusqu'au milieu du dos. Le tour des yeux étoit d'un blanc jaunâtre, & autour de ce blanc il y avoit du jaune; la lèvre inférieure & les joues étoient mêlées de blanc-fâle & de gris; la base des oreilles & la partie inférieure de leur face interne étoient blanches. Le dessus & les côtés du cou, l'épaule, la face extérieure du bras & de l'avant-bras, le dessus des pieds de devant, les côtés de la poitrine & du corps,

la partie postérieure du dos, la croupe, la face extérieure de la cuisse & de la jambe avoient des teintes de blanc, de noir & de fauve. Le poil de toutes ces parties étoit de couleur cendrée, noirâtre près de sa racine; plus haut il étoit alternativement de couleur fauve, ou blanchâtre, ou blanche, & de couleur noirâtre ou noire. La mâchoire inférieure, la gorge, le dessous du cou, les aisselles, la face intérieure du bras & de l'avant-bras, la poitrine, le ventre, les aines & la face intérieure de la cuisse & de la jambe étoient d'un blanc mêlé de quelques teintes de cendré & de jaunâtre; cette dernière couleur dominoit aux alentours des parties de la génération & de l'anus. La queue étant étendue en panache avoit du blanc sur ses bords, le milieu étoit mêlé de blanc, de noir & de fauve, parce que les poils avoient successivement du noir & du fauve & la pointe blanche. Le poil du corps avoit jusqu'à neuf ou dix lignes de longueur, & celui de la queue plus de deux pouces.

pieds. pouc. ligne

Longueur du corps entier, mesuré en

ligne droite depuis le bout du mu-

seau jusqu'à l'anus..... # 10. 6.

Longueur de la tête, depuis le bout

du museau jusqu'à l'occiput... # 2. 8.

Circonférence du bout du museau.. # 3. "

Circonférence du museau, prise au-

dessous des yeux..... # 3. 2.


	pieds.	pouc.	lignes
Contour de l'ouverture de la bouche. //	1.	4.	
Distance entre les deux naseaux... //	1.	2.	
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil..... //	1.	//	
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille. .... //	//	//	6.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. //	//	//	5 $\frac{1}{2}$ .
Ouverture de l'œil..... //	//	//	3.
Distance entre les angles antérieurs des yeux, en suivant la courbure du chanfrein..... //	1.	4.	
La même distance en ligne droite.. //	//	//	11.
Circonférence de la tête, prise entre les yeux & les oreilles. .... //	4.	10.	
Longueur des oreilles..... //	//	//	10.
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure..... //	//	//	8.
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas..... //	1.	1.	
Longueur du cou..... //	//	//	10.
Circonférence du cou..... //	4.	6.	
Circonférence du corps, prise der- rière les jambes de devant..... //	5.	8.	
Circonférence à l'endroit le plus gros. //	7.	10.	
Circonférence prise devant les jambes de derrière..... //	7.	//	
Longueur du tronçon de la queue.. //	7.	6.	
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon..... //	2.	//	



De Seve del.

C<sup>ne</sup> Haybard Sculp.

LE PETIT-GRIS.





Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet.....	“	1. 11.
Largeur de l'avant-bras près du coude.	“ “	10.
Épaisseur de l'avant-bras au même endroit.....	“ “	5.
Circonférence du poignet.....	“	1. 2.
Circonférence du métacarpe.....	“	1. 1.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des ongles.....	“	1. 9.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon.....	“	2. 10.
Largeur du haut de la jambe.....	“ “	10.
Épaisseur.....	“ “	5.
Largeur à l'endroit du talon.....	“ “	4.
Circonférence du métatarse.....	“	1. 4.
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles.....	“	2. 6.
Largeur du pied de devant.....	“ “	4.
Largeur du pied de derrière.....	“ “	6.
Longueur des plus grands ongles.	“ “	4.
Largeur à la base.....	“ “	1.

Le squelette du petit-gris ressemble parfaitement à celui de l'écureuil par le nombre, la figure & la situation des dents & des os.



## LE PALMISTE \*,

le BARBARESQUE \*\* &amp; le SUISSE \*\*\*.

**L**E Palmiste est de la grosseur d'un Rat ou d'un petit écureuil ; il passe sa vie sur les palmiers , & c'est de-là qu'il a tiré

\* Le Palmiste. Rat palmiste, Écureuil des palmiers.

*Mustela Africana*. Clusii, *Exotic.* pag. 112.

*Mustela Libyca*. Nieremberg, *Hist. nat.* Antwerp. 1635, pag. 172.

*Sciurus coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in dorso flavicantibus. . . . . Sciurus palmarum vulgo.* L'écureuil palmiste, vulgairement rat palmiste. Brisson, *Regn. animal.* pag. 156.

\*\* Le Barbaresque ou l'Écureuil de Barbarie.

*Sciurus Getulus*. Caius apud Gesnerum, *Hist. quadrup.* pag. 847.—Gesner. *Icon. quadrup.* p. 112.

*Sciurus Getulus*. Aldrov. *de quadrup. digit. vivip.* pag. 105 & 106.

*Getulus. Sciurus fuscus, striis quatuor albidis longitudinalibus.* Linn. *Syst. nat.* edit. X, pag. 64.

*The Barbary. Squirrel*, Edwards of *Birds*, p. 198.

*Sciurus coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in lateribus alternatim albis, & fuscis aut nigris. . . . .*

*Sciurus Getulus.* Écureuil de Barbarie. Brisson, *Regn. animal.* pag. 157.

\*\*\* Le Suisse. L'Écureuil suisse, l'Écureuil de terre. Obihoïn chez les Hurons.

*du Palmiste, du Barbaresque, &c.* 165

son nom ; les uns l'appellent *Rat-palmiste*,

La seconde espèce d'écureuils que les Hurons appellent *Ohihecin*, & nous *Suisse*, à cause de la beauté & diversité de leur poil, sont ceux qui sont rayés & barrés depuis le devant jusqu'au derrière d'une barre ou raie blanche, plus, d'une rousse-grise & noirâtre, &c. *Voyage du pays des Hurons, par Sagard Theodat. Paris, 1632, pages 305 & 306.*

*Écureuil suisse.* Les écureuils Suisses sont de petits animaux comme de petits rats. On les appelle *Suisses* parce qu'ils ont sur le corps un poil rayé de noir & de blanc qui ressemble à un pourpoint de Suisse. *Voyage de la Hontan, tome II, page 43.*

Il y a une espèce d'écureuil dans l'Amérique septentrionale qui est un peu plus petite que notre écureuil commun. On nomme *Suisse* ce petit écureuil, parce qu'il est rayé de la tête à la queue par raies blanches, rousses & noires, toutes d'une même longueur d'environ la moitié d'un travers de doigt. *Description de l'Amérique septentrionale, par Denys. Paris, 1632, tome II, pages 331 & 332.*

*Sciurus Listeri*, Ray, *Synops. quadrup.* pag. 216.

*Écureuil de terre.* Catesby, *Hist. de la Caroline, tome II, page 75.*

*Petit écureuil de la Caroline*, qu'on appelle aussi *écureuil de terre*, parce qu'il ne vit pas sur les arbres comme les autres écureuils, mais qu'il gratte la terre comme les lapins & qu'il s'y terre. Edwards, *Hist. des oiseaux, page 181.*

*Sciurus rufus, cænis in dorso nigris, cænis ex albo flavicantibus intermixtis. . . . Sciurus Carolinensis.*  
*Écureuil de la Caroline.* Briffon, *Regn. anim.* p. 155.

& les autres l'*Écureuil des palmiers* ; & comme il n'est ni écureuil, ni rat, nous l'appellerons simplement *Palmiste*. Il a la tête à peu près de la même forme que celle du campagnol, & couverte de même de poils hérissés ; sa longue queue n'est pas traînante comme celle des rats, il la porte droite & relevée verticalement, sans cependant la renverser sur son corps comme fait l'écureuil ; elle est couverte d'un poil plus long que celui du corps, mais bien plus court que le poil de la queue de l'écureuil ; il a sur le milieu du dos, tout le long de l'épine depuis le cou jusqu'à la queue, une bande blanchâtre accompagnée de chaque côté d'une bande brune, & ensuite d'une autre bande blanchâtre. Ce caractère si marqué, par lequel il paroît qu'on pourroit distinguer le palmiste de tous les autres animaux, se trouve à peu près le même dans l'écureuil de Barbarie & dans l'écureuil Suisse, qu'on a aussi appelé *Écureuil de terre*. Ces trois animaux se ressemblent à tant d'égards que M. Ray \*

\* *Sciurus Getulus* Cæii, *mustela Africana* Clusii, *eadem nobis videtur* . . . . *Descriptio mustelæ Africanæ*

a pensé qu'ils ne faisoient tous trois qu'une seule & même espèce, mais si l'on fait attention que les deux premiers, c'est-à-dire, le palmiste & l'écureuil de Barbarie que nous appelons *Barbarefque*, ne se trouvent que dans les climats chauds de l'ancien continent; qu'au contraire le suisse ou l'écureuil Suisse décrit par Lister, Catesby<sup>a</sup> & Edwards<sup>b</sup> ne se trouve que dans les régions froides & tempérées du nouveau monde; on jugera que ce sont des espèces différentes; & en effet, en les examinant de plus près, on voit que les bandes brunes & blanches du suisse sont disposées dans un autre ordre que celles du palmiste; la bande blanche qui s'étend dans le palmiste, le long de l'épine du dos, est noire ou brune dans le suisse, les bandes blanches sont à côté de la noire, comme les noires

*cum sciuri Getuli descriptione satis bene convenit, ut non dubitem animal esse: huic similis est sciurus à clarissimo Dom. Lister, observatus & descriptus. Ray, Synops. quadrup. pag. 216.*

<sup>a</sup> Catesby, *Histoire nat. de la Caroline, tome II, page 75.*

<sup>b</sup> Edwards, *Nat. hist. of Birds. London, 1741, part. IV, pag. 181.*

sont à côté de la blanche dans le palmiste ; & d'ailleurs il n'y a que trois bandes blanches sur le palmiste , au lieu qu'il y en a quatre sur le suisse , celui-ci renverse sa queue sur son corps , le palmiste ne la renverse pas , il n'habite que sur les arbres , le suisse se tient à terre , & c'est cette différence qui l'a fait appeler *Écureuil de terre* ; enfin il est plus petit que le palmiste , ainsi l'on ne peut douter que ce ne soient deux animaux différens.

A l'égard du barbaresque , comme il est du même continent , du même climat , de la même grosseur & à peu près de la même figure que le palmiste , on pourroit croire qu'ils seroient tous deux de la même espèce & qu'ils feroient seulement variété dans cette espèce. Cependant en comparant la description & la figure du barbaresque ou *écureuil de Barbarie* , donnée par Caius<sup>a</sup> & copiée par Aldrovande<sup>b</sup> & Jonston<sup>c</sup> , avec la description & la figure que nous donnons ici du palmiste ;

<sup>a</sup> *Sciurus Getulus.* Caii apud Gesnerum. *Hist. quadrup.* pag. 847.

<sup>b</sup> Aldrov. *de quadrup. digit.* pag. 405.

<sup>c</sup> Jonst. *de quadrup.* pag. 113.

& en comparant enſuite la figure & la description de ce même écureuil de Barbarie, donnée par Edwards, on y trouvera des différences très-remarquables & qui indiquent aſſez que ce ſont des animaux différens : nous les avons tous deux au Cabinet du Roi aſſi-bien que le ſuiſſe. Le barbareſque a la tête & le chanfrein plus arqué, les oreilles plus grandes, la queue garnie de poils plus touffus & plus longs que le palmiſte ; il eſt plus écureuil que rat, & le palmiſte eſt plus rat qu'écureuil par la forme du corps & de la tête. Le barbareſque a quatre bandes blanches, au lieu que le palmiſte n'en a que trois ; la bande blanche du milieu ſe trouve dans le palmiſte ſur l'épine du dos, tandis que dans le barbareſque il ſe trouve ſur la même partie une bande noire mêlée de roux, &c. Au reſte, ces animaux ont à peu près les mêmes habitudes & le même naturel que l'écureuil commun ; comme lui le palmiſte & le barbareſque vivent de fruits, & ſe ſervent de leurs pieds de devant pour les ſaiſir & les porter à leur guentle ; ils ont la même voix, le même cri, le même

instinct , la même agilité ; ils sont très-vifs & très-doux , ils s'appriivoient fort aisément & au point de s'attacher à leur demeure , de n'en sortir que pour se promener , d'y revenir ensuite d'eux-mêmes sans être appelés ni contraints ; ils sont tous deux d'une très-jolie figure , leur robe , rayée de blanc , est plus belle que celle de l'écureuil , leur taille est plus petite , leur corps est plus léger & leurs mouvemens sont aussi prestes. Le palmiste & le barbaresque se tiennent , comme l'écureuil , au-dessus des arbres , mais le suisse se tient à terre & s'y pratique , comme le mulot , une retraite impénétrable à l'eau : il est aussi moins docile & moins doux que les deux autres ; il mord sans ménagement \* , à moins qu'il ne soit entièrement apprivoisé. Il ressemble donc plus aux rats ou aux mulots qu'aux écureuils , par le naturel & par les mœurs.

\* Voyage du pays des Hurons , par Sagard Theodat. *Paris* , 1632 , page 306.





## DESCRIPTION DU PALMISTE.

**L**E Palmiste (*pl. xxvi*), qui a servi de sujet pour cette description, n'étoit pas adulte ; il avoit beaucoup de rapport au campagnol par la forme de la tête qui étoit couverte par un poil hérissé : les oreilles étoient courtes , larges & garnies de poil principalement sur leur face interne. La queue avoit au moins autant de longueur que le corps & la tête de l'animal en entier ; elle étoit revêtue de poils plus longs que ceux du corps , car ils avoient quatre lignes de longueur , tandis que celle du poil du corps n'étoit que de trois lignes. Il y avoit cinq doigts aux pieds de derrière , & seulement quatre à ceux de devant ; on n'apercevoit à l'endroit du pouce qu'un très-petit tubercule.

Le poil du dessus de la tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput , étoit de couleur mêlée de roussâtre & de brun ; le dessus du cou, les côtés de la tête & du cou, la partie antérieure du dos, l'épaule & la face externe de l'avant-bras avoient des teintes de brun & de gris, ou de blanc-sale. Il y avoit sept bandes, quatre brunes & trois de couleur de blanc-sale qui s'étendoient sur le dos

H ij

& sur les lombes jusqu'à l'origine de la queue : l'une des bandes blanchâtres se trouvoit placée le long du milieu du dos & des lombes, elle étoit fort étroite : on voyoit de chaque côté de cette bande blanchâtre une large bande brune, ensuite une bande blanchâtre un peu plus large que celle du milieu, & enfin une bande brune à peu près de la même largeur que la bande blanchâtre qui la précédoit. Toute la face inférieure du corps de l'animal, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, avoit une couleur blanchâtre presque grise. La couleur du poil de la queue étoit mêlée de gris & de brun-noirâtre qui sembloit former des anneaux fort étroits ; chaque poil avoit du noir près de la racine, du gris au-dessus du noir, & enfin du noir à la pointe.

J'ai observé un autre palmiste qui étoit empaillé, & qui m'a paru de même espèce que le précédent ; il avoit sur le dos trois bandes blanchâtres légèrement teintes de jaune & longitudinales, mais il étoit plus grand que le jeune palmiste, aussi il en différoit par les couleurs du poil. La face supérieure du corps, à l'exception des trois bandes dont il vient d'être fait mention, avoit une couleur mêlée de roussâtre, de gris & de brun-noirâtre : la face inférieure étoit de couleur blanche avec quelques teintes de jaune. Les poils de la queue formoient un panache, ils avoient jusqu'à onze lignes de

longueur, chaque poil étoit de couleur roussâtre à son origine, il avoit ensuite du noir, du roussâtre, du noir, & enfin l'extrémité étoit blanche, de sorte qu'en regardant la queue par-dessous on voyoit de chaque côté du tronçon une large bande roussâtre parallèle au tronçon, & ensuite une bande étroite & noire, une bande étroite & roussâtre, une large bande noire, & enfin une large bande blanche.

Les dimensions de la table suivante ont été prises sur le jeune palmiste; la description des parties intérieures a été faite sur le même sujet, parce qu'il étoit mieux conservé que l'autre.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	"	2.	10.
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	"	1.	"
Circonférence du bout du museau..	"	1.	1.
Circonférence du museau, prise au-dessous des yeux. ....	"	1.	5.
Contour de l'ouverture de la bouche.	"	"	7.
Distance entre les deux naseaux. . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil. ....	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille. ....	"	"	3.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.	"	"	2.

	pieds.	pouc.	ligne
Ouverture de l'œil . . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en suivant la courbure du chanfrein . . . . .	"	"	7.
La même distance mesurée en ligne droite . . . . .	"	"	5.
Circonférence de la tête, prise entre les yeux & les oreilles . . . . .	"	2.	2.
Longueur des oreilles . . . . .	"	"	3.
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure . . . . .	"	"	4.
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas . . . . .	"	"	6.
Longueur du cou . . . . .	"	"	3.
Circonférence du cou . . . . .	"	1.	6.
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant . . . . .	"	1.	10.
La même circonférence à l'endroit le plus gros . . . . .	"	2.	1.
La même circonférence devant les jambes de derrière . . . . .	"	1.	8.
Longueur du tronçon de la queue . .	"	2.	8.
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon . . . . .	"	"	7.
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet . . . . .	"	"	7.
Largeur de l'avant-bras au coude . .	"	"	3.
Épaisseur au même endroit . . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence du poignet . . . . .	"	"	6.

	pieds.	pouc.	lignes
Circonférence du métacarpe.....	"	"	6.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des ongles.....	"	"	7.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon.....	"	"	9.
Largeur du haut de la jambe.....	"	"	4.
Épaisseur.....	"	"	2.
Largeur à l'endroit du talon.....	"	"	2.
Circonférence du métatarse. . . . .	"	"	7.
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles. . . . .	"	1.	"
Largeur du pied de devant. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Largeur du pied de derrière.....	"	"	3.
Longueur des plus grands ongles... ..	"	"	$\frac{1}{2}$ .
Largeur à la base.....	"	"	$\frac{1}{6}$ .

A l'ouverture de l'abdomen l'épiploon s'est trouvé fort court & raccorni par l'esprit-de-vin, où le petit animal dont il s'agit, avoit été gardé pendant long-temps; le foie étoit placé presque entièrement à droite.

Le duodenum s'étendoit jusqu'à la région iliaque, il se replioit en dedans & se prolongeoit en avant. Les circonvolutions du jejunum étoient dans les régions hypogastrique & iliaques, & celles de l'ileum dans le côté gauche & dans la région ombilicale. Le cœcum étoit dirigé en arrière dans le côté droit. Le colon formoit un arc en s'étendant de droite à gauche derrière l'estomac,

ensuite il se prolongeoit un peu dans le côté gauche avant de se joindre au rectum.

La partie droite de l'estomac ne formoit point d'angle comme dans la plupart des animaux ; le grand cul-de-sac étoit profond, mais il avoit peu de diamètre. Les intestins avoient tous à peu près la même grosseur ; le cœcum étoit fort court.

Le foie avoit trois grands lobes ; le plus grand étoit placé dans le milieu , & divisé en trois parties par deux scissures ; le ligament suspensoire passoit dans l'une , & la vésicule du fiel se trouvoit dans l'autre qui étoit peu profonde. Il y avoit un lobe à gauche & un à droite ; le gauche étoit moins grand que le moyen , & plus grand que le droit ; celui-ci avoit à sa racine deux prolongemens qui étoient peut-être deux petits lobes , mais que l'on ne pouvoit pas bien distinguer à cause du raccornissement de tous ces viscères.

La rate étoit allongée , & a paru ressembler à la rate de la plupart des animaux quadrupèdes.

Le rein droit étoit plus avancé que le gauche d'un tiers de sa longueur ; ils avoient peu d'enfoncement , mais le bassinet étoit grand.

Le centre nerveux avoit beaucoup d'étendue. Il m'a paru qu'il ne sortoit que deux branches de la crosse de l'aorte.


Il y avoit quatre mamelles ventrales ;



Deseré del.

LE PALMISTE.

C Baquoy sculp





deux de chaque côté. Je n'ai pas pu reconnoître si l'urètre s'étendoit jusqu'au bord de la vulve comme dans le rat. Les trompes n'étoient pas pelotonnées comme dans l'écureuil , mais elles formoient des sinuosités très-apparentes sur le pavillon.

Le palmiste a vingt-deux dents qui ne diffèrent de celles de l'écureuil qu'en ce que la dent qui est placée au-devant des mâchoières est à proportion plus grosse.



---

DESCRIPTION  
DE LA PARTIE DU CABINET  
*qui a rapport à l'Histoire Naturelle*

DU POLATOUCHE, DU PETIT-GRIS,  
du PALMISTE, du BARBARESQUE  
& du SUISSÉ.

N.º D C D X I I I.

*Un Polatouche.*

C E polatouche est dans l'esprit-de-vin ; il a quatre pouces deux lignes de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'anus. Les prolongemens de la peau qui servent d'ailes sont étendus. Cet animal nous a été envoyé vivant de la Louisiane par M. de Fontenette, Médecin du Roi dans cette colonie.

N.º D C D X I V.

*La peau d'un polatouche.*

Cette peau est desséchée ; elle vient d'un polatouche semblable à celui qui est rapporté sous le numéro précédent.

## N.º D C D X V.

*Le squelette d'un polatouche.*

C'est le squelette qui a servi de sujet pour la description & les dimensions des os du polatouche ; sa tête a deux pouces une ligne de circonférence à l'endroit le plus gros.

## N.º D C D X V I.

*L'os hyoïde d'un polatouche.*

Cet os est composé de cinq pièces ; celle du milieu a la forme d'un croissant ; il y a un osselet articulé contre le côté inférieur de chacune des extrémités du croissant , & une corne cu un os très-long articulé par un bout avec le petit osselet , & par l'autre bout avec l'os temporal.

## N.º D C D X V I I.

*L'os du gland d'un polatouche.*

La forme de cet os est fort irrégulière ; il est très-mince ; il a cinq lignes de longueur ; il est un peu courbe , cannelé , & terminé à son extrémité antérieure par deux petits tubercules.

## N.º D C D X V I I I.

*Une peau de polatouche.*

Cette peau est beaucoup plus grande que  
Hvj

celle qui est rapportée sous le N.<sup>o</sup> DCDXIII : on l'a enlevée, sans la fendre dans sa longueur, de sorte que la partie qui couvroit le ventre touche à celle qui couvroit le dos ; dans cet état elle a cinq pouces & demi de longueur depuis le devant des épaules jusqu'à l'origine de la queue, & une largeur égale à la longueur. Cette largeur si grande ne peut se trouver que sur un animal de l'espèce, ou au moins du genre du polatouche dont la peau a des prolongemens qui la rendent plus large que dans les autres animaux ; d'ailleurs celle dont il s'agit ici ressemble aussi à la peau du polatouche par la qualité du poil. Il est de couleur cendrée-noirâtre sur la plus grande partie de sa longueur depuis la racine ; la pointe a une couleur grise sur la face supérieure du corps de l'animal, & une couleur blanchâtre sur la face inférieure, mais on ne voit le cendré qu'en écartant les poils les uns des autres : ils ont environ neuf lignes de longueur ; ceux de la queue ont jusqu'à treize lignes ; leur couleur est mêlée de blanchâtre & de cendré-brun. La longueur du tronçon de la queue est de trois pouces ; le poil lui donne un pouce de plus, mais peut-être n'est-elle pas entière. Cette peau a été envoyée de Russie ; elle est du double plus longue & plus large que celle du polatouche qui a été décrit dans ce Volume.

N.º DCDXIX.

*Un petit-gris desséché.*

C'est celui qui a servi de sujet pour la description de cet animal.

N.º DCDXX.

*Le squelette d'un petit-gris.*

La longueur de ce squelette est de huit pouces neuf lignes depuis le bout des mâchoires jusqu'à l'extrémité postérieure de l'os sacrum ; la tête a deux pouces trois lignes & demie de longueur , un pouce trois lignes & demie de largeur , & trois pouces neuf lignes de circonférence , prise à l'endroit le plus gros. Ce squelette a été tiré de l'animal rapporté sous le numéro précédent.

N.º DCDXXI.

*L'os de la verge d'un petit-gris.*

Cet os ressemble à celui de la verge de l'écureuil. Voyez la pl. XXXIV, fig. 4, tome XV de cet Ouvrage , qui représente l'os de la verge de l'écureuil.

N.º DCDXXII.

*Une peau de petit-gris du Groenland.*

Cette peau vient d'un animal à peu près

de la même grandeur que celui qui est rapporté sous le N.<sup>o</sup> DCDXIX, mais elle en diffère par la qualité du poil qui est plus doux & par les couleurs. Le dessus & les côtés du cou & du corps paroissent entièrement gris au premier coup d'œil, mais en regardant de plus près on aperçoit un mélange de fauve & de noirâtre; en effet, chaque poil est de couleur cendrée-noirâtre sur la moitié de sa longueur depuis la racine, il y a une couleur blanchâtre ou quelque apparence de fauve au-dessus du cendré, & le reste du poil est alternativement noir & blanc ou blanchâtre: le dessous du cou, la poitrine & le ventre sont blancs avec des teintes de jaunâtre: les poils de la queue sont de couleur cendrée près de la racine, au-dessus du cendré il y a du blanchâtre, & ensuite du noirâtre & encore du blanchâtre & du noirâtre, & enfin du fauve & du noir; ces poils n'ont guère plus d'un pouce & demi de longueur: le poil du corps est aussi long que celui du petit-gris dont il a été fait mention sous le N.<sup>o</sup> DCDXIX. On apporte de Sibérie des peaux de petit-gris semblables à celles dont il s'agit: on donne le nom de *petit-gris blanc* à ces peaux de Sibérie & à celles du Groenland.

### N.<sup>o</sup> DCDXXIII.

*Une peau de petit-gris d'Yrlek.*

Le poil de cette peau est encore plus doux,

& il a plus de longueur que celui du petit-gris du Groenland & de Sibérie; il est d'un gris plus pâle; il a moins de mélange de noir, mais le fauve y est plus apparent.

## N.° D C D X X I V.

*Une peau de petit-gris de Casan.*

Cette peau m'a paru ne différer de celle du petit-gris du Groenland & de Sibérie, qu'en ce que le gris est moins clair, & qu'il y a du fauve le long du dos.

## N.° D C D X X V.

*Autre peau de petit-gris de Casan.*

Elle diffère de la précédente par la teinte de la couleur fauve du milieu du dos, qui est plus foncée & presque rousse. Il vient de pareilles peaux de petit-gris de Tartarie, de Livonie & de Novogorod : on les nomme dans le commerce *gris-commun*.

## N.° D C D X X V I.

*Une peau de petit-gris de Norvége.*

Cette peau a le poil d'un gris plus foncé que celui du petit-gris du Groenland & de Sibérie, rapporté sous le N.° D C D X X I I, parce que le poil du petit-gris de Norvége a moins de blanchâtre, & que sa couleur cen-

drée est foncée & bleuâtre ; aussi donne-t-on à cette fourrure dans le commerce le nom de *gris-bleu* : il y a des teintes de fauve le long du milieu du dos. Au reste cette peau ressemble à celle du petit-gris du Groenland & de Sibérie : on en trouve de pareilles dans l'Islande.

## N.° DCDXXVII.

### *Peau de petit-gris de Sibérie.*

La principale différence qui se trouve entre cette peau & celle du petit-gris de Norvège est dans les couleurs du poil ; elle a un peu moins de fauve sur le dos & beaucoup plus de noir sur la queue, dont le poil a plus de deux pouces de longueur ; le poil du corps est aussi plus long que celui des peaux rapportées sous les numéros précédens : cette fourrure est dans le commerce sous le nom de *gris-noir*.

## N.° DCDXXVIII.

### *Une peau de petit-gris du Nord-cap.*

Les Fourreurs donnent à cette peau, comme à celle du numéro précédent, le nom de *gris-noir*, & cette dénomination est mieux fondée, car le poil n'a que très-peu de gris ; il est presque entièrement de couleur cendrée-brune, qui domine sur le gris & sur une



teinte de fauve qui se trouve principalement le long du dos. Il y a sur la queue autant de noir que sur celle du petit-gris de Sibérie ; & le poil du corps & de la queue a autant de longueur que celui de cet animal.

## N.° D C D X X I X.

### *Un barbaresque empaillé.*

La longueur de cet animal (*pl. X X V I I*) est d'environ cinq pouces depuis le bout du museau jusqu'à la queue. Le dessus de la tête & du cou , & le dos sont de couleur roussâtre mêlée de cendré : il y a de plus sur le dos quatre bandes longitudinales jaunâtres & deux bandes noires ; les bandes jaunâtres ont environ une ligne de largeur , elles s'étendent jusqu'à l'origine de la queue ; cependant elles ne sont pas toutes d'égale longueur , l'extérieure de chaque côté est plus longue que l'intérieure , parce qu'elle commence au-dessus de l'épaule , tandis que l'autre ne commence qu'au-delà du garrot. Les deux bandes noires se trouvent entre les deux bandes jaunâtres internes , & y touchent ; elles ne sont séparées l'une de l'autre que par un espace d'une ligne de largeur. Les côtés de la tête & du cou , & la face externe des quatre jambes ont une couleur cendrée teinte de roussâtre ; le dessous de la tête & du cou , la poitrine , le ventre & la face interne des quatre jambes sont de couleur

blanchâtre avec une teinte de jaunâtre : la longueur du poil n'est que de trois lignes. Chaque pied a cinq doigts, mais le pouce des pieds de devant est très-court, comme dans l'écureuil & le rat.

N.º D C D X X X.

*Un écureuil suisse empaillé.*

Cet animal (*pl. XXVIII*) est un peu plus petit que le barbaresque ; il n'a qu'environ quatre pouces & demi de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue. Ses oreilles sont très-courtes ; le tronçon de la queue est long de deux pouces & demi, le poil qui est au bout donne un pouce de plus pour la longueur totale de la queue ; le poil du dessus & des côtés de la tête est de couleur mêlée de noir, de gris & de roux : il y a neuf bandes, larges chacune d'environ deux lignes, qui s'étendent depuis la tête, le long du cou & du dos jusqu'à la croupe, mais elles sont peu apparentes sur le cou ; la bande du milieu est noire, & il se trouve de chaque côté une bande roussâtre, une noire, une blanchâtre teinte de roussâtre, & enfin une noire ; les côtés du cou, du corps, & de la face externe des jambes sont de couleur roussâtre ; le dessous de la tête & du cou, la poitrine, le ventre & la face interne des jambes ont une couleur blanchâtre. Le poil du corps a environ trois lignes de

longueur, & le poil de la queue huit lignes ; celui-ci est roussâtre près de la racine , noir dans le milieu & blanchâtre à la pointe. Les pieds & les doigts ressemblent à ceux du barbaresque & de l'écureuil. L'animal dont il s'agit ici , a été apporté de Russie par M. de l'Isle , de l'Académie des Sciences.

N.<sup>o</sup> D C D X X X I.

*La peau d'un écureuil suisse.*

Cette peau a sept pouces & demi de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue : quoiqu'elle soit de beaucoup plus longue que celle de l'animal empaillé qui est rapporté sous le numéro précédent , on ne peut pas douter que ces deux peaux ne viennent d'animaux de même espèce, tant elles se ressemblent l'une à l'autre pour les couleurs & la qualité du poil , & par la longueur des oreilles & de la queue. Je présume que la peau dont il s'agit ici , n'est si longue que pour avoir été attachée par les deux bouts pendant le temps qu'elle s'est séchée , de sorte qu'elle n'aura pu se raccourcir que sur sa largeur , aussi les bandes du dos sont moins larges que sur l'écureuil suisse empaillé ; au contraire l'autre peau n'ayant pas été attachée se sera raccourcie sur sa longueur comme sur sa largeur. Je ne fais cette remarque que pour en conclure

qu'il y a lieu de croire que la vraie longueur de l'animal vivant est d'environ six pouces, parce que cette longueur est moyenne entre celle des deux peaux dont il s'agit. Celle qui est rapportée sous le présent numéro, a été envoyée de Russie par M. Tesdorf.






De Sève del.

Herisset fils sculp.

L'ÉCUREUIL BARBARESQUE.





De Seve del.

L. Le Grand Sculp

L'ECUREUIL SUISSE.





## LE TAMANOIR \*

LE TAMANDUA \*\* &amp; le FOURMILLER \*\*\*.

**I**L existe dans l'Amérique méridionale trois espèces d'animaux à long museau ; à gueule étroite & sans aucunes

\* Le Tamanoir, le Fourmillier-tamanoir, le mange-fourmis, le gros mangeur de fourmis. Les Brésiliens appellent cet animal *Tamandua-guacu*, les Naturels de la Guiane l'appellent *Ouariri*. Le nom *Tamanoir* que lui ont donné les François, habitués en Amérique, paroît dériver de *Tamandua*.

*Tamandua-guacu sive major*. Pison, *Hist. Brasil.* pag. 320.

*Tamandua-guacu Brasiliensibus*. Marcgrav. *Hist. nat. Brasil.* pag. 225.

Mange-fourmis ou Renard Américain. *Voyage de Desmarchais*, tome III, page 307.

*Tamandua major caudâ panniculatâ*. Barrère, *Hist. Franc. équiu.* pag. 162.

*Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis*. Linn. *Syst. nat.* edit. IV, pag. 63.—*Myrmecophaga palmis tridactylis, plantis pentadactylis*, edit. VI, pag. 8.—*Tridactyla. Myrmecophaga palmis tridactylis, plantis pentadactylis*, edit. X, pag. 35. *Nora*. Qu'il y a erreur dans toutes ces phrases, cet animal ayant quatre doigts ou plutôt quatre ongles, & non pas trois aux pieds de devant : cette erreur vient originairement de Seba ; M. Linnæus s'en est

denis, à langue ronde & longue qu'ils insinuent dans les fourmillères & qu'ils

apparemment rapporté aux descriptions imparfaites de cet Auteur, & il a cru que les animaux dont il donne les figures (*pl. XXXVII, n.º 2; & pl. XL, n.º 1, vol. I*) étoient le *tamandua-guacu*; il suffisoit cependant de consulter Marcgrave, Pison, Desmarchais, &c. pour s'assurer du contraire.

*Tamandua-guacu, id est, myrmecophaga omnium maxima.* Klein, *de quadrup.* pag. 45, Tab. 5, fig. n.º 1. *Nota.* M. Brisson remarque avec raison que cette figure, donnée par M. Klein, est défectueuse en ce que la tête, le cou & le museau de l'animal sont trop longs, & que l'extrémité du museau en est informe.

*Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, caudâ longissimis pilis vestitâ. . . . . Myrmecophaga tamanoir dicta.* Le fourmiller-tamanoir. Brisson, *Regn. animal.* pag. 24.

\*\* Le *Tamandua*, nom de cet animal au Brésil, & que nous avons adopté.

*Tamandua-i Brasiliensibus.* Pison, *Hist. Brasil.* pag. 321. — Marcgrav. *Hist. nat. Brasil.* pag. 225.

*Myrmecophaga manibus tetradactylis; plantis pentadactylis.* Linn. *Syst. nat.* edit. VI, pag. 8. — *Tetradactyla.* *Myrmecophaga palmis tetradactylis, plantis pentadactylis,* edit. X, pag. 35.

*Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, caudâ fere nudâ. . . . . Myrmecophaga.* Le fourmiller. Brisson, *Regn. anim.* pag. 26.

*du Tamanoir, Tamandua, &c. 191*

retirent pour avaler les fourmis dont ils font leur principale nourriture. Le premier de

\*\*\* Le Fourmiller , le plus petit fourmiller , le petit mangeur de fourmis , animal Américain que les Naturels de la Guiane appellent *Ouatiriouaou*.

*Tamandua minor flavescens*. Barrère, *Hist. franc. équin.* pag. 163.

*Tamandua seu coati Americana alba alitra*. Seba, vol. I, pag. 60, Tab. 37, fig. n.º 3.

*Myrmecophaga manibus monodactylis, plantis tetradactylis*. Linnæi, *Syst. nat.* edit. IV, pag. 63.

*Nota.* Qu'il y a erreur dans cette phrase, cet animal ayant deux doigts ou plutôt deux ongles, & non pas un seul doigt ou un seul ongle aux pieds de devant; seulement le second, qui est l'interne, est beaucoup plus petit que le premier qui est l'externe: M. Linnæus avoit probablement construit cette phrase indicative comme celle du tamanoir sur les figures données par Seba, qui dit en effet, page 60 de son *Thesaurus*, que l'animal dont il est ici question n'a qu'un doigt à chaque pied de devant; ce trésor de Seba est un magasin mal rangé & rempli de pareilles fautes; M. Linnæus a reconnu & corrigé celle-ci dans les éditions suivantes de son Ouvrage. *Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradactylis*. Linnæi, *Syst. nat.* edit. VI, pag. 8; & edit. X, pag. 35.

*Myrmecophaga rostro brevi, pedibus anticis didactylis, posticis tetradactylis*. . . . . *Myrmecophaga*. Le petit fourmiller. Brisson, *Regn. animal.* p. 28.

*The little ant-eater*. Edwards *Glanures*. London, 1758, pag. 20.

ces mangeurs de fourmis est celui que les Brasiiliens appellent *Tamandua - guacu*, c'est-à-dire, *grand Tamandua*, & auquel les François habitués en Amérique, ont donné le nom de *Tamanoir*, c'est un animal qui a environ quatre pieds de longueur depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue, la tête longue de quatorze à quinze pouces, le museau très - alongé, la queue longue de deux pieds & demi, couverte de poils rudes & longs de plus d'un pied; le cou court, la tête étroite, les yeux petits & noirs, les oreilles arrondies, la langue menue, longue de plus de deux pieds, qu'il replie dans sa gueule lorsqu'il la retire toute entière. Ses jambes n'ont qu'un pied de hauteur; celles de devant sont un peu plus hautes & plus menues que celles de derrière : il a les pieds ronds; ceux de devant sont armés de quatre ongles, dont les deux du milieu sont les plus grands; ceux de derrière ont cinq ongles. Les poils de la queue, comme ceux du corps, sont mêlés de noir & de blanchâtre; sur la queue ils sont disposés en forme de panache :  
l'animal

l'animal la retourne sur le dos, s'en couvre tout le corps lorsqu'il veut dormir ou se mettre à l'abri de la pluie & de l'ardeur du soleil ; les longs poils de la queue & du corps ne sont pas ronds dans toute leur étendue , ils sont plats à l'extrémité & secs au toucher comme de l'herbe desséchée ; l'animal agite fréquemment & brusquement sa queue lorsqu'il est irrité , mais il la laisse traîner en marchant quand il est tranquille , & il balaie le chemin par où il passe : les poils des parties antérieures de son corps sont moins longs que ceux des parties postérieures ; ceux-ci sont tournés en arrière & les autres en avant ; il y a plus de blanc sur les parties antérieures , & plus de noir sur les parties postérieures : il y a aussi une bande noire sur le poitrail qui se prolonge sur les côtés du corps & se termine sur le dos près des lombes : les jambes de derrière sont presque noires , celles de devant presque blanches avec une grande tache noire vers leur milieu. Le tamanoir marche lentement , un homme peut aisément l'atteindre à la course ; ses pieds paroissent moins faits pour marcher

que pour grimper & pour saisir des corps arrondis , aussi serre-t-il avec une si grande force une branche ou un bâton qu'il n'est pas possible de les lui arracher.

Le second de ces animaux est celui que les Américains appellent simplement *Tamandua* , & auquel nous conserverons ce nom ; il est beaucoup plus petit que le tamanoir , il n'a qu'environ dix-huit pouces depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue : sa tête est longue de cinq pouces , son museau est alongé & courbé en dessous ; il a la queue longue de dix pouces & dénuée de poils à l'extrémité , les oreilles droites , longues d'un pouce ; la langue ronde , longue de huit pouces , placée dans une espèce de gouttière ou de canal creux au dedans de la mâchoire inférieure ; ses jambes n'ont guère que quatre pouces de hauteur , ses pieds sont de la même forme & ont le même nombre d'ongles que ceux du tamanoir , c'est-à-dire , quatre ongles à ceux de devant & cinq à ceux de derrière. Il grimpe & serre aussi-bien que le tamanoir , & ne marche pas mieux ; il ne se couvre pas de sa queue qui ne

pourroit lui servir d'abri étant en partie dénuée de poil, lequel d'ailleurs est beaucoup plus court que celui de la queue du tamanoir : lorsqu'il dort il cache sa tête sous son cou & sous ses jambes de devant.

Le troisième de ces animaux est celui que les Naturels de la Guiane appellent *Ouatiriouaou*. Nous lui donnons le nom de *Fourmiller* pour le distinguer du tamanoir & du tamandua. Il est encore beaucoup plus petit que le tamandua, puisqu'il n'a que six ou sept pouces de longueur depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue : il a la tête longue de deux pouces ; le museau proportionnellement, beaucoup moins alongé que celui du tamanoir ou du tamandua ; sa queue, longue de sept pouces, est recourbée en dessous par l'extrémité qui est dégarinée de poils ; sa langue est étroite, un peu aplatie & assez longue ; le cou est presque nul, la tête est assez grosse à proportion du corps, les yeux sont placés bas & peu éloignés des coins de la gueule, les oreilles sont petites & cachées dans le poil, les jambes n'ont que trois pouces de hauteur, les pieds de devant n'ont

que deux ongles , dont l'externe est bien plus gros & bien plus long que l'interne ; les pieds de derrière en ont quatre , le poil du corps est long d'environ neuf lignes , il est doux au toucher & d'une couleur brillante , d'un roux mêlé de jaune - vif ; les pieds ne sont pas faits pour marcher , mais pour grimper & pour saisir ; il monte sur les arbres & se suspend aux branches par l'extrémité de sa queue.

Nous ne connoissons dans ce genre d'animaux que les trois espèces desquelles nous venons de donner les indications. M. Brisson fait mention , d'après Seba , d'une quatrième espèce sous le nom de *Fourmiller aux longues oreilles* , mais nous regardons cette espèce comme douteuse , parce que dans l'énumération que fait Seba des animaux de ce genre , il nous a paru qu'il y avoit plus d'une erreur : il dit expressément , *nous conservons dans notre Cabinet six espèces de ces animaux mangeurs de fourmis* , cependant il ne donne la description que de cinq ; & parmi ces cinq animaux il place l'*Ysqiepatl* ou *Mouffette* qui est un animal



non-seulement d'une espèce, mais d'un genre très-éloigné de celui des mangeurs de fourmis, puisqu'il a des dents<sup>a</sup>, & la langue plate & courte comme celle des autres quadrupèdes, & qu'il approche beaucoup du genre des belettes ou des martes. De ces six espèces prétendues & conservées dans le cabinet de Seba, il n'en reste donc déjà que quatre, puisque l'*Ytquiepatl* qui faisoit la cinquième n'est point du tout un mangeur de fourmis, & qu'il n'est question nulle part de la sixième, à moins que l'Auteur n'ait sous-entendu comprendre parmi ces animaux le *Pangolin*<sup>b</sup>, ce qu'il ne dit pas dans la description qu'il donne ailleurs de cet animal. Le pangolin se nourrit de fourmis; il a le museau alongé, la gueule étroite & sans aucune dent apparente, la

<sup>a</sup> *Vapulavit aliquando optimus autor de nominibus propriis, si ysquiepatl seu vulpeculam Mexicanam, tamanduan dixit, pag. 66. Quasi aliquam omnino speciem, canis septentrionalis fere ænulam, maxillâ inferiore crassâ & rotundâ, binis insignibus dentibus armatâ, cum tamen de sex diversis speciebus sit professus, quod omnes dentibus careant. Klein, de quadr. pag. 43.*

<sup>b</sup> C'est le nom que nous donnerons au Lézard écailleux.

langue ronde ; caractères qui lui sont communs avec les mangeurs de fourmis ; mais il en diffère , ainsi que de tous les autres quadrupèdes , par un caractère unique qui est d'avoir le corps couvert de grosses écailles au lieu de poil : d'ailleurs c'est un animal des climats les plus chauds de l'ancien continent , au lieu que les mangeurs de fourmis dont le corps est couvert de poil , ne se trouvent que dans les parties méridionales du nouveau monde ; il ne reste donc plus que quatre espèces au lieu des six annoncées par Seba , & de ces quatre espèces , il n'y en a qu'une de reconnoissable par ses descriptions : c'est la troisième de celles que nous décrivons ici , c'est - à - dire , celle du fourmiller auquel , à la vérité Seba ne donne qu'un doigt à chaque pied de devant \* , quoiqu'il en ait deux , mais

\* N.º 3. *Tamandua* ou *Coati d'Amérique blanche* différente. Cet animal est tout-à-fait différent du précédent ( il entend celui de la planche XXXVII , fig. n.º 2. Voyez la note suivante ). La tête en est beaucoup plus courte & les oreilles beaucoup plus petites , les yeux un peu plus grands & la partie inférieure du museau tant soit peu plus longue. Leurs langues sont plus ressemblantes ; l'une &

qui malgré ce caractère manchot, ne peut être que notre fourmillier. Les trois autres sont si mal décrits qu'il n'est pas possible de les rapporter à leur véritable espèce. J'ai cru devoir citer ici ces descriptions en entier, non-seulement pour prouver ce que je viens d'avancer, mais pour donner une idée de ce gros ouvrage de Seba, & pour qu'on juge de la confiance qu'on peut accorder à cet Écrivain. L'animal qu'il désigne par le nom de *Tamandua murmecophage d'Amérique*, tome I, page 60, & dont il donne la figure, pl. XXXVII, n.<sup>o</sup> 2, ne peut se rapporter à aucun des trois dont il est ici question; il ne faut pour en être convaincu, que lire la description de

l'autre est longue & étroite, & propre à prendre & à avaler des fourmis. Les épaules sont larges, le corps court & épais, les pieds de devant présentent un doigt armé d'un ongle large & courbe. Les jambes & les pieds de derrière imitent ceux d'un singe. Son poil blanchâtre & laineux est plus court que celui du précédent; il en est de même de sa queue crépue; cet animal est compté parmi un des plus rares de son espèce. Les Éthiopiens de Surinam les appellent *Coari*, & racontent que quand ils se sentent pris ils se mettent tellement en rond, ayant leurs pieds si fermement attachés l'un contre l'autre,

l'Auteur \*. Le second qu'il indique sous

qu'à moins qu'ils ne se redressent d'eux-mêmes, il ne seroit pas possible d'en venir à bout de force. Ils meurent dans un moment dès qu'on les trempe dans l'esprit-de-vin ou dans la liqueur *kilduivel*. Seba, vol. 1, pages 60 & 61, pl. XXXVII, fig. n.º 3.

\* N.º 2. *Tamandua murmecophage d'Amérique*. Cet animal est extrêmement commun dans les Indes occidentales, mais nous n'en avons jamais vu qu'on eût transporté des Indes orientales, ni entendu dire qu'il s'en trouvât. Quelques Savans se font des idées toutes merveilleuses de cet animal; les uns le prennent pour le lion *formicarius*, les autres pour le *formica-leo*, ceux-ci pour le *formica-vulpes*, & les autres pour le *formica-lupus*. M. Poupard, page 235 des *Mémoires de l'Académie royale des Sciences*, année 1704, a remarqué que cet animal étoit gris, semblable à une araignée, & qu'il tendoit même des embûches aux fourmis. Cette comparaison ne nous paroît pas fort juste. Bastamantanus qui a fait un livre entier sur les reptiles, dont il est fait mention dans les Livres saints, regarde le *murmeco-leo*, nom que quelques personnes lui donnent, pour une espèce d'escarbot qu'on appelle *Escarbot cornu*, & que les Allemands nomment *Cerf-volant* ( tout ceci est, comme l'on voit, fort important & fort utile pour la description d'un animal quadrupède ); mais continue l'Auteur, toutes ces descriptions & plusieurs autres n'expriment point la nature de cet animal, dont nous donnons la figure prise sur l'original: celui que l'on voit ici est incarnat, couvert d'un poil doux & comme la laine, au cou court, aux épaules larges, à la tête & au museau long & étroit,

le nom de *Tamandua-guacu* du *Bresil*, ou

d'où sort une longue langue propre à prendre & à avaler les fourmis qui lui servent de nourriture. La sagesse du Créateur a donné à ces animaux les organes qui leur étoient nécessaires pour qu'ils pussent se pourvoir de leur nourriture à leur goût & à leur volonté. Les pattes de devant, ainsi que celles d'un ours, ont chacune, outre les doigts ordinaires, trois autres doigts qui ont crû par-dessus les autres & qui sont armés d'un ongle crochu, lequel est principalement très-grand dans le doigt du milieu. C'est là avec quoi ils grattent la terre & en tirent les nids des fourmis. Les narines, placées très-proche de la gueule, sont étroites, rudes & garnies de poils, dont ils se servent pour flairer où est leur manger. Les oreilles sont oblongues ou pendantes; les pieds de derrière, dans cette espèce de tamandua comme dans les ours, sont partagés en cinq doigts, garnis d'ongles longs & crochus, & sont contenus outre cela sur des talons très larges. La queue longue & velue finit en pointe, & ils s'en servent, ainsi que les singes, à se tenir fortement attachés aux arbres : la partie propre à la génération dans les mâles est remarquable; ils portent leurs testicules cachés sous la peau & en dedans. Les fourmis, tant grandes que petites, deviennent la proie de ces animaux, qui à leur tour servent aux hommes, sur-tout dans la Médecine Seba, *vol. I, page 60, pl. XXXVII, fig. n.º 2.* Il faut être bien aveuglément confiant pour établir quelque chose sur une pareille description, & pour la rapporter au tamanoir ou tamandua-guacu, comme l'a fait M. Linnæus, & de ne donner en même temps à cet animal que trois doigts aux pieds de devant, tandis que par cette description

## l'Ours qui mange les fourmis \*, pages 65

même , il en a trois outre les doigts ordinaires, trois, dit-on, qui ont crû par-dessus les autres, chose absurde & qui auroit dû faire douter de tout le reste.

\* N.º 2. *Tamandua-guacu* du Bresil, ou l'Ours qui mange les fourmis. C'est ici la plus grande de toutes les espèces d'animaux que nous ayons vu. Marcgrave la nomme *Tamandua-guacu*, & Cardan *Ursus formicarius*; c'est-à-dire, l'Ours qui mange les fourmis. Cet animal a le corps long, les épaules hautes & larges, la tête fort étendue, le museau diminuant insensiblement, & les narines amples & ouvertes. Sa longue langue qu'il peut tirer en avant d'un huitième de coudée, ce qui lui est très-avantageux pour attraper les fourmis, finit en une pointe dont le bout forme un petit rond; ses oreilles sont longues & pendantes, ses yeux assez grands sont défendus par d'épaisses paupières, son museau est long, tout ridé, garni de peu de poil; sa tête qui est plate & petite est couverte de poils assez pressés; tout le reste du corps de cet animal est velu de poils longs & épais assez semblables à des soies de cochon, mais qui cependant près de la peau deviennent cotonneux & plus fins; leur couleur est d'un châtain-clair, & sous le ventre d'un brun plus foncé; le dessus de la queue, qui est longue & finissant en pointe, est d'un fauve-clair; sa femelle, ici dépeinte, a huit tettes qui sortent hors du ventre, à savoir, trois de chaque côté, & deux entre les pieds de devant. Des témoins dignes de foi rapportent qu'elle met bas à chaque portée autant de petits qu'elle a de tettes, en quoi elle auroit conformité avec les truies qui ne mettent bas beaucoup de petits d'une ventrée, que lorsqu'elles

Et 66, pl. XL, fig. n.º 1, est indiqué

ont plusieurs têtes. Les pieds de devant & de derrière ne diffèrent de ceux qu'on a décrits au n.º 2 de la planche précédente (il auroit dû dire de la pl. XXVII; car la planche précédente à celle-ci est la planche XXXIX.º où il n'est pas question des mangeurs de fourmis), qu'en ce qu'ils sont plus grands; les plus grosses fourmis lui servent de nourriture.

Nous conservons dans notre cabinet six espèces de ces animaux mangeurs de fourmis, qui diffèrent entre eux ou par une forme particulière, ou par la tête, les pieds & les ongles. La tamandua, représentée au n.º 2, qui suit (NOTA. Qu'il s'agit ici de l'*ysquiepatl* qui est plus différente d'un tamandua qu'un chat ne l'est d'un chien), est d'un quart plus petite que celle-ci, & a aussi la tête, les oreilles & les yeux plus petits: son pied de devant a un seul ongle, fort & crochu; & celui de derrière a trois doigts & trois ongles, au lieu que les quatre autres espèces ont cinq doigts armés d'autant d'ongles. Leur poil est doux, cotonneux, de la couleur de celui d'un jeune lièvre. La cinquième espèce de tamandua est de la même figure, d'un poil rouge-pâle qui est sur le dos d'un blanc-argenté, & dessous d'un cendré-jaunâtre; cette espèce a quatre têtes & quatre mamelons, deux sous les jambes de devant & deux sous celles de derrière (cette cinquième espèce, qui est de la même figure que celle qui la précède, est donc encore une espèce d'*ysquiepatl* & non pas de tamandua). La sixième espèce a le museau plus long & les oreilles dressées comme celles d'un renard; toutes ces espèces n'ont point de dents. Seba, vol. I, pag. 65 & 66, Tab. 40, fig. n.º 1. On ne sait ce que veut dire ici l'Auteur, ni ce que ce peut être que cette sixième espèce; on voit



d'une manière vague & équivoque ; cependant je penferois , avec M.<sup>rs</sup> Klein<sup>a</sup> & Linnæus , que ce pourroit être le vrai *tamandua-guacu* ou *tamanoir* , mais si mal décrit & si mal représenté que M. Linnæus<sup>b</sup> a réuni sous une seule espèce le premier & le second de ces animaux de Seba , c'est - à - dire , celui de la planche XXXVII, fig. n.<sup>o</sup> 2, & celui de la planche XL, fig. n.<sup>o</sup> 1. M. Brisson a regardé ce dernier comme une espèce particulière , mais je ne crois pas que l'établissement de cette espèce soit fondé , non plus que le reproche qu'il fait à M. Klein de l'avoir confondue avec

*seulement qu'il se contredit d'une manière manifeste lorsqu'il avance que toutes ces espèces n'ont point de dents , puisque l'ysquieparl , qui est nommément compris dans les six , a des dents , & même en grand nombre. En voilà plus qu'il n'en faut pour juger & l'ouvrage & l'auteur. Il est fâcheux que la plupart des gens qui font des cabinets d'Histoire Naturelle , ne soient pas assez instruits , & que pour satisfaire leur petite vanité & faire valoir leur collection , ils entreprennent d'en publier des descriptions toujours remplies d'exagérations , d'erreurs & de bêtises qui demandent plus de temps pour être réformées qu'il n'en a fallu pour les écrire.*

<sup>a</sup> Klein , de quadrup. pag. 45.

<sup>b</sup> Linn. Syst. nat. edit. x , pag. 35.



celle du tamanoir : il paroît que le seul reproche qu'on puisse faire à M. Klein, est d'avoir joint à la bonne description qu'il nous donne de cet animal, dont la peau bourrée est conservée dans le cabinet de Dresde, les indications fautives de Seba. Enfin le troisième de ces animaux, dont on trouve la figure dans cet ouvrage, vol. II, page 48, pl. XLVII, n.<sup>o</sup> 2, est si mal décrit que je ne puis me persuader, malgré la confiance que j'ai à M.<sup>rs</sup> Linnæus & Bissou, qu'on puisse sur la description & la figure de l'Auteur, rapporter, comme ils l'ont fait, cet animal au *tamandua-i*, que j'appelle simplement *tamandua* : je demande seulement qu'on lise encore cette description \*, & qu'on juge. Quelque désagréables, quelqu'en-

\* *Tamandua d'Amérique petit, ou le mangeur de fourmis déjeint avec un nid de ces insectes.* Voilà comme il embrasse avec les ongles de ses pieds de devant le nid de fourmis, d'où il fait uniquement ses repas. Voyez sa tête oblongue, mince, étroite, ses courtes oreilles, son museau pointu qui cache sa langue, grande & menue, avec laquelle il attrappe les fourmis & les avale, ainsi que nous nous proposons de le montrer à l'œil dans les planches qui suivront (il ne montre rien dans les planches suivantes) : sa tête, ses jambes, ses pieds, sa queue & le devant de son corps sont jaunes-pâillés, le

nuieufes que foient des diffuffions de cette efpèce , on ne peut les éviter dans les détails de l'Histoire Naturelle : il faut , avant d'écrire fur un fujet , fouvent très-peu connu , en écarter autant qu'il eft poffible toutes les obfcu-rités , marquer en paffant les erreurs qui ne manquent jamais de fe trouver en nombre fur le chemin de la vérité à laquelle il eft fouvent très-difficile d'arriver , moins par la faute de la Nature que par celle des Naturaliftes.

Ce qui réfulte de plus certain de cette critique ; c'eft qu'il existe réellement trois efèces d'animaux auxquels on a donné le nom commun de *mangeurs de fourmis* ; que ces trois efèces font le tamanoir , le tamandua & le fourmiller ; que la quatrième efèce , donnée fous le nom de *fourmiller aux longues oreilles* par M.

derrière du corps eft d'un roux-brun ; il porte en bandoulière , fur la poitrine , un baudrier de poils foyeux qui fe perdent vers le milieu du dos avec les autres foies qui commencent dès-lors à le couvrir ; la queue eft courte , prefque rafe & recourbée en dedans. Seba , vol. II , pag. 48 , Tab. 47 , fig. n.º 2.  
*NOTA.* Les derniers caractères de cette description conviennent affez au tamandua , mais en général elle eft trop peu exacte pour qu'on puiſſe l'affurer.

Briffon, est douteuse aussi-bien que les autres espèces indiquées par Seba. Nous avons vu le tamanoir & le fourmiller, nous en avons les dépouilles au Cabinet du Roi; ces espèces sont certainement très-différentes l'une de l'autre & telles que nous les avons décrites, mais nous n'avons pas vu le tamandua, & nous n'en parlons que d'après Pison & Marcgrave qui sont les seuls Auteurs qu'on puisse consulter sur cet animal, puisque tous les autres n'ont fait que les copier.

Le tamandua fait, pour ainsi dire, la moyenne proportionnelle entre le tamanoir & le fourmiller pour la grandeur du corps; il a, comme le tamanoir, le museau fort alongé & quatre doigts aux pieds de devant; mais il a, comme le fourmiller, la queue dégarnie de poil à l'extrémité, par laquelle il se suspend aux branches des arbres. Le fourmiller a aussi la même habitude: dans cette situation ils balancent leur corps, approchent leur museau des trous & des creux d'arbres, ils y insinuent leur longue langue & la retirent ensuite brusquement pour avaler les insectes qu'elle a ramassés.

Au reste ces trois animaux, qui dif-

ferent si fort par la grandeur & par les proportions du corps , ont néanmoins beaucoup de choses communes , tant pour la conformation que pour les habitudes naturelles : tous trois se nourrissent de fourmis , & plongent aussi leur langue dans le miel & dans les autres substances liquides ou vitqueuses ; ils ramassent assez promptement les miettes de pain & les petits morceaux de viande hachée ; on les apprivoise & on les élève aisément ; ils soutiennent long-temps la privation de toute nourriture ; ils n'avalent pas toute la liqueur qu'ils prennent en buvant , il en retombe une partie qui passe par les narines ; ils dorment ordinairement pendant le jour , & changent de lieu pendant la nuit ; ils marchent si mal qu'un homme peut les atteindre facilement à la course dans un lieu découvert. Les Sauvages mangent leur chair qui cependant est d'un très-mauvais goût.

On prendroit de loin le tamanoir pour un grand renard , & c'est par cette raison que quelques Voyageurs l'ont appelé *Rona d'américain* ; il est assez fort pour se défendre d'un gros chien & même d'un jaguar ; lorsqu'il en est attaqué il

se bat d'abord debout , & , comme l'ours , il se défend avec les mains dont les ongles sont meurtriers ; ensuite il se couche sur le dos pour se servir des pieds comme des mains , & dans cette situation il est presque invincible & combat opiniâtement jusqu'à la dernière extrémité , & même lorsqu'il a mis à mort son ennemi , il ne le lâche que très-long-temps après ; il résiste plus qu'un autre au combat , parce qu'il est couvert d'un grand poil touffu , d'un cuir fort épais , & qu'il a la chair peu sensible & la vie très-dure.

Le tamanoir , le tamandua & le fourmiller sont des animaux naturels aux climats les plus chauds de l'Amérique , c'est-à-dire , au Brésil , à la Guiane , aux pays des Amazones , &c. On ne les trouve point en Canada ni dans les autres contrées froides du Nouveau monde , on ne doit donc pas les retrouver dans l'ancien continent ; cependant Kolbe <sup>a</sup> & Desmarchais <sup>b</sup> ont écrit qu'il y avoit de ces animaux en Afrique , mais il me

<sup>a</sup> Description du cap de Bonne-espérance , par Kolbe , *tome III* , page 43.

<sup>b</sup> Voyage de Desmarchais , *tome III* , page 307.

paroît qu'ils ont confondu le pangolin ou lézard écailléux avec nos fourmilliers. C'est peut-être d'après un passage de Marcgrave où il est dit : *Tamandua-guacu Brasiliensibus, Congensibus (ubi & frequens est) umbulu dictus*, que Kolbe & Desmarchais sont tombés dans cette erreur ; & en effet si Marcgrave entend par *Congensibus* les Naturels de Congo, il aura dit le premier que le tamanoir se trouvoit en Afrique, ce qui cependant n'a été confirmé par aucun autre témoin digne de foi ; Marcgrave lui-même n'avoit certainement pas vu cet animal en Afrique, puisqu'il avoue qu'en Amérique même il n'en a vu que les dépouilles. Desmarchais en parle assez vaguement, il dit simplement qu'on trouve cet animal en Afrique comme en Amérique, mais il n'ajoute aucune circonstance qui puisse prouver le fait ; & à l'égard de Kolbe nous comptons pour rien son témoignage, car un homme qui a vu au cap de Bonne-espérance des élans & des loups-cerviers tous semblables à ceux de Prusse, peut bien aussi y avoir vu des tamandua. Aucun des Auteurs qui ont écrit sur les productions de l'Afrique

& de l'Asie, n'ont parlé des tamandua, & au contraire tous les Voyageurs & presque tous les Historiens de l'Amérique en font mention précise; de Lery, de Laët<sup>a</sup>, le P. d'Abbeville<sup>b</sup>, Maffé<sup>c</sup>, Faber, Nieremberg<sup>d</sup> & M. de la Condamine<sup>e</sup> s'accordent à dire avec Pison, Barrère, &c. que ce sont des animaux naturels aux pays chauds de l'Amérique, ainsi nous ne doutons pas que Desmarchais & Kolbe ne se soient trompés, & nous croyons pouvoir assurer de nouveau que ces trois espèces d'animaux n'existent pas dans l'ancien continent.

<sup>a</sup> Description des Indes occidentales, par Jean de Laët, pages 485 & 556.

<sup>b</sup> Mission en l'île de Maragnon, par le Père d'Abbeville. Paris, 1614, page 248.

<sup>c</sup> Histoire des Indes, par Maffé, traduite par de Pure. Paris, 1665, page 71.

<sup>d</sup> Euseb. Nieremberg, *Hist. nat.* Antuerpiæ, 1635, pag. 190 & 191.

<sup>e</sup> Voyage de la rivière des Amazones, par M. de la Condamine, page 167.



---

## DESCRIPTION DU TAMANOIR.

**L**E crâne du Tamanoir (*p<sup>l</sup>. XXIX*) est fort petit, mais son museau est si long que la tête entière fait plus du tiers de la longueur de l'animal depuis le bout des lèvres jusqu'à l'origine de la queue ; la longueur du museau est à peu près les deux tiers de celle de la tête & presque le quart de celle du corps entier, y compris le crâne & le museau. C'est comme si le museau d'un cheval de taille médiocre avoit deux pieds de longueur, tandis qu'il n'a que treize ou quatorze pouces, quoique parmi les animaux de notre climat le cheval soit un de ceux qui ont le museau le plus long, c'est-à-dire qui ont les yeux le plus éloignés du bout des lèvres. Le museau du tamanoir est presque cylindrique, il a peu de diamètre, il n'est guère plus gros près des yeux qu'à son extrémité ; la bouche est petite ; les ouvertures des narines se trouvent fort près l'une de l'autre au-devant du museau, à deux lignes au-dessus du bord de la lèvre ; les yeux sont petits à proportion de la longueur du museau, & placés sur les côtés de la tête ; les oreilles sont courtes, arrondies & fort éloignées des yeux ; elles étoient nues : le crâne a une



forme allongée & presque cylindrique depuis les oreilles jusqu'aux yeux. Le tamanoir a le cou court, le corps allongé & efflanqué, la queue longue & les jambes courtes. Les pieds de derrière ont cinq doigts, & ceux de devant seulement quatre; les deux du milieu sont plus gros & portent des ongles beaucoup plus grands que les deux autres doigts des pieds de devant & que ceux des pieds de derrière, le doigt intérieur des pieds de devant est placé plus haut que le second, comme dans la plupart des autres animaux. La dernière phalange des doigts a une gouttière longitudinale sur sa face supérieure depuis le milieu de sa longueur jusqu'à l'extrémité.

Le poil du museau est court, incliné en avant, délié, ferme, & néanmoins doux sous la main lorsqu'elle suit sa direction. Il étoit de couleur mêlée de gris, de brun & de noirâtre : le poil de la tête ne différoit de celui du museau qu'en ce qu'il étoit un peu plus long. Il y avoit depuis l'occiput le long du cou, du dos & des lombes, jusqu'à la queue un poil long en forme de crinière; il étoit de plus en plus long à mesure qu'il se trouvoit plus près de la queue; sa plus grande longueur étoit de treize ou quatorze pouces : la crinière étoit disposée en épi ou molette \* sur le garrot, de sorte que le poil

\* Voyez le volume VII, partie II de cet Ouvrage, page 398, où ces termes d'*épi* ou *molette* sont expliqués dans la description du Cheval.

de la portion de la crinière , qui s'étendoit depuis le garrot jusqu'à l'occiput, étoit dirigé en avant , & celui du reste de la crinière , depuis le garrot jusqu'à la queue , étoit dirigé en arrière : chaque poil avoit une couleur blanchâtre teinte de jaunâtre très-pâle sur la plus grande partie de sa longueur depuis la racine ; le reste étoit noir , excepté la pointe qui avoit aussi une couleur jaunâtre très-pâle & presque blanchâtre : ce mélange de noir & de blanchâtre s'étendoit de chaque côté de la crinière , le long du dos jusqu'à une large bande entièrement noire qui couvroit le dessous du cou & qui s'étendoit sur les épaules & le long des côtés de la poitrine jusqu'au commencement des lombes. Les jambes de devant & le bas des côtés de la poitrine étoient de couleur blanchâtre teinte de jaunâtre , excepté la face externe du bras qui avoit un mélange de noir , & les pieds qui étoient noirs ; il y avoit aussi une grande tache noire sur le haut de la face externe de l'avant-bras. Le dessous de la poitrine , le ventre , les flancs , les jambes de derrière & la queue étoient noirs avec quelque mélange de blanchâtre , principalement sur les pieds de derrière. Les poils de la queue avoient environ un pied de longueur ; ceux du corps n'avoient au plus qu'un demi-pied : les poils du haut des côtés du corps , ceux de la poitrine & du ventre étoient beaucoup moins longs , & ceux de la face externe des jambes

de devant étoient encore plus courts. Les grands poils du tamanoir n'étoient cylindriques que sur une partie de leur longueur depuis la racine, le reste étoit plat, & il y avoit sur le milieu de chaque face une petite gouttière longitudinale : la partie cylindrique étoit creusée d'un bout à l'autre & assez ferme, quoique les parois du tuyau qu'elle formoit fussent minces ; la partie aplatie avoit peu de consistance, elle étoit flexible comme de l'herbe sèche ; elle avoit environ six fois plus de largeur que d'épaisseur, prise sur les bords qui avoient le double de l'épaisseur du milieu où étoient les gouttières ; l'extrémité du poil étoit fourchue. En tirant chacune des branches de cette bifurcation on fendoit très-aisément le poil dans son épaisseur tout le long de la partie plate, mais lorsqu'on arrivoit à la partie cylindrique on ne pouvoit plus la diviser aisément ; il sembloit que l'aplatissement de l'autre partie y eût fait deux plis qui l'avoient disposée à se déchirer comme du papier qui a été plié. Cette partie plate paroissoit être desséchée, peut-être qu'elle est cylindrique sur l'animal vivant, & que le vide de l'intérieur du poil est rempli de quelque humeur.

pieds. pouc. lign.

Longueur du corps entier, depuis le  
bout du museau jusqu'à l'origine de  
la queue. . . . . 3. 8. "

Longueur de la tête depuis le bout  
du museau jusqu'à l'occiput. . . . . 1. 3. "

	pieds.	pouç.	lignes
Circonférence du bout du museau . . .	#	2.	9.
Circonférence du museau , prise au- dessous des yeux . . . . .	#	5.	3.
Contour de l'ouverture de la bouche.	#	2.	4.
Distance entre les deux naseaux . . . .	#	#	2 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil . . . . .	#	9.	9.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille . . . . .	#	2.	5.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.	#	#	6.
Ouverture de l'œil . . . . .	#	#	4.
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en suivant la cour- bure du chanfrein . . . . .	#	2.	8.
La même distance mesurée en ligne droite. . . . .	#	1.	7.
Circonférence de la tête , prise entre les yeux & les oreilles . . . . .	#	6.	7.
Longueur des oreilles . . . . .	#	#	11.
Largeur de la base , mesurée sur la courbure extérieure . . . . .	#	1.	6.
Distance entre les deux oreilles , prise dans le bas . . . . .	#	2.	1.
Longueur du tronçon de la queue . .	2.	#	#
Longueur des plus grands ongles . .	#	2.	3.
Largeur à la base . . . . .	#	#	5 $\frac{1}{4}$ .



## DESCRIPTION



Seve del.

M<sup>re</sup> Rousselot f<sup>me</sup> Tardieu Sculp.

LE TAMANOIR.



# DESCRIPTION

## DU FOURMILLER.

**L**A figure du Fourmiller (*pl. xxx*) est fort différente de celle des autres animaux quadrupèdes; il a le museau & les pieds conformés d'une manière très-particulière. La tête est assez bien proportionnée au reste du corps pour sa grosseur, mais le museau est fort effilé & un peu recourbé en bas; les yeux sont placés près des coins de la bouche, & les oreilles se trouvent sur la partie inférieure des côtés de la tête, à peu près à égale distance du bout du museau & de l'occiput; elles sont très-petites, minces, arrondies & entièrement cachées dans le poil: le cou de l'animal est presque nul. La queue a autant de longueur que le corps & la tête; elle est pointue & recourbée en dessous par l'extrémité; sa face inférieure a, sur la longueur de deux pouces & demi depuis la pointe, une peau dénuée de poil & semblable à celle de la plante des pieds. On voit par cette conformation que le fourmiller se sert de sa queue comme d'une main pour saisir différents corps, & pour s'accrocher & se suspendre à divers points d'appui. Les pieds ressemblent aussi à des mains & paroissent être plus propres pour embrasser des corps cylindriques,

comme des branches d'arbres , que pour marcher à plate-terre : les pieds de devant ont , comme les pieds de derrière , une sorte de talon qui , à la vérité , n'est pas aussi large ni aussi saillant , mais qui forme une convexité en arrière comme le talon de l'ours , du coati , &c. La plante des quatre pieds s'étend jusqu'aux ongles. En rigueur on ne devroit pas mettre cet animal dans la classe des fessipèdes , car on n'y voit point à l'extérieur de doigts séparés les uns des autres ; on ne peut juger de leur nombre que par celui des ongles ; il y en a deux à chaque pied de devant , & quatre à chaque pied de derrière : tous ces ongles sont courbes , pointus & pliés en gouttière très-serrée ; ils ont une couleur jaunâtre & ils prolongent la concavité de la plante des pieds qui est très-profonde & assez régulière , principalement dans les pieds de derrière ; l'ongle externe des pieds de devant est fort grand ; l'interne est beaucoup plus petit & à peu près de la même grandeur que ceux des pieds de derrière , qui sont tous les quatre semblables les uns aux autres.

Le poil est touffu & doux comme de la soie ; sa longueur s'étendoit jusqu'à neuf lignes sur le fourmiller qui a servi de sujet pour cette description , & qui étoit femelle : son poil avoit une couleur jaunâtre mêlée de teintes roussâtres , & même d'un très-beau roux dans quelques endroits ; ces teintes



étoient à la pointe des poils , c'est ce qui formoit sur le dos de l'animal , depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue , une bande large d'environ un demi-pouce , d'un très-beau roux , & des teintes de cette même couleur sur les côtés du corps. Le poil est très-luisant , & par conséquent les couleurs sont fort brillantes.

Sur un autre individu , aussi femelle , la bande rousse du dos étoit très-peu apparente , & il y avoit du brun dans les endroits où on voyoit des teintes rousses sur le sujet de cette description. Un autre fourmiller avoit une bande rousse le long de la poitrine & du ventre , mais il n'en paroissoit point sur le dos.

	pieds.	pouc.	lignes.
Longueur du corps entier , mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus . . . . .	"	6.	"
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput . . . . .	"	1.	11
Circonférence du bout du museau . . . . .	"	1.	"
Circonférence du museau , prise au-dessous des yeux . . . . .	"	1.	6.
Contour de l'ouverture de la bouche . . . . .	"	1.	2.
Distance entre les deux naseaux . . . . .	"	"	1.
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil . . . . .	"	"	8.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille . . . . .	"	"	6.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre . . . . .	"	"	3.

	pieds.	pouc.	ligne
Ouverture de l'œil . . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en suivant la courbure du chanfrein . . . . .	"	"	7 $\frac{1}{2}$
La même distance mesurée en ligne droite . . . . .	"	"	5
Circonférence de la tête entre les yeux & les oreilles . . . . .	"	3	"
Longueur des oreilles . . . . .	"	"	3 $\frac{1}{2}$
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure . . . . .	"	"	3 $\frac{1}{2}$
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas . . . . .	"	"	11 $\frac{1}{2}$
Longueur du cou . . . . .	"	"	5
Circonférence du cou . . . . .	"	3	3
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant . . . . .	"	4	3
La même circonférence à l'endroit le plus gros . . . . .	"	4	11
La même circonférence prise devant les jambes de derrière . . . . .	"	3	10
Longueur du tronçon de la queue . .	"	7	2
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon . . . . .	"	1	7
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet . . . . .	"	"	11
Largeur de l'avant-bras au coude . .	"	"	7
Épaisseur au même endroit . . . . .	"	"	6
Circonférence du poignet . . . . .	"	1	5

	pieds.	pouc.	lign.
Circonférence du métacarpe.....	"	1.	7.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des ongles.....	"	1.	6.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon.....	"	1.	9.
Largeur du haut de la jambe.....	"	"	7.
Épaisseur.....	"	"	5.
Largeur à l'endroit du talon.....	"	"	4.
Circonférence du métatarse.....	"	1.	3.
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles.....	"	1.	2.
Largeur du pied de devant.....	"	"	4.
Largeur du pied de derrière.....	"	"	6.
Longueur des plus grands ongles.....	"	"	7.
Largeur à la base.....	"	"	2.

L'épiploon n'avoit que très-peu d'étendue, & étoit caché derrière l'estomac.

Le foie s'étendoit autant à gauche qu'à droite ; l'estomac étoit placé entièrement à gauche. Le duodenum formoit un arc derrière la partie droite du foie ; le reste du canal intestinal faisoit les circonvolutions dans le côté & dans la région iliaque droite, dans la région ombilicale, dans la région iliaque & dans le côté gauche, enfin il se reploioit en dedans avant de former le rectum. Il n'y avoit point de cœcum.

L'estomac (*A B*, *pl. XXXI*, *fig. 1*, où l'estomac & les intestins sont de grandeur

*naturelle*) avoit une figure fort extraordinaire; il ressembloit à un œuf dont le petit bout se trouvoit au fond du grand cul-de-sac (*B*); l'orifice supérieur étoit placé bien plus près de l'extrémité droite que de la gauche, de sorte que le grand cul-de-sac renfermoit au moins les deux tiers de la capacité de l'estomac; la partie qui étoit entre l'œsophage (*C*) & le pylore (*D*), au lieu de former un angle rentrant comme dans la plupart des quadrupèdes, formoit une convexité.

La plus grande partie (*EFGHI*) du canal intestinal, sur la longueur d'un pied sept pouces trois lignes à commencer depuis le pylore (*D*), varioit beaucoup de grosseur; elle avoit neuf lignes ou un pouce de circonférence dans les endroits les plus gros: il se trouvoit des étranglemens à de petites distances les uns des autres, de petits coudes & des sinuosités, de sorte que les endroits les plus gros étoient de figure fort irrégulière & courbés en différens sens; aussi n'a-t-il pas été possible de mettre ce canal intestinal en ligne droite pour le mesurer, quoique le mésentère eût été coupé près des intestins, & que le bord du mésentère qui y restoit fût bien étendu. Cette première portion du canal intestinal étoit terminée par un étranglement (*I*) qui n'avoit guère plus d'une ligne de diamètre sur deux lignes de longueur. Au-delà de cet étranglement commençoit la

dernière portion (*IK*) du canal intestinal, qui étoit très-grosse en comparaison de la première, car elle avoit un pouce quatre lignes de circonférence sur trois pouces de longueur jusqu'à l'anus (*L*). De chaque côté de l'insertion de l'étranglement, dans cette grosse portion du canal intestinal, il se trouvoit deux appendices (*MN*) plats & oblongs qui avoient environ deux lignes de longueur sur une ligne de largeur; ils étoient aplatis, & l'un avoit un peu plus de largeur que l'autre. Le canal intestinal ayant été rempli d'air, le plus grand des deux appendices s'est un peu gonflé; on l'auroit donc pu prendre pour un cœcum semblable à celui des autres quadrupèdes, s'il avoit été seul, mais il y en avoit deux comme dans les oiseaux, & d'ailleurs il ne ressembloit pas au cœcum des quadrupèdes relativement aux portions du canal intestinal, qui auroient correspondu dans le fourmiller à l'ileum & au colon, car ce cœcum auroit été excessivement petit en comparaison du colon, & même de l'ileum. Après avoir ouvert le canal intestinal, j'ai vu distinctement l'orifice de l'appendice qui s'étoit gonflé; je n'ai trouvé l'orifice de l'autre appendice qu'avec la pointe du stilet; cet orifice étoit fort petit & paroissoit, au premier coup d'œil, être fermé, mais il suffisoit pour donner entrée aux matières contenues dans le canal intestinal: j'en ai vu quelques parcelles dans chacun des appendices. Ces

matières étoient le détriment des fourmis que l'animal avoit avalées , & qui étoient réduites en très-petites parcelles sèches , noires , luisantes , &c. Le canal intestinal en étoit rempli depuis les appendices jusqu'à l'anus. Dans un autre individu de la même espèce , les deux appendices se sont trouvés exactement semblables à ceux qui viennent d'être décrits : ils étoient placés dans le côté gauche , l'un en avant & l'autre en arrière , mais le canal intestinal n'avoit guère plus de diamètre au-dessous de ces appendices qu'au-dessus.

Le foie avoit trois lobes , un dans le milieu , un à droite & un à gauche ; le lobe moyen m'a paru un peu moins grand que le gauche & plus grand que le droit : ce lobe moyen étoit divisé en deux parties égales , par une scissure ; la partie droite étoit un peu plus grande que la gauche , le ligament suspensoire passoit dans la scissure , & la vésicule du fiel étoit aussi placée dans la même scissure , & tenoit au côté droit du ligament.

La rate étoit longue , plate , mince , pointue par l'extrémité supérieure & arrondie par l'inférieure.

Les reins étoient placés l'un vis-à-vis de l'autre ; ils avoient une figure fort irrégulière ; leur enfoncement & leur bassinnet étoient fort petits , mais l'impression de l'esprit-de-vin avoit peut-être déformé ces viscères.

Le p<sup>ou</sup>mon gauche étoit composé de deux lobes , & le droit de quatre , dont trois étoient rangés de file , & le quatrième se trouvoit placé près de la base du cœur entre les deux lobes postérieurs qui étoient les plus grands de tous : le second lobe (*A*, *pl. XXXI*, *fig. 2*) du côté droit n'avoit guère plus de volume que le quatrième , parce qu'il ne s'étendoit pas jusqu'à la racine du p<sup>ou</sup>mon ; les deux scissures (*BC*) qui le sépar<sup>o</sup>ient du lobe antérieur (*D*) & du postérieur (*E*) se croisoient au-delà du second lobe , & pénétroient chacune de la longueur d'une ligne & demie dans le p<sup>ou</sup>mon au-dessus du second lobe , & formoient un petit bec dont la base (*F*) réunissoit le lobe antérieur au lobe postérieur. Il sortoit trois branches de la crosse de l'aorte ; la partie charnue du diaphragme étoit fort épaisse.

La langue étoit très-longue , fort étroite & peu aplatie en dessus & en dessous , autant que j'ai pu reconnoître sa forme qui avoit été altérée par l'impression de l'esprit-de-vin : il y avoit un sillon longitudinal sur le milieu de la face supérieure. La racine de la langue tenoit à deux longs muscles qui s'étendoient en arrière , un de chaque côté de la pièce du milieu de l'os hyoïde , & de chaque côté du cartilage thyroïde & de la trachée-artère , & qui se prolongeoient le long de la face interne du sternum jusqu'à la base du cartilage xiphoïde ; ces muscles

étoient gros & servoient sans doute à retirer la langue en arrière.

Le voile du palais étoit plus long que dans les autres animaux. L'épiglotte étoit oblongue & profondément échancrée à son extrémité qui formoit deux pointes.

Il n'y avoit point d'anfractuosités sur le cerveau ; on y voyoit seulement quelques inégalités. Le cervelet étoit cannelé comme dans la plupart des autres quadrupèdes.

Je n'ai pu trouver que quatre mamelons, deux de chaque côté, un sur la partie antérieure de la poitrine & un sur la partie postérieure du ventre : les deux mamelons de la poitrine étoient très-gros, & ceux du ventre, quoique plus petits, étoient très-sensibles au doigt.

En ouvrant la vulve (*O*) j'ai été surpris de trouver l'urètre au lieu du vagin, car l'urètre s'étendoit jusqu'au bord de la vulve, & le vagin aboutissoit à l'urètre, au lieu que dans la plupart des autres quadrupèdes, c'est l'urètre qui aboutit au vagin. Dans la femelle, dont il s'agit, l'entrée de la vulve étoit commune au vagin & à l'urètre, & à trois lignes de distance des bords de la vulve il se trouvoit une cloison qui séparoit le vagin & l'urètre. Il m'a paru que le clitoris étoit placé sur le bord de la vulve, mais je n'ai pu m'en assurer, parce que ces parties étoient racornies. La vessie (*P*) étoit grande ; la matrice (*Q*) n'avoit point de cornes, ses trompes



(RS) formoient des sinuosités sur les pavillons qui tenoient aux testicules (TV) comme dans les autres quadrupèdes.

pieds. pouc. ligne

Longueur du canal intestinal, depuis le pylore jusqu'à l'anus. . . . .	1.	10.	3.
Circonférence dans les endroits les plus gros. . . . .	"	1.	4.
Circonférence dans les endroits les plus minces. . . . .	"	"	4.
Grande circonférence de l'estomac. . . . .	"	3.	3.
Petite circonférence. . . . .	"	2.	6.
Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave jusqu'à la pointe. . . . .	"	"	5.
Largeur. . . . .	"	"	10.
Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux & le sternum. . . . .	"	"	6.
Largeur de chaque côté du centre nerveux. . . . .	"	"	7.
Circonférence de la base du cœur. . . . .	"	1.	2.
Distance entre l'anus & la vulve. . . . .	"	"	1.
Longueur de la vulve. . . . .	"	"	1½.
Grande circonférence de la vessie. . . . .	"	1.	10.
Petite circonférence. . . . .	"	1.	6.

La tête du squelette (*pl. XXXII*) du fourmiller est large & aplatie par le sommet. Les os propres du nez tiennent toute la longueur & toute la largeur du museau, qui est étroit,

alongé & un peu recourbé en bas. Les orbites des yeux , étant décharnées , n'ont de bord osseux que le long de l'os frontal & de l'os de la pomette qui est très-petit , aussi elles ne sont terminées que par le côté interne. Il n'y a point d'arcades zygomatiques. Les mâchoires n'ont ni dents ni vestiges d'alvéoles : la mâchoire inférieure a très-peu d'épaisseur ; elle ne forme point de contours , ainsi elle n'a point de branches ; l'apophyse coronôide est très-petite , pointue & dirigée en dehors : les deux pièces de cette mâchoire sont terminées par une apophyse dirigée en arrière.

Les apophyses transverses de la première vertèbre cervicale sont très-peu apparentes ; l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre a la forme d'un tubercule ; celles des trois vertèbres suivantes sont longues , pointues ; celles des deux dernières vertèbres sont aussi longues & plus larges ; la branche inférieure de l'apophyse oblique de la sixième vertèbre est fort large , & l'apophyse oblique de la septième vertèbre est fort longue.

Il y a quinze vertèbres dorsales & quinze côtes de chaque côté , huit vraies & sept fausses. Les apophyses épineuses des vertèbres dorsales sont toutes larges & inclinées en arrière. Le sternum est composé de huit os , dont le premier est très-large par sa partie postérieure ; l'antérieure , quoique moins large , l'est encore beaucoup plus que les autres os ; les clavicules s'articulent de chaque côté de

cette partie du premier ; le dernier est étroit & alongé ; les autres sont très-petits. Les premières côtes , une de chaque côte , s'articulent avec la partie postérieure du premier os du sternum ; l'articulation des secondes côtes est entre le premier & le second os ; celles des troisièmes côtes entre le second & le troisième os , & ainsi de suite jusqu'aux huitièmes côtes qui s'articulent entre le septième & le huitième os du sternum. Les côtes sont très-larges & anticipent les unes sur les autres.

Les vertèbres lombaires ne sont qu'au nombre de trois , & même la troisième est engagée entre les apophyses de la première fausse vertèbre de l'os sacrum , & entre les os de la hanche : les apophyses épineuses & transverses des vertèbres lombaires sont larges comme les apophyses épineuses des vertèbres dorsales & les côtes.

L'os sacrum est composé de quatre fausses vertèbres , dont les apophyses épineuses sont au moins aussi larges que celles des vertèbres lombaires & dorsales : il y a quarante-deux fausses vertèbres dans la queue. La partie antérieure de l'os de la hanche a trois faces , une intérieure , une inférieure , & une supérieure ; celle-ci est concave. Les os pubis sont éloignés l'un de l'autre d'environ une ligne & demie.

L'omoplate est grand ; il n'a qu'un angle , c'est le postérieur , la partie de ses bords qui

correspond à la base & au côté antérieur de l'omoplate de la plupart des animaux, forme à peu près un arc de cercle comme dans le chat.

L'os du bras (*A*, *pl. XXXIII*, *fig. 1, 2 & 3*, où les os du bras, de l'avant-bras, de la jambe & des pieds de devant sont vus plus grands que nature) est gros & court; il a, sur le milieu de la longueur du côté extérieur, une apophyse en forme de tubercule (*A*, *fig. 1 & 3*, qui représente la jambe gauche de devant; & *fig. 2*, qui représente la jambe droite). L'extrémité inférieure est très-large: il y a sur le côté interne de cette extrémité une grosse apophyse (*B*, *fig. 1, 2 & 3*) arrondie par le bout, & de l'autre côté une apophyse large & plate (*C*).

L'os du rayon (*D*) & l'os du coude (*E*) n'ont pas plus de longueur que celui du bras, ils sont aplatis en dessus & en dessous.

L'os de la cuisse est aussi aplati en devant & en arrière, & il y a aussi un aplatissement sur les os de la jambe, mais il se trouve sur les côtés de ces os; le péroné (*A*, *fig. 4*) est gros à proportion du tibia (*B*).

Le premier rang du carpe est composé de quatre os: les deux premiers (*FG*, *fig. 1 & 3*) se trouvent au-dessous de l'os du rayon, le troisième (*H*, *fig. 1, 2 & 3*) au-dessous de l'os du coude, & le quatrième (*I*, *fig. 2*) hors de rang; il est fort alongé, aplati en dessus & en dessous, & plus large à ses deux extrémités que dans le milieu. Il ne se trouve

que deux os dans le second rang du carpe : le premier (*K*, *fig. 1, 2 & 3*) est le plus petit ; il est au-dessous du premier os du premier rang, & il s'étend un peu sous le second os du second rang par sa partie inférieure : le second os (*L*) du second rang est en partie au-dessous du second os, & en partie au-dessous du troisième os du premier rang.

Il n'y a que trois os (*MNO*, *fig. 3*) bien distincts dans le métacarpe, mais il se trouve un osselet (*P*) oblong & pointu par le bas, placé en petite partie au côté externe du premier os du second rang du carpe, & en grande partie au côté externe de la partie supérieure du premier os du métacarpe, & un autre osselet (*Q*) très-petit qui s'étend un peu en haut contre le second os du second rang du carpe.

J'ai dit qu'il y a trois os dans le métacarpe, un très-gros (*N*, *fig. 1, 2 & 3*) dans le milieu & un petit de chaque côté, mais le gros os du milieu étant un os du métacarpe, il ne reste plus que deux phalanges (*RS*, *fig. 2 & 3*) pour le doigt qui tient à cet os ; cependant je pense qu'il appartient au métacarpe, parce que l'os (*M*, *fig. 1 & 3*) qui est placé à son côté interne est un véritable os du métacarpe, car le doigt qui y tient, a ses trois phalanges (*TVX*, *fig. 1*) complètes : au contraire il n'y a qu'une phalange (*Y*, *fig. 2*) au bout de l'os externe (*O*) du métacarpe.

Les deux phalanges du doigt qui tient au gros os du métacarpe lui sont proportionnées pour la grosseur, & l'ongle (*S*, *fig. 1*) est encore à proportion plus grand, car il a un pouce de longueur, prise sur sa courbure extérieure. Le doigt & l'ongle (*X*) qui se trouvent au-dessous de l'os interne du métacarpe sont beaucoup plus petits : l'ongle n'a que huit lignes de longueur.

Le tarse est composé de huit os, dont sept correspondent au calcaneum, à l'astragale, au scaphoïde, au cuboïde & aux trois cunéiformes de la plupart des animaux; le huitième os (*C*, *fig. 4*) s'articule par son extrémité antérieure entre le scaphoïde & le second cunéiforme, & avec le premier cunéiforme. Ce huitième os est aplati en dessus & en dessous, il a cinq lignes de longueur & une ligne de largeur dans le milieu, ses deux bouts sont un peu plus larges; il est dirigé en arrière en supposant le pied étendu : les tégumens qui revêtent cet os font partie de la plante du pied & la rendent très-concave sur sa longueur. :

Le métatarse (*D E*) est composé de cinq os qui sont tous à peu près de même longueur; il n'y a qu'une phalange (*F*) au bout du premier os (*E*), aussi l'animal n'a aucuns vestiges du pouce apparens à l'extérieur de la peau. Les quatre doigts sont tous à peu près de la même longueur; les ongles des trois premiers sont longs de sept lignes; celui du quatrième est un peu plus court. )

Longueur de la tête depuis le bout de la mâchoire supérieure jusqu'à l'occiput. . . . .	"	1.	9.
La plus grande largeur de la tête. . .	"	"	10 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la mâchoire inférieure depuis son extrémité antérieure jusqu'au bord postérieur de l'apo- physe condyloïde. . . . .	"	1.	1 $\frac{1}{2}$ .
Largeur à l'extrémité. . . . .	"	1.	"
Largeur de l'extrémité de la mâchoire supérieure. . . . .	"	"	2.
Distance entre les orbites & l'ou- verture des narines. . . . .	"	"	6.
Longueur de cette ouverture. . . . .	"	"	2.
Largeur. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des os propres du nez. . .	"	"	5 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de l'extrémité supérieure qui est la plus large. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de chacune des deux pièces qui composent l'os hyoïde. . . . .	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des cornes. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Largeur du trou de la première ver- tèbre de haut en bas. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur d'un côté à l'autre. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du corps de la dernière ver- tèbre dorsale, qui est la plus longue. "	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des premières côtes. . . .	"	"	7 $\frac{1}{2}$ .
Distance entre les premières côtes à l'endroit le plus large. . . . .	"	"	6 $\frac{1}{2}$ .

	pieds.	pouc.	ligne
Longueur de la dixième , qui est la plus longue. . . . .	"	1.	1.
Longueur de la dernière des fausses côtes . . . . .	"	"	8 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de la côte la plus large. . .	"	"	3.
Longueur du sternum. . . . .	"	1.	5.
Longueur du huitième os, qui est le plus long. . . . .	"	"	4.
Longueur du corps de la sixième vertèbre lombaire, qui est la plus longue. . . . .	"	"	2 $\frac{3}{4}$ .
Longueur de l'os sacrum. . . . .	"	"	8.
Largeur de la partie antérieure. . .	"	"	5.
Longueur des plus longues fausses vertèbres de la queue. . . . .	"	"	2 $\frac{2}{3}$ .
Largeur de la partie antérieure de l'os de la hanche. . . . .	"	"	2.
Hauteur de l'os, depuis le milieu de la cavité cotyloïde. . . . .	"	"	9.
Longueur des trous ovalaires. . . . .	"	"	4 $\frac{1}{4}$ .
Largeur. . . . .	"	"	2.
Longueur de l'omoplate . . . . .	"	"	9 $\frac{2}{3}$ .
Largeur à l'endroit le plus large. . .	"	"	7.
Largeur à l'endroit le plus étroit. . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Hauteur de l'épine à l'endroit le plus élevé. . . . .	"	"	2.
Largeur des clavicule . . . . .	"	"	7.
Longueur de l'humérus. . . . .	"	1.	"
Circonférence à l'endroit le plus petit.	"	"	6.



pieds. pouc. lign.

Diamètre de la tête. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de la partie inférieure. . . . .	"	"	5 $\frac{1}{4}$ .
Longueur de l'os du coude. . . . .	"	"	1.
Hauteur de l'olécrane. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{4}$ .
Longueur de l'os du rayon. . . . .	"	"	9.
Longueur du fémur. . . . .	"	1.	2 $\frac{1}{2}$ .
Diamètre de la tête. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence du milieu de l'os. . . . .	"	"	5 $\frac{1}{4}$ .
Largeur de l'extrémité inférieure. . . . .	"	"	3 $\frac{1}{4}$ .
Longueur des rotules. . . . .	"	"	3.
Largeur. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Épaisseur. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{4}$ .
Longueur du tibia. . . . .	"	1.	4.
Largeur de la tête. . . . .	"	"	3 $\frac{1}{4}$ .
Circonférence du milieu de l'os. . . . .	"	"	4.
Largeur de l'extrémité inférieure du tibia. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du péroné. . . . .	"	1.	3 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence à l'endroit le plus mince. . . . .	"	"	2.
Hauteur du carpe. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du calcaneum. . . . .	"	"	3 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des os du métacarpe. . . . .	"	"	2 $\frac{1}{4}$ .
Largeur de l'os du milieu, prise dans le milieu de sa longueur. . . . .	"	"	2.
Largeur des deux autres os. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la première phalange du premier doigt. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .

	pieds.	pouc.	lignes
Largeur . . . . .	II	II	II $\frac{2}{3}$ .
Longueur de la seconde phalange. . .	II	II	2.
Longueur de la troisième. . . . .	II	II	4.
Longueur de la première phalange du second doigt. . . . .	II	II	4.
Largeur. . . . .	II	II	2.
Longueur de la seconde & dernière phalange. . . . .	II	II	7 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du quatrième os du méta- tarfe, qui est le plus long. . . . .	II	II	3.
Largeur. . . . .	II	II	II $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la première phalange du troisième doigt des pieds de derrière. .	II	II	2.
Largeur. . . . .	II	II	II $\frac{2}{3}$ .
Longueur de la seconde phalange. . .	II	II	1 $\frac{1}{4}$ .
Longueur de la troisième. . . . .	II	II	4 $\frac{1}{2}$ .

*Fin du vingtième Volume.*




*De Seve del*

*Baron Sculp*

LE FOURMILIER.





De Jove, del.

Legrand fecit



